


الموسوعة الزراعية

# الفاكهة والأشجار المثمرة



محمد زين





# **الموسوعة الزراعية الفاكهة والأشجار المثمرة**



# الموسوعة الزراعية

الفاكهة والأشجار المثمرة

إعداد

محمد حسن زين

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

بسم الله الرحمن الرحيم  
حقوق الطبع محفوظة للناسر

الطبعة الأولى

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

٦٣٥

زبن ، محمد

الموسوعة الزراعية : زراعة الخضروات / محمد حسن

عطا زين - عمان : مؤسسة الطريق ، ٢٠٠٩ .

( ) ص.

ر.أ: ٣٦١٢ / ٨ / ٢٠٠٩م.

الواصفات: / زراعة الخضروات // الزراعة /

❖ أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية.

❖ يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا

المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

دار الطريق للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - وسط البلد - مجمع الفحيص التجاري ط ١

خلوي ٠٧٩٥٤٠٠٤٧٢

Email: dareltareek@yahoo.com

## الفهرس

العنوان	رغم الصفحة
المقدمة	٧
زراعة الحمضيات	٩
زراعة (الصبر) التين الشوكي	٢٩
زراعة الخوخ	٣١
زراعة القشطة	٥٠
زراعة البرقوق	٥٧
زراعة التفاح	٨٠
زراعة الرمان	٨٦
زراعة المشمش	٩٠
زراعة الباباظ	١١٢
زراعة التين	١١٦
زراعة التين الكاكي (الكاكا)	١١٩
زراعة الزيتون	١٢٢
زراعة النخيل (البلح)	١٣٥
زراعة الكمثري	١٧٣
زراعة الموز (الطلح)	١٨٩

٢٢١	زراعة العنب
٢٣٧	زراعة المانجو (المانجا)
٢٧٠	زراعة الجوافة

## المقدمة


تحتل زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الفاكهة مكانة هامة في الإقتصاد الزراعي نظرا لقيمتها الغذائية والإقتصادية التي تعود على الإنسان من جني محاصيلها وتسويقها بالطرق الصحية التي تضمن سلامة المنتج من أرضه وإلى المستهلك.

تحتاج الأشجار المثمرة إلى عناية وخدمة حثيثة إبتداء من مراحل الإكثار الأولية وإعداد الشتلات إلى إختيار المناخ المناسب والتربة الملائمة في مرحلة التخطيط الزراعي لإنشاء المزرعة إلى تجهيز الأرض الزراعية وغرس الشتلات في المكان المستديم مع الإلمام بالطرق والأساليب الزراعية الحديثة التي تضمن الأساس الصحي للنبته التي سوف تأخذ مكانها الدائم في الأرض وتضرب جذورها نحو الأعماق باحثه عن مختلف العناصر الغذائية التي تتطلبها من أجل مراحل نموها وإثمارها ومقاوماتها المتعددة لعوامل المناخ والآفات التي تعترض سلامة نموها وإثمارها.

ولا غنى لمزارع العصر عن الإلمام بطرق العناية الدقيقة لنباتات مزرعته من تسميد ووقاية ومقامة وخدمة أرضية وجني المحصول وتقليم، ويحتاج ذلك إلى دراية علمية وافرة وكافية من أجل ضمان البقاء والنمو الأمثل لنباتاته مع المراجعة المستمرة لذوي الاختصاص في معاملة المشاكل البيئية والفسيولوجية التي تتعرض لها مزروعاته، وإن كان له إلمام كافي وخبرة طويلة، نظارا لتشابه بعض الأعراض التي

قد يجتهد فيها ، وعليه استشارة الجهات الزراعية ذات الخبرة العلمية أمر ضروري ليسلم من خطأ الإجهاد فالمهندس الزراعي ووزارة الزراعة المعنية هو المرشد الأمثل في تقديم الحلول المناسبة لكافة العضلات الزراعية .

## زراعة الحمضيات



### التربة المناسبة :

تنتشر زراعة أشجار الحمضيات في معظم البلدان، إلا أن درجة نجاح نموها الخضري وارتفاع إنتاجها يتوقف لحد كبير على خواص وصفات تلك الأراضي ، لذا فإن معاينة الأراضي وأخذ عينات من التربة لتحليلها ميكانيكياً وكيميائياً يعتبر من أهم الخطوات الواجب إتباعها قبل إنشاء بستان الحمضيات •

وفيما يلي وصفاً مختصراً لأهم الصفات الطبيعية والكيميائية الواجب توافرها

في الأراضي الصالحة لزراعة الحمضيات (الحمضيات):

### أولاً : الخواص الطبيعية:

يمكن زراعة الحمضيات في أراضي متباينة من حيث قوام التربة ولكن يفضل أن يتراوح قوام التربة من رملية إلى طينية خفيفة ، ويجب أن تكون التربة جيدة الصرف والتهوية وخالية من الطبقات الصماء بحيث لا يقل بعد مستوى الماء

الأرضي عن ٣٧ سم من سطح التربة ، وعموماً فإنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق إنشاء شبكات الصرف الجيدة سواء كانت مصارف مغطاة أو مكشوفة .

### ثانياً : الخواص الكيميائية:

١ - يجب عدم زراعة الحمضيات في الأراضي الملحية والتي يمكن التعرف عليها بتزهير الأملاح على ظهر الخطوط وحواف الشقوق وذلك لأن ارتفاع نسبة الملوحة في التربة يؤدي إلى ظهور أعراض نقص العناصر الغذائية على الأشجار رغم توافرها في الأرض بجانب أن الأشجار لا تستجيب أيضاً للتسميد الآزوتي ، هذا بجانب أن أيونات الكلوريد تسبب سمية مباشرة للأشجار .

وفي حالة الضرورة فإنه يمكن تطهير وتعميق شبكة الصرف الحقلي أو إنشاء شبكة صرف في حالة عدم وجودها ، ثم إجراء غسيل للأرض قبل الزراعة وذلك بواسطة غمرها بالمياه ثم صرفها سطحياً مع الاعتماد بعد ذلك على الصرف الجوفي بحيث يسمح لمياه الغسيل بأن تتخلل باطن الأرض وتكرر هذه العملية على حسب درجة نفاذية التربة وكمية الأملاح بها .

٢ - يمكن تحديد صفات التربة المناسبة لزراعة الحمضيات على النحو التالي :

- ألا يزيد تركيز عنصر البورون عن ٥ جزء في المليون .
- ألا يزيد تركيز الكلوريد عن ٥٠ جزء في المليون .
- ألا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم عن ١-٢١٪ .

- ألا تزيد الكربونات والبيكربونات عن ٠.٠٣-٠.٠٤ جزء في المليون ٠
- ألا تزيد نسبة الصوديوم والمغنسيوم عن ٠.٤٪ من مجموع القواعد المتبادلة ٠

٣- تتراوح درجة حموضة التربة (PH) المناسبة لنجاح زراعة الحمضيات فيما بين ٦.٥-٧.٥ ، وعموماً في الأراضي التي تميل إلى القلوية وقللة النفاذية يمكن التغلب على ذلك عن طريق إضافة الجبس الزراعي الناعم النقي نثراً على سطح الأرض ثم يقلب في الأرض باستخدام محراث تحت التربة بعمق ١٥ سم بالإضافة إلى تكسير الطبقات الصماء التي قد تتواجد في بعض الحالات ثم تغمر الأرض بالماء بعد ذلك عدة مرات ٠ وعموماً تتوقف كمية الجبس المستخدمة على حسب نوع التربة ودرجة القلوية ، ولذلك يفضل أن يضاف الجبس المستخدم على دفعة واحدة في حالة إذا تراوحت الكمية المستعملة ما بين ١٨ و ١٠٦ طن للدنم وعلى دفتين في حالة الزيادة عن هذا المعدل ٠

٤- في حالة الاعتماد على الآبار الارتوازية في الري فإنه من الضروري أخذ عينات من هذه المياه وتحليلها للتأكد من صلاحيتها للري حيث يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :

ألا تزيد درجة التوصيل الكهربائي عن ٢ ملليموز أي أن تركيز الملوحة الكلية حوالي 118 جزء في المليون ٠

الأيزید ترکیز الكلورید عن ۸۷-۱۲۵ جزء فی الملیون ۰

الأيزید ترکیز البورون عن ۰۵ جزء فی الملیون .

### المناخ المناسب:

یتوقف نجاح زراعة الحمضيات لحد كبير على حسن اختيار منطقة الزراعة نظراً لأهمية الظروف المناخية وتأثيرها الكبير على نمو الأشجار ثم التزهير والعقد واکتمال نمو الثمار ثم نضجها ، وتتراوح درجة الحرارة المثلى لنمو ونشاط أشجار الحمضيات ما بين ۰۲ - ۳۳ م ۰

أما من ناحية توزيع الأصناف في مناطق الزراعة الملائمة فيعتبر اختيار الصنف المناسب للظروف البيئية والمناخية في منطقة الزراعة من أهم العوامل المؤثرة على نجاح زراعة الحمضيات ۰

### أهم أصناف الحمضيات :

وفیما يلي نبذة عن هذه الأصناف :

۱ - البرتقال أبو سرّة واشنجطن .

۲ - البرتقال البلدي .

۳ - البرتقال الفالانشيا (الصيفي) .

۴ - البرتقال السكري .

۵ - البرتقال الخليلي .

۶ - البرتقال أبودمه (دم الزغلول) .

۷ - اليوسفي البلدي .

- ٨ - اليوسفي الصيني .  
٩ - اليوسفي كينو .  
١٠ - اليوسفي كليانتين .  
١١ - الليمون المالح المصري (البنزهر) .  
١٢ - الليمون الرشدي .  
١٢٣ - الليمون الأضاليا .  
١٤ - الليمون العجمي .  
٤ - الجريب فروت "روبي أحمر" .  
٤ - الجريب فروت "مارش" .  
١٧ - الجريب فروت "ستاررد" .

### خطوات إنشاء بساتين الحمضيات:

بعد التأكد من صلاحية التربة لزراعة الحمضيات يجب عمل خريطة تفصيلية للأرض يوضح عليها مصادر الري والصرف ومواقع مصدات الرياح والأبعاد بين كل مصد والآخر ومواقع الأشجار ومواقع الطرق بحيث لا يقل اتساع الطرق عن ٤ متر ولا يزيد البعد بين الطرق المتوازية عن ٦ متر لكي يمكن زراعة المصدات على حافتها وفي نفس الوقت لكي يسهل انتقال الآلات الزراعية لخدمة التربة ومقاومة الآفات ونقل الأسمدة وتوزيعها وكذا نقل المحصول .

ويراعى عند إنشاء البستان الآتي:

#### ١- مصدات الرياح:

يجب زراعة مصدات الرياح قبل زراعة أشجار الحمضيات بستتين على الأقل لتوفير الحماية الكافية لأشجار الحمضيات من التأثير السيء للرياح الشديدة التي تؤدي إلى ميل الأشجار ونمو أفرعها الصغيرة في اتجاه واحد من الشجرة ، كما تسبب الحرارة العالية والرياح الجافة احتراق وتساقط جزئي لأوراق الأشجار الصغيرة .

وتستخدم عادة أشجار الكازوارينا لزراعة مصدات الرياح على مسافة متر من بعضها حول البستان وأقسامه الرئيسية وفي المناطق المكشوفة المعرضة للرياح الشديدة مثل مناطق الاستصلاح الصحراوية الحديثة ، ويفضل زراعة صفين من أشجار الكازوارينا بالتبادل على شكل رجل غراب والمسافة بينهما ١.٥ متر ، مع ملاحظة ترك مسافة لا تقل عن ٥-٦ متر بين أشجار المصد و صف أشجار الحمضيات المجاورة لمنع التأثير التنافسي بين جذور المصد والأشجار المجاورة وكذلك التقليل من تأثير التظليل على أشجار الحمضيات المجاورة للمصد .

ويمكن بصفة عامة منع التنافس بين جذور أشجار الحمضيات وأشجار المصد بعمل خندق بينهما بعمق ١ متر وتقطع الجذور التي تمتد في هذا الخندق مع ملاحظة ترك مسافة ٢-٣ متر بين أشجار المصد وحد الجار ولا تزيد المسافة بين خطوط الكازوارينا المنزوعة بين أقسام المزرعة المختلفة عن ٨-١٠ متر حتى تتمكن أشجار المصد من توفير الحماية الكافية لأشجار الحمضيات في كل قسم من أقسام المزرعة ، وقد ثبت أن أشجار المصد توفر الحماية الكافية لأشجار الحمضيات

من الرياح لمسافة تعادل ٤-٥ أمثال ارتفاع أشجار المصد وبفرض أن متوسط ارتفاع أشجار المصد يعادل ٢ متراً ، لذلك يجب ألا تزيد المسافة بين صفوف أشجار المصد عن ٨،١ متر.

## 2- مسافات الزراعة:

يجب تحديد مسافات الزراعة بحيث تناسب طبيعة نمو أشجار كل صنف ليسهل عمليات الخدمة وكذا تسمح بنمو الأشجار بحالة جيدة وبالتالي الحصول على محصول كبير ، وعموماً ينصح بزراعة الأصناف قوية النمو مثل البرتقال أبو سرّة والبرتقال أليافاوي والبرتقال الفالانشيا (الصيفي) والليمون البلدي على مسافة ٤-٦ متر ، بينما تعتبر مسافة ٤ - ٥ متر مناسبة للبرتقال البلدي والسكري والجريب فروت واليوسفي البلدي ، أما في حالة اليوسفي الصيني والتي تتميز أشجاره بالنمو القائم غير المفترش فيمكن زراعته على مسافة ٤ - ٤ متر ، وفي حالة الحدايق التي تروى بنظام التنقيط تزرع أشجار البرتقال على مسافة ٤-٦ متر واليوسفي على مسافة ٤-٤ متر .

## ٣- توزيع الأصناف بالمزرعة:

يجب عدم التوسع في عدد الأصناف التي ستزرع في المزرعة مع مراعاة ألا تقل مساحة كل صنف عن ٥-٦ أفدنة مع ضرورة توزيع الأصناف داخل المزرعة وفقاً لموعد نضج الثمار حيث تبدأ زراعة الصنف المبكر النضج مثل البرتقال

السكري ثم البرتقال أبو سره ، يزرع في نهاية المزرعة الأصناف المتأخرة النضج مثل البرتقال الفالانشيا (الصيفي) ٠

#### ٤ - إختيار الشتلات:

يجب الحصول على الشتلات من مصدر موثوق به لضمان مطابقتها للصنف وخلوها من الأمراض وخصوصاً الأمراض الفيروسية مع مراعاة أن تكون الصلايا (كيس الشتلة) بحجم مناسب وكذلك لا يقل ارتفاع منطقة التطعيم عن ٥٢ سم من سطح الأرض ، ويفضل خلو الصلايا من الحشائش خصوصاً المعمرة حتى لا تنتقل مع الصلايا.

وقد لوحظ ضعف نمو الشتلات في الأراضي الرملية في السنوات الأولى من الزراعة ويرجع ذلك إلى أن جذور الشتلات تظل فترة طويلة داخل الصلايا حيث تكون الرطوبة مرتفعة في التربة الطينية للصلية ، بينما تنعدم الرطوبة في التربة الرملية المحيطة بالصلية بالإضافة إلى أن مياه الري تلتف حول الصلية وتسرب إلى الأرض الرملية ، ولذلك يقوم معهد بحوث البساتين بإكثار شتلات الحمضيات في تربة رملية معبأة في أكياس بلاستيك للتغلب على مشكلة ضعف نمو شتلات الحمضيات في السنوات الأولى من الزراعة ٠

#### ٥ - طرق زراعة الأشجار:

يجري تخطيط الأرض طبقاً لطريقة الزراعة المتبعة ، وهناك عدة طرق لزراعة أشجار الحمضيات أفضلها الطريقة المربعة والطريقة المستطيلة :

## أ- الطريقة المربعة:

في هذه الطريقة تكون المسافة بين الصفوف العرضية والطولية للأشجار متساوية وهي أكثر الطرق انتشاراً وذلك لسهولة تنفيذها، كما يكون نمو الأشجار منتظم لأنها تشغل مسافات متساوية .

## ب- الطريقة المستطيلة :

في هذه الطريقة تكون المسافة بين الصفوف الطولية للأشجار أكبر من المسافة بين الصفوف العرضية ، وتعتبر هذه الطريقة مناسبة لاستعمال المكنة في إجراء عمليات خدمة البستان حيث تسمح المسافات الكبيرة بسهولة مرور الآلات.

## ٦- حفر جور الزراعة:

يحدد مكان الجور طبقاً للطريقة التي ستتبع في إنشاء المزرعة ثم تحفر الجور بحيث لا تقل أبعادها عن  $٥ \times ٥ \times ٥$  متر ثم يخلط ناتج حفر الجورة السطحي خلطاً جيداً بعدد ٣ - ٤ مقاطف سماد بلدي جيد كامل التحلل ، ١ كجم سماد سوبر فوسفات الجير ، ١ / ٢ كجم سلفات نشادر ، ١ / ٤ كجم سلفات بوتاسيوم ، ١ / ٢ كجم كبريت زراعي مع ضرورة استبعاد التربة التي تخرج من الجزء العميق من الجورة واستخدامها في إقامة البتون حول الشتلات وذلك لاحتوائها غالباً على نسبة عالية من الأملاح .

## ٧- موعد الزراعة:

يتم زراعة أشجار الحمضيات ابتداء من منتصف فبراير حتى أوائل أبريل (فصل الربيع) ، كما يمكن زراعة الحمضيات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (فصل

الخريف) وتعطى زراعة الخريف نتائج أفضل من زراعة الربيع في الأراضي الصحراوية نظراً لتعرضها لرياح الخماسين أثناء الصيف •  
بينما لا ينصح بزراعة الخريف المناطق الباردة حتى لا تتعرض الشتلات للبرودة الشديدة قبل أن تتأقلم وتنتشر جذورها في التربة •

#### 8 - زراعة الشتلات:

عند زراعة الشتلات يجب قطع الأربطة المحيطة بالصلية أو شق الكيس البلاستيك المزروع به الشتلة ثم يتم إنزال جزء من ناتج حفر الجورة الذي يتم خلطه بالسماد البلدي والسوبر فوسفات داخل الجورة ثم توضع الشتلة في الجورة بحيث يكون الطعم متجه ناحية الجهة البحرية التي تهب منها الرياح في الغالب وبذلك نحمل الطعم من الكسر بسبب الرياح الشديدة ثم يكمل ردم الجورة مع تجنب الزراعة العميقة التي تسبب ضعف وتقزم نمو الشتلات في السنوات الأولى من الزراعة مع مراعاة الاحتفاظ بارتفاع منطقة التطعيم فوق سطح التربة •  
ولذلك يفضل أن يكون سطح الصلية أعلى قليلاً من سطح التربة حتى إذا هبطت بعد الري يصبح سطحها مساوياً لسطح التربة وبذلك لا يحدث أي انخفاض في منطقة التطعيم ويجب ضغط التربة جيداً حول الشتلة لتثبيتها •

ويجب ري المزرعة عقب الزراعة مباشرة رية غزيرة مع مراعاة عدم وجود أي تشققات في التربة في منطقة جورة الزراعة حتى لا يتسرب الهواء إلى داخل الجورة ويتسبب في جفاف المجموع الجذري مع ضرورة ضمان استمرار الري على

فترات متقاربة خلال الفترة الأولى من الزراعة حتى لا تزداد نسبة الجفاف في الشتلات حديثة الزراعة .

يجب إزالة جزء من المجموع الخضري للشتلات بتطويز قمة الشتلات بعد الزراعة مباشرة وذلك لتقليل عملية النتح وإحداث توازن مائي للشتلات وبالتالي تصبح الشتلات أقل عرضة للجفاف ، وبعد أسبوعين من الزراعة يجب البدء في إزالة النموات التي جفت من وقت الزراعة وفي حالة وجود أكثر من نمو في منطقة التطعيم فإنه يجب إزالتها مع ترك نمو واحد فقط بحيث يبدأ التفريع على مسافة ٣٠-٤٠ سم من منطقة التحام الطعم والأصل .

### **خدمة بستان الحمضيات:**

#### **التسميد:**

تلعب الأسمدة دوراً كبيراً في زيادة إنتاجية محصول الحمضيات وتحسين نوعيته وقيمتة الغذائية ، وهناك عدة احتياطات للاستفادة الكاملة من الأسمدة أهمها استخدام الصورة المناسبة من السماد وإضافته في الموعد المناسب وبالطريقة المثلى وبالكمية الاقتصادية التي تعطى أعلى محصول دون إسراف في التسميد

وفيا يلي البرنامج المقترح لتسميد أشجار الحمضيات التي تروى بالغمر:

#### **أولاً: الأشجار المثمرة (عمر ٨ سنوات فأكثر):**

١- الأسمدة الفوسفاتية والعضوية والكبريت الزراعي تضاف

الأسمدة الفوسفاتية على صورة سوبر فوسفات أحادي ٤٠ ٪

(فو ٢٥) أو سباد سوبر فوسفات مركز ٣٧ ٪ (فو ٢٥) بمعدل ٧,٥ كجم (فو ٢٥) للذمم ، وهذه الكمية تعادل ٥٠ كجم سوبر فوسفات أحادي أو ٥ كيلو جرام سوبر فوسفات مركز خلال شهري ديسمبر ويناير مخلوطة بالأسمدة البلدية كاملة التحلل (٣, ١٨-٣٥ م للذمم) و ٦ كجم كبريت زراعي حتى تتحلل قبل فصل الربيع ويعطي ذلك دفء للتربة ويقلل من أضرار انخفاض درجة الحرارة .

## 2- الأسمدة البوتاسية:

تضاف على صورة سباد سلفات البوتاسيوم ٨٤ ٪ (بو ٢ أ) بمعدل ٥٠ كيلو جرام على دفعتين بالتساوي الأولى قبل خروج العين (فبراير - مارس) والثانية خلال شهر أغسطس .

## ٣ - الأسمدة الآزوتية:

أنواع الأسمدة الآزوتية المناسبة لأشجار الحمضيات التي تروى بالغمر هي سباد سلفات النشادر (٥.٦ ٪) أو نترات النشادر (٣٣.٥ ٪) ، ويتم إضافة السباد الآزوتي على ثلاثة دفعات :

**الأولى :** قبل خروج العين (فبراير - مارس) بمعدل ١٨ كجم سلفات نشادر (أو ٥٠ كجم نترات نشادر) .

**والثانية :** في مايو بمعدل ٣٧ كيلو جرام سلفات نشادر (أو ٦ كجم نترات نشادر) .

**والثالثة :** في أغسطس بنفس معدل الدفعة الأولى .

ويراعى إضافة السماد تكميلاً حول الأشجار في منطقة ظل الشجرة أو نشرًا بين صفوف الأشجار مع ضرورة الري عقب الإضافة مباشرة على ألا يكون غزيراً حتى لا يفقد السماد مع ماء الصرف .

#### 4- العناصر الصغرى:

عند وجود أعراض نقص العناصر الصغرى على الأوراق وبعد التأكد من النقص عن طريق تحليل الأوراق بواسطة المعامل المتخصصة بوزارة الزراعة (مركز البحوث الزراعية) .

ترش الأشجار بالعنصر الناقص إما في صورة معدنية (كبريتات) بمعدل ٣ جم / لتر ماء أو في صورة مخلبية بمعدل ١ / ٢ جرام / لتر ماء على أن يتم رش الأشجار ٢-٣ مرات خلال أشهر فبراير ومايو ويوليو، مع مراعاة إضافة ١ / ٢ ٪ يوريا حيث تساعد على امتصاص العناصر الصغرى بالإضافة إلى أنها مصدر نيتروجيني للأشجار ، مع مراعاة وقف الرش عند ارتفاع درجة الحرارة خلال شهر يوليو . وبصفة عامة يوصى برش أشجار الحمضيات بعناصر الحديد والزنك والمنجنيز في صورة مخلبية بمعدل ١٨ جم من كل عنصر لكل ١٥٠ لتر ماء + ٣ كجم يوريا وذلك في أواخر فبراير أو أوائل مارس ويكرر الرش بنفس التركيز في يوليو أو أغسطس .

**ثانياً : الأشجار الصغيرة (النشاوى):**

**أ- الأشجار عمر ١-٣ سنوات :**

يحتاج الدنم إلى كميات الأسمدة التالية :

١٣ م ٣ سماد بلدي ٠

١,٥ كجم سوبر فوسفات أحادي.

١٨ - 5 كجم سلفات بوتاسيوم (٨٤ ٪).

٧٥ - ٨٧ كجم سلفات نشادر (٥.٥ ٪) أو ما يعادلها من نترات النشادر (٣٣ ٪).

**بد الأشجار عمر ٧ سنوات:**

يحتاج الدنم إلى الأسمدة التالية :

٤ - ٥ م ٣ سماد بلدي ٠

٣٧ كجم سوبر فوسفات أحادي.

٣٧ كجم سلفات بوتاسيوم.

١٢٥ - ٤٢ كجم سلفات نشادر (٥.٥ ٪) أو ما يعادلها من نترات النشادر

(٣٣ ٪).

**الري:**

يعتبر الري من أهم عمليات الخدمة ذات التأثير الواضح على مدى نجاح

زراعات الحمضيات لما له من تأثير كبير على نمو الأشجار وإنتاجيتها وكذلك

صفات الثمار ٠

فلقد ثبت أن الإسراف في الري يؤدي إلى تدهور الأشجار وانخفاض محصولها

بجانب إصابة الثمار ببعض الأمراض الفسيولوجية مثل التبجير وتشقق الثمار ويظهر

ذلك بوضوح في الأراضي الطينية الثقيلة حيث يعطى دنم الحمضيات في حدود

١٧٥٠ - ٢٠٠ متر مكعب من الماء سنوياً ، في حين أن أشجار الحمضيات

لا تحتاج أكثر من ٧٥٠-١٢٥٠ متر مكعب فقط ، تطول الفترة بين كل رية وأخرى أو تقصر حسب الظروف الجوية فكلما كانت درجة الحرارة مرتفعة مع هبوب الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة كلما كان الري على فترات متقاربة والعكس صحيح في فصل الشتاء حيث انخفاض درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الجوية .

وعموماً يتم الري في فصل الصيف كل ٢١-٤١ يوماً مع ملاحظة أن يكون الري على الحامي خلال فترة التزهير وقبل ثبات العقد إذا دعت الحاجة إلى الري ، أما في فصل الشتاء فيمكن إطالة فترات الري حتى ٠٣-٥٤ يوماً وفقاً لنوع التربة وحالة الأمطار .

#### أهم النقاط الواجب مراعاتها لتجنب الإسراف في الري:

- ضرورة تسوية الأرض جيداً لسهولة توزيع الماء بين صفوف الأشجار .
- الاهتمام بمقاومة الحشائش حتى يسهل ملاحظة حركة الماء أثناء الري .
- اختيار أنسب طرق الري والتي تؤدي إلى توفير ماء الري مع سهولة إجراء العمليات الزراعية .
- ضرورة قفل فتحة الري عند وصول الماء إلى حوالي ثلثي طولاً لحوض أو الباكه ثم يترك الماء للوصول إلى الجزء الجاف من الأرض بتأثير الإنحدار وبهذه الطريقة لا يسمح للمياه بالتراكم فوق سطح الأرض وبالتالي منع الإسراف في الري .

## طرق تقدير حاجة الأشجار للري:

هناك العديد من طرق تقدير حاجة الأشجار للري منها على سبيل المثال :

- استخدام أجهزة قياس الرطوبة في التربة (التنشيومترات) \*
- زراعة الأدلة النباتية مثل عباد الشمس أو نبات الذرة بين أشجار الحمضيات وهي تمتاز بظهور أعراض العطش عليها مبكراً قبل الأشجار مما يعطى فكرة عن قرب إحتياج الأشجار للري \*

- هناك طرق سهلة في التنفيذ ويمكن للمزارع إتباعها دون الحاجة إلى أخصائي فني أو أجهزة معقدة وهي عبارة عن عمل حفرة بعمق ٣٠ سم ثم يؤخذ كمية من التربة من قاع الحفرة بقبضة اليد الواحدة ويضغط عليها فإذا تشكلت على شكل اليد فيدل ذلك على توفر نسبة من الرطوبة وعدم الحاجة للري أما إذا لم تشكل مع الضغط عليها فيدل ذلك على جفاف التربة وضرورة الري .

## أهم الإحتياجات الواجب مراعاتها عند ري أشجار الحمضيات:

- ضرورة ري الأشجار رية غزيرة قبل التزهير بأسبوعين وعدم اللجوء إلى الري أثناء موسم التزهير إلا في حالة الضرورة القصوى كما في حالة هبوب رياح ساخنة وفي هذه الحالة يكون الري على الحامي ولا بد خلال هذه الفترة من توفر درجة مناسبة من الرطوبة \*

- يستمر الري على الحامي خلال فترة التزهير وحتى ثبات العقد ، ثم يزداد معدل كميات مياه الري تدريجياً خلال فترات نمو الثمار أي اعتباراً من شهر مايو وحتى شهر أكتوبر مع ملاحظة زيادة معدلات الري بصفة خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس حيث تنمو الثمار وتزداد في الحجم بسرعة ، كذلك يراعى أن يكون الري في الصباح الباكر أو في المساء في أشهر الصيف •

- يجب إطالة الفترات بين كل رية وأخرى اعتباراً من أواخر شهر أكتوبر وخلال فصل الخريف مع تقليل كمية المياه المستخدمة في كل رية حيث تقل احتياجات الأشجار للمياه في هذه الفترة نظراً لاكتمال نمو الثمار وبدء دخولها في مرحلة النضج •

- يجب عدم منع الري تماماً عن الأشجار خلال فصل الشتاء بل تروى الأشجار على فترات متباعدة قد تصل إلى حوالي ٣٠ - ٤٥ يوماً على أن يكون الري على الحامي لتقليل كمية المياه المستخدمة في كل رية نظراً لقلّة حاجة الأشجار للمياه في تلك الفترة •

### التقليم:

يجري تقليم أشجار الحمضيات أساساً بغرض إحداث التوازن بين النمو الخضري والثمري لتنظيم عملية الإثمار ورفع جودة الثمار •

وبصفة عامة فإن أشجار الحمضيات لا تحتاج إلى تقليم جائر سنوياً ولكن يكفي فقط بإزالة الأغصان المتداخلة والمتزاحمة والجافة والمصابة بالإضافة إلى

السرطانات والأفرخ المائية حتى يسمح بدخول الضوء والهواء وتخللها لقلب الشجرة ٠

ومن الجدير بالذكر أن أصناف الحمضيات تختلف عن بعضها في مدى احتياجها للتقليم حيث يعتبر الليمون الأضاليا أكثر أصناف الحمضيات احتياجاً للتقليم يليه الليمون البلدي المالح والليمون الحلو ثم اليوسفي البلدي ، أما أصناف البرتقال والجريب فروت فهي تحتاج لتقليم خفيف علماً بأن طريقة التقليم تختلف باختلاف عمر الأشجار أيضاً ٠

ولذلك يمكن تقسيم أنواع التقليم على النحو التالي :

#### أولاً : تقليم الأشجار الحديثة (غير المثمرة):

يجري هذا التقليم بهدف تكوين هيكل الشجرة ، ولذا فهو يقتصر على إزالة السرطانات التي تنمو من الأصل (النارنج) والأفرع المتزاحمة والمتداخلة والقريبة من سطح الأرض ، ويجري عادة هذا التقليم بعد سنة من الزراعة في المكان المستديم بغرض بناء هيكل الشجرة بحيث نحصل في السنة الثانية بعد الزراعة على أشجار ذات جذع قوى يحمل ما بين ٣-٤ أفرع رئيسية موزعة بانتظام على محيط الشجرة وعلى ارتفاع ٤٠-١٥ سم من سطح الأرض ٠

#### ثانياً : تقليم الأشجار البالغة (المثمرة):

يجري تقليم الأشجار المثمرة قليلاً خفيفاً بصفة عامة وذلك لإزالة الأفرخ المائية الخارجة من الجذع والأفرع الرئيسية وكذلك السرطانات بالإضافة إلى الأفرع المتزاحمة والمتداخلة والجافة بحيث تزال الأخيرة مع جزء من الخشب الأخضر ،

كذلك يجب فتح قلب الشجرة بقدر الإمكان لتسهيل تخلل الضوء والهواء إلى داخل الشجرة مما يؤدي إلى تحسين النمو الخضري والثمري في حجر الأشجار حيث يوجد معظم المحصول وعند وصول الأشجار إلى ارتفاع كبير يتم قرط الأفرع العالية على ارتفاع ٣ - ٣.٥ متر من سطح التربة حتى يتسنى الحصول على نموات خضرية جديدة وتكوين حجر جيد للأشجار مما يزيد من المحصول مع تحسن صفات الثمار ، كذلك يجري تقليم للأفرع الجانبية عند تداخل فروع الأشجار مع بعضها بالحد الذي يسمح بمرور الضوء والآلات الزراعية ، ويراعى أن ترش الأشجار بمحلول أوكسى كلورور النحاس بتركيز ٥. ٪ (٣ كجم / ١٠٠ لتر ماء) بعد التقليم مباشرة.

### ثالثا : التقليم لتجديد شباب الأشجار:

يجري هذا النوع من التقليم بغرض تجديد نشاط الأشجار (شبابها) والتي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة مع قلة نموها الخضري وضعف إنتاجيتها وحدوث جفاف واضح في الأفرع الخضرية والرئيسية مع سلامة الجذع وعدم إصابته بالأمراض أو الحشرات وفي هذه الحالة يجري تقليم الأشجار بقرطها على ارتفاع ١٠٠ - ١٥٠ سم من سطح الأرض خلال فصل الشتاء حيث تخرج نموات خضرية كثيفة في مكان القرط في الربيع التالي ثم يتم اختيار عدد من ٢-٣ أفرع على كل ذراع من أذرع الشجرة مع إزالة النموات الأخرى بصفة دورية فيساعد ذلك على سرعة تكون الهيكل الجديد للشجرة وتمتاز هذه الطريقة بتوفير الوقت والتكاليف المادية اللازمة لإعادة زراعة الأرض من جديد في حالة تقليم الأشجار القديمة.

#### رابعا : التقليل بغرض استبدال الصنف:

يجري هذا النوع من التقليل الجائر بغرض استبدال الصنف المطعوم غير الجيد الإثمار بصنف آخر أكثر إثماراً وذو قيمة اقتصادية عالية ، ويتم بقرط الأشجار أسفل منطقة التطعيم بحوالي ٥ سم ، ثم يطعم الأصل بالصنف الجديد باستخدام القلم حيث يتم تركيب ٣-٤ أقلام على محيط الجذع ٠

وتعد هذه الطريقة وسيلة سريعة للحصول على شجرة مثمرة خلال فترة قصيرة دون تقليم الأشجار بشرط أن تكون الأشجار المراد استبدالها خالية من الأمراض الفيروسية والفطرية ، كما يمكن استبدال الصنف بالتطعيم بالعين وذلك بتربية ٢-٣ سرطانات على أصل النارج بعد قرط الشجرة ثم تطعم هذه السرطانات بالعين مع العناية بإزالة جميع السرطانات الأخرى التي تنمو على الأصل ٠

#### مقاومة الحشائش:

ينتشر في حدائق الحمضيات العديد من الحشائش الحولية والمعمرة والتي يختلف تصنيفها باختلاف المنطقة - مصدر الري - مصدر السهاد العضوي ٠٠ الخ وهذه الحشائش ينتج عنها العديد من المشاكل نذكر منها المنافسة على الماء والغذاء - إعاقة عملية الري - وتعتبر هذه الحشائش عائل مهم جداً للعديد من الآفات ، ولذلك فإنه يجب مقاومة الحشائش في حدائق الحمضيات لتجنب أضرارها والتغلب على المشاكل الناتجة عنها ٠

## زراعة (الصبر) التين الشوكي

### الوصف النباتي:

التين الشوكي من النباتات العسارية وينمو عادة على هيئة شجيرات منتشرة النمو وفي بعض الأصناف قد يكون لنبات التين الشوكي جذع رئيسي إسطواني متخشب مما يجعلها شبيهة بالأشجار في طبيعة نموها ويختلف ارتفاع النباتات اختلافا كبيرا إلا في حالة استخدامها كسياج أو كمصد للرياح ، ويتكون المجموع الخضري في جميع الأصناف من أفرع متحورة تأخذ شكل أوراق بيضاوية لحمية مبطة تعرف بالألواح ويختلف أطوال اللوح اقل من ١٠ سم وقد يتجاوز ٥٠ سم والسطح الخارجي للألواح مغطى بطبقة سميكة من الكيوتين تعمل على الحد من فقد الماء تحت ظروف البيئة الحارة الجافة . وتحتوي العصارة على مواد خاصة تكسبها حالة غروية تساهم في إختزان كمية عظيمة من الماء في أنسجة النبات، يوجد على سطح الألواح مواقع بارزة يخرج عليها نوعين من الأشواك أولهما أشواك كثيرة حادة دقيقة مقوسة القمة و ثانيهما أشواك مدببة الطرف يتراوح طولها بين ١ - ٣ سم ولا يتجاوز عددها شوكتين بكل موقع . وتحمل الحافة العليا بكل لوح عند تمام نموه عددا من البراعم يتفتح بعضها وينمو إلى أفرع مفلطحة مكونة الألواح الحديثة بينما يتفتح البعض الآخر في موسم التظهير ليعطي كل واحد منها زهرة واحدة ذات مبيض متميز يحيط به ويلتحم مع جدار تحت الزهرة ، وتتحول الأزهار بعد التلقيح والإخصاب إلى ثمار يختلف شكلها تبعا للأصناف بين البيضي والكروي أو المطاول وتكون الثمار شوكية عادة ونادرا عديمة الأشواك ، ويختلف

لون لب الثمرة تبعاً لإختلاف الأصناف بين الأبيض والأخضر المصفر والمائل للإحمرار وقد يكون اللب قرمزي اللون ويحتوي لب الثمرة عدداً كبيراً من البذور الصلدة ولنبات التين مجموع جذري مكون من جذور عرضية منتشرة ومتعمقة وقد تكون الجذور سميكة ولحمية في بعض الأنواع .

وتنتج ثمار التين الشوكي من عدة سلالات من أنواع مختلفة تابعة للعائلة الشوكية وعموماً فجميع أنواع التين الشوكي من نباتات البيئة القاحلة وتنتشر في الصحراوات الجافة بالمناطق الاستوائية وتحت الاستوائية لأمريكا الوسطى حيث الموطن الأصلي لمعظم أنواعه بالإضافة إلى أنواع أفريقية الموطن وقد بدأت زراعة التين الشوكي في الانتشار من صحراوات أمريكا الوسطى عندما نقله الرحالة الأسبان إلى بلادهم ومن ثم أصبح معروفاً في أقطار البحر الأبيض المتوسط وحالياً يعد التين الشوكي من نباتات البيئة الطبيعية في الصحراوات الجافة بجميع المناطق .

### **إعداد الأرض للزراعة:**

تزرع الألواح المعدة لذلك بالمكان المستديم مباشرة على أبعاد ٣.٥ متر بالطريقة الرباعية وقد تزرع على هذا البعد داخل صفوف بين كرمات العنب أو حول بساتين الفاكهة بالأراضي الرملية ، ويمكن زراعته في أي وقت طول العام بإستثناء فصل الشتاء ويفضل الربيع وبداية الخريف .

### **طرق الزراعة:**

يسهل إكثار التين الشوكي خضرياً بالألواح (الأفرع المتحورة التي تأخذ شكل أوراق بيضية) وتفصل الألواح وتترك لمدة ٧ - ٤ يوم بمكان ظليل جيد

التهوية لتفقد جزءاً من رطوبتها مما يسهل إستنبات الجذور عليها ، والبذرة غير معروفة في الإكثار التجاري ويقتصر إستخدامها في أغراض الدراسات الخاصة بإنتاج أصناف جديدة.

### خدمة ما بعد الزراعة:

التسميد والري : يبدأ إثثار شجيراته في السنة الثالثة بعد الزراعة وتستمر في الإثثار طالما بقيت المزرعة ويبلغ محصول الدنم ١,٢٥ - ٢ طن تبعاً لعمر النباتات وحالتها ، ويمتد موسم الإثثار خلال يوليو وأغسطس وتنتج مزارعه في الأراضي الرملية والبيئة الصحراوية ثمار يفضل في خصائصها ما ينتج بالأراضي الثقيلة .

### زراعة الخوخ



الخوخ والنكتارين من فاكهة المناطق المعتدلة متساقطة الأوراق ذات النواة الحجرية والنكتارين يعتبر طفرة برعمية من الخوخ ويتبعان العائلة الوردية والجنس والنوع ، وموطنه الأصلي الصين ثم انتقل إلى بلاد العجم (إيران) ومنها إلى اليونان وسوريا وإيطاليا وأمريكا ثم إلى باقي بلدان العالم .

والخوخ واحد من أكثر الفاكهة التي تنمو في شمال وجنوب المناطق معتدلة الحرارة في العالم .

### الإكثار:

يتم إكثار الأصول البذرية عن طريق إنبات البذور في خطوط المشتل بعد إجراء عملية الكمر البارد في وسط رطب وذلك في الثلاجة على درجة 5° م ولمدة تتراوح ما بين ٣٠ - ٩٠ يوم حسب نوع الأصل المستخدم .

ويتم إكثار الخوخ عن طريق التطعيم على الأصول البذرية الناتجة عن إنبات البذور بأرض المشتل أو الناتجة عن الإكثار الخضري عن طريق العقل أو الترقيد في بعض الأصناف .

### الإحتياجات البيئية والمناخية:

#### التربة المناسبة :

يفضل ألا تزيد ملوحة التربة عن حوالي 4 جزء / مليون أي في حدود ٠.٧١ EC حيث كلما تزداد ملوحة التربة يقل المحصول وعموماً تجود زراعة الخوخ في الأراضي الخفيفة الجيدة الصرف الخالية من الملوحة ، حيث يمكن الحصول على ثمار ذات صفات جودة عالية من الأشجار المنزرعة في الأراضي الرملية ، ولا تجود زراعة أشجار الخوخ في الأراضي الطينية الثقيلة ولا تنجح في الأراضي الملحية والقلوية والغدقة ، وكذلك الأراضي التي تحتوى على طبقات صماء سميقة يصعب على الجذور إختراقها وتؤدي إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضي في منطقة انتشارها .

## مياه الري:

تحتاج أشجار الخوخ والنكتارين إلى مياه خالية من الملوحة حتى تعطى محصول جيد ويفضل ألا تزيد ملوحة مياه الري عن ٥٠ جزء في المليون أي في حدود ١.٢ E.C. ، حيث يقل المحصول بزيادة نسبة الملوحة في مياه الري وكذلك في التربة، ويقل أيضاً المحصول وحجم الثمار عند نقص مياه الري طوال السنة كما أن نقص الماء في يوليو وأغسطس يؤثر على تكوين البراعم الزهرية بالعدد الكافي، ويؤثر على محصول العام التالي .

## إحتياجات البرودة:

تتباين الأصناف في إحتياجاتها من البرودة من أقل من ٦ ساعة عند درجة أقل من ٧ درجة مئوية مثل صنف فلورداجراند إلى أكثر من ٩٥٠ ساعة مثل صنف ردهافن ورليانس .

والأصناف ذات الإحتياجات العالية من ساعات البرودة لا تنجح زراعتها في المناطق ذات الشتاء الدافئ ، حيث يسبب ذلك تأخر وعدم انتظام تفتح البراعم الخضرية والزهرية كما يسبب قلة عدد الأوراق على الأغصان وتساقط الأزهار وبالتالي يقل المحصول أو ينعدم وتحتاج البراعم الخضرية إلى عدد أكبر من ساعات البرودة لكي تفتح بالمقارنة بالبراعم الزهرية لنفس الصنف ، لذلك نلاحظ أن الأشجار تبدأ وتصل إلى قمة التزهير قبل أن تبدأ البراعم الخضرية في التفتح . هذا وكما تحتاج الأشجار إلى عدد كاف من ساعات البرودة أثناء فصل الشتاء لكي تخرج من السكون ، فإن انخفاض درجات الحرارة الشديد والصقيع أثناء فترة تفتح البراعم

في بداية موسم النمو يؤدي إلى حدوث أضرار كبيرة لكل من الأزهار والعقد الحديث .

### الإحتياجات الحرارية:

يحتاج الخوخ والنكتارين إلى عدد من الوحدات الحرارية المناسبة لكل صنف تساعد على نضج الثمار مبكراً وتحسن من صفاتها ، وفي حالة المناطق ذات الصيف البارد فإن انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تأخر نضج الثمار ورداءة صفاتها .

ويتأثر خشب أشجار الخوخ أثناء موسم السكون في الأصناف المختلفة بدرجات متفاوتة عند انخفاض درجة الحرارة عن درجة التجمد وأحياناً قد يصاب بأضرار شديدة عندما يتعرض لدرجات التجمد .

### إنشاء بستان الخوخ:

عند إنشاء البستان يراعى الآتي:

- ١ . اختيار الأصناف التي سيتم زراعتها ومدى ملائمتها لخطة المزرعة المقترحة .
- ٢ . موعد ظهور المحصول خلال موسم الإنتاج ومدى مناسبة كميته لخطة التسويق .
- ٣ . مسافات الزراعة المناسبة لنوعية التربة والمياه وطرق التربة وظروف الخدمة .
- ٤ . مواصفات شبكة الري حتى تكون مناسبة لخطة الإنتاج ونوعية التربة ومصدر ونوعية مياه الري .

٥. طريقة إعداد الأرض وهل هي في جور أو في خنادق تبعاً لطبيعة الأرض ومسافات الزراعة .

٦. كمية الأسمدة العضوية والكيماوية ومحسنات ومخصبات التربة الحيوية والطبيعية والإضافات الأخرى تبعاً لنوعية الزراعة هل هي زراعة عادية أم عضوية ؟ .

٧. عدد الشتلات اللازمة للزراعة ومواصفاتها .

٨. الإنشاءات والمستلزمات المطلوبة في حالة الرغبة في استخدام بعض طرق التربية غير الطريقة التقليدية الشائعة في مصر وهي الطريقة الكأسية وكذلك في حالة الإنتاج بهدف التصدير .

٩. إنشاء مصدات الرياح .

١٠ - الميزانية التقديرية لتكلفة إنشاء البستان وكذلك المصروفات الجارية خلال مواسم النمو ومراحل الإنتاج والتسويق المختلفة .

**وفيما يلي شرح مراحل إعداد البستان للزراعة تبعاً للهدف من الزراعة:**

#### **١- اختيار الصنف:**

في حالة رغبة المزارع في الزراعة من أجل التصدير يجب اختيار الأصناف المبكرة والتي يتم جمع محصولها خلال أشهر مارس وأبريل ومايو على الأكثر حيث أن هذه الفترة التي تكون فيها المنافسة محدودة ، ومن أمثلة هذه الأصناف الموج وفلوردا برنس وإيرلى جراند .

## ٢- المسافة بين الأشجار وكيفية الزراعة:

تتوقف المسافة بين الأشجار على نوع التربة والصنف المزروع وطريقة التربية المستخدمة ، وعند الزراعة في المزارع الجديدة التي تروى بالتنقيط يجب تجهيز الشبكة بكل لوازمها قبل الزراعة .

وعموماً تزرع الأشجار على أبعاد  $5 \times 5$  متر عند إتباع الطريقة الكأسية الشائعة وتعمل الجور بأبعاد  $5 \times 5 \times 5$  سم وتتم الزراعة في شهر فبراير مع مراعاة أن ترتفع منطقة التطعيم لنفس الارتفاع التي كانت عليه في المشتل (١٠ - ٤ سم) وأن يكون مكان التطعيم في الجهة التي تهب منها الرياح (البحرية) لحماية الطعم من الرياح وأشعة الشمس ، ويتم ردم الجور بالتربة الناتجة من الحفر مع خلطها جيداً بالسماد البلدي الجيد ، ويتم الري مباشرة بعد الزراعة ، وتقتصر الشتلات إلى ارتفاع من ٥٠ - ١٥ سم فوق سطح التربة لتشجيعها على تكوين الأغصان الجانبية ، وحالياً يفضل الزراعة في خنادق بدلاً من الجور وخصوصاً إذا كانت الأرض متماسكة لتفكيك التربة وتحسين خدمة الأرض .

## خدمة بساتين الخوخ والنكتارين:

### أ- كسر سكون البراعم:

تتراوح إحتياجات البرودة للخوخ ما بين ٣٧ - ٤٠٠ ساعة من البرودة أقل من ٧.٢°م لكي تدخل البراعم في طور السكون وتخرج منه دون الحاجة إلى استخدام المواد الكاسرة للسكون ، إلا أنه يمكن استخدام بعض المواد الكاسرة للسكون مثل الدرومكس بتركيز من ٠.٥ - ١٪ منفرداً أو مخلوطاً مع أحد الزيوت

المعدنية بتركيز من ٢ - ٣٪ خلال شهري نوفمبر وديسمبر حسب الأصناف وذلك بغرض تبكير وتنظيم تفتح البراعم الزهرية والخضرية ، ويفضل استخدام مثل هذه المعاملات لكسر سكون البراعم خاصة في الأصناف ذات الإحتياجات العالية من البرودة مثل الاسبرنج تايم والاسبرنج كرسن والنكتار والتي تحتاج إلى ٤٢ - ١٥ ساعة من البرودة أقل من ٧.٢ م ، كما أنه يمكن التبكير في تزهر هذه الأصناف باستخدام العمليات الزراعية والبستانية .

ومن أهم الوسائل التي تساعد على تنظيم دخول الأشجار في السكون والخروج منه الآتي :

- عدم التسميد الآزوتي المتأخر .

- تنظيم الري في فترة ما بعد الجمع وعدم الإسراف في معدلات الري خلال هذه الفترة .

- التقليل المبكر والمتوازن .

**ب - التسميد :**

قبل وضع برنامج لتسميد الخوخ والنكتارين يجب عمل الآتي :

١ - تحليل التربة لبيان محتواها من العناصر الضرورية التي تحتاجها الأشجار

٢ - تحليل الأوراق لمعرفة مقدار النقص في كل عنصر عن المستوى الأمثل .

٣ - معرفة أعراض نقص العناصر على أشجار الخوخ والنكتارين

إن معرفة أعراض نقص العناصر السمادية على أوراق وفروع الخوخ والنكتارين هي أهم طرق معرفة حاجة الأشجار للتسميد، ويمكن تشخيص معظم

أعراض نقص العناصر الشديد بالأعراض المرئية مع ملاحظة أن هذه الأعراض قد تتشابه مع بعض العوامل الأخرى .

ويجب التأكد من التشخيص السليم قبل استعمال الأسمدة أو وضع أي برنامج لتصحيح أعراض النقص .

### **أهم أعراض نقص العناصر:**

#### **١- النيتروجين:**

عند نقص النيتروجين على الشجرة تصبح أوراقها أصغر في الحجم من أوراق الأشجار العادية ، ويصبح لونها شاحب ، وتصبح الأفرع قصيرة مع احتمال وجود آثار من البقع الحمراء على اللحاء . ويتوقف نمو الشجرة ، ويقل حجم الثمار ويقل الإنتاج ، ويحدث إسرار في تلون الثمار ، وقد يؤدي النقص الشديد إلى أوراق مائلة للاحمرار ، وقد تتكون بقع ميتة ثم تسقط مسببة ثقوب على الأوراق .

#### **٢- الفوسفور:**

وأهم أعراض نقصه:

- تأخير كسر سكون البراعم .

ملاحظة اللون الأخضر الباهت للمجموع الخضري .

- ظهور بقع ذات لون بني خفيف غير منتظمة الشكل على الأوراق مظهر

الأوراق المحترقة وتكون قريبة من عروق الأوراق السفلية على الفرع .

- مع مضي الوقت تكبر مساحة البقع لتغطي معظم الأوراق الصغيرة .

- مع استمرار النقص تجف الأوراق وتسقط .

#### **٣- البوتاسيوم:**

يسبب نقص البوتاسيوم تلون حواف الأوراق باللون البني المائل للأرجواني (احتراق الأوراق) وعند زيادة النقص تصبح أعناق الأوراق خضراء شاحبة إلى أن تصبح مائلة للبياض ، ويمكن ملاحظة النقص في معظم أنواع التربة ، ولكنه يلاحظ في معظم الأحوال في التربة سيئة التهوية رديئة الصرف .

#### ٤ البورون:

##### أ. أعراض النقص على الثمار:

تظهر أعراض النقص على الثمار أولاً عند اشتداد النقص تظهر على الأوراق ، وأهم الأعراض نمو الأنسجة الفلينية ، وتصبح الأنسجة جافة ذابلة ، وصغر حجم الثمار وبطء نموها وعدم وصولها إلى الحجم الطبيعي المميز للصنف ، وظهور جلد الثمرة الخشن الأجرب وقد تظهر شقوق على أي جزء من سطح الثمرة ، وقد يسبب النقص تشوه شكل الثمار .

##### ب. على المجموع الخضري:

تظهر أعراض النقص الحاد على المجموع الخضري على صورة موت الأفرع من أعلى إلى أسفل ، وذبول الأزهار والتورد وتشوه شكل الأوراق وظهور عيوب على اللحاء أو التوقف عن النمو بصفة عامة ويمكن أن تظهر الأعراض مبكراً وتمثل في فشل كسر سكون البراعم الخضرية والزهرية ، ويتبعها موت الأفرع من أعلى لأسفل . ويمكن أن يظهر النقص على شكل تقرحات تشبه الحصبة على لحاء الجذع والأفرع الثانوية ، وقد تكون الأفرع رفيعة وقصيرة وخالية من الأوراق

ولونها أخضر ، وقد تموت مع نهاية الصيف ، وغالباً ماتكون الأزهار غائبة أو مشوهة الشكل .

#### ٥- الحديد:

وتظهر أعراض نقص الحديد على صورة أوراق صفراء النصل مع وجود شبكة من العروق الخضراء ، ومع استمرار النقص الشديد يختفي اللون الأخضر وتموت حواف الأوراق وقد تشمل أجزاء من نصل الورقة ، ويحدث نقص الحديد عادة في التربة القلوية ويكون النقص حاداً عند الإسراف في استخدام المياه مع سوء الصرف ، وعند استخدام التسميد النيتروجيني في هذه الحالة قد يزيد من حالة الاصفرار .

#### ٦- المنجنيز:

وتظهر أعراض النقص أيضاً على صورة اصفرار الأوراق ولكن في العادة فإن الأوراق الكبيرة فقط هي التي تظهر عليها الأعراض . وتبقى العروق الوسطية والأنسجة القريبة منها خضراء ، ويزداد الاصفرار مع زيادة النقص ، وعند شدة النقص قد تتأثر الأوراق الحديثة ، ويحدث نقص المنجنيز مثل نقص الحديد في التربة القلوية ولكنه يكون أقل حدة في التربة سيئة الصرف على عكس نقص الحديد .

#### ٧- الزنك:

نقص الزنك شائع الحدوث ويسبب التورد أو صغر حجم الأوراق ويحدث التورد عندما تقل المسافة بين الأوراق إلى أقل حد ، وفي حالة قلة حجم الأوراق تكون المسافة عادية ولكن الأوراق صغيرة جداً عن الحجم الطبيعي وقد تحدث هذه الأعراض على كل الفروع على الشجرة أو بعض منها ، وقد يكون الاصفرار من أعراض نقص الزنك .

## ٨-المغنسيوم:

تكون الأعراض على صورة مساحات صفراء ما بين العروق أو على طول حواف الأوراق الكبيرة في العمر ، وقد تموت هذه المساحات وتتحول إلى اللون البني ، وتسقط معظم الأوراق التي تعاني من النقص ، وعند شدة النقص لاتصل الشمار إلى حجمها الطبيعي وتفقد الشجرة ما يقرب من نصف أوراقها عند حلول ميعاد القطف .

## ٩-الكبريت:

ويسبب نقصه قلة النمو والاصفرار الواضح للأوراق وتشبه أعراض نقص النيتروجين ولكن الإصفرار يكون مكثف في حالة نقص الكبريت .

## ١٠- النحاس:

ويسبب نقصه ذبول القمة حيث تتحول الأوراق الطرفية إلى اللون الأصفر .

## أعراض زيادة الملوحة:

يؤدي زيادة أيون الكلوريد إلى احتراق الأوراق ثم موت الأشجار .  
برنامج التسميد للخوخ والنكتارين:

تحتاج أشجار الخوخ إلى مجموعتين من العناصر : وهي مجموعة العناصر الغذائية الكبرى ومجموعة العناصر الغذائية الصغرى وهذه العناصر يمتص معظمها من التربة ، ويجب أن توجد هذه العناصر في حالة اتزان ، حيث أن زيادة

عنصر ما في التربة قد يؤثر على امتصاص عنصر أو أكثر ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض نقص عنصر بالرغم من توافره في التربة ، فقد وجد أن زيادة عنصري البوتاسيوم والكالسيوم يمنع امتصاص الماغنسيوم وبالتالي عند زيادة عنصر

الماغنسيوم فإنه يمنع امتصاص كل من البوتاسيوم والكالسيوم ، كذلك وجد أن زيادة عنصر الآزوت بكمية كبيرة يمنع امتصاص عنصر الكبريت ، وفيما يلي نستعرض الكميات المقررة من الأسمدة اللازمة والضرورية لتسميد مزارع الخوخ والنكتارين .

**أولاً :** برنامج التسميد في مزارع الخوخ والنكتارين التي تروى بالغمر .

**ثانياً :** برنامج التسميد في الأشجار التي تروى بالتنقيط :

- يتم وضع الأسمدة العضوية والكيميائية في شهر أكتوبر ونوفمبر (بنفس معدلات الأرض التي تروى بالغمر) في خندقين على جانبي جذع الشجرة بالتبادل سنة بعد أخرى ، وذلك حول محيط انتشار الجذور وعلى مسافة لا تقل عن متر واحد من جذع الشجرة ، أو في منتصف المساحة المظللة وبعمق لا يقل عن ٥٠ سم ثم تقلب جيداً مع ناتج الحفر وتوضع بالخندق .

عند بدء انتفاخ البراعم يتم التسميد من خلال ماء الري بإضافة ٦٠ جم من نترات نشادر + ١٦ جم من سلفات بوتاسيوم + ٦ سم ٣ من حامض الفوسفوريك لكل متر مكعب من مياه الري سواء كانت الأشجار مثمرة أم غير مثمرة ، ويكرر التسميد بهذه المعدلات ٢-٣ مرات أسبوعياً حسب حالة الشجرة حتى تمام العقد ووصول الثمار إلى خمس حجمها ، أو حتى نهاية مارس في حالة الأشجار غير المثمرة

بعد تمام العقد ووصول الثمار إلى الخمس حجمها يتم التسميد من خلال مياه الري بإضافة ٤ جم نترات نشادر - ١٥ جم سلفات بوتاسيوم + ٦ سم ٣ حامض فورسفوريك لكل متر مكعب من مياه الري سواء كانت الأشجار مثمرة أم غير مثمرة ، ويكرر التسميد بهذه المعدلات ٢ - ٣ مرات أسبوعياً حسب حالة الأشجار وحتى قبل الجمع بأسبوع أو حتى نهاية يونيو في حالة الأشجار غير المثمرة .

بعد تمام العقد واکتمال خروج الأوراق يتم الرش بالسماذ الورقي المكون من ٤٠٠ جم حديد مخلبي + ٦ جم منجنيز مخلبي + ٦ جم زنك مخلبي + ١٨ جم يوريا لكل ١٥٠ لتر ماء ويفضل أن يكرر الرش بهذا السماذ الورقي مرة أخرى بعد شهر من الرش السابقة ويجب أن يتم التسميد الورقي في الصباح الباكر .

بعد جمع المحصول تضاف المعدلات الآتية من خلال مياه الري حيث يضاف ١٥ جم من نترات النشادر + ١٨ جم من سلفات البوتاسيوم لكل متر مكعب من مياه الري سواء كانت الأشجار مثمرة أو غير مثمرة ويكرر التسميد بهذه المعدلات ٢ - ٣ مرات أسبوعياً حتى نهاية سبتمبر .

**الري :**

تتوقف كمية مياه الري وعدد الريات على طبيعة التربة والمنطقة الموجود بها البستان ودرجة الحرارة ، وفي البساتين التي تروى بالغمر فإنه يفضل الري على البارد ، بحيث تتخلل مياه الري طبقات التربة المشغولة بالجذور الماصة بسهولة دون تراكم لمياه الري بصورة غير طبيعية تؤدي إلى ارتفاع الماء الأرضي الذي يعتبر من أكثر العوامل التي تساعد على تدهور مزارع الخوخ ويظهر عليها التصمغ الناتج عن الخلل الفسيولوجي ، والذي يصاحبه اصفرار في الأوراق وجفافها ثم تساقطها

، مع خروج إفرازات صمغية على الأفرع والسوق وينتهي الأمر بتعفن الجذور ثم جفاف الأشجار تماماً ، لذا يجب توفير المصارف بالأعداد الكافية وبالأعماق الكافية وخاصة في الأراضي الثقيلة وعموماً في حالة الري بالغمر يمنع الري خلال شهري ديسمبر ويناير ويتم خلال تلك الفترة تطهير المراوي والمصارف أثناء السدة الشتوية ، وبعد ذلك تعطى الأشجار رية غزيرة قبل تفتح البراعم مباشرة لدفع البراعم على التفتح .

ويوقف الري أثناء فترة التزهير وعند الضرورة القصوى يكون الري (تجربة على الحامي) ويجب عمل حلقات حول الأشجار لمنع وصول مياه الري إلى جذع الشجرة أو عمل باكية عمالة وأخرى بطالة ، ويستمر الري بعد فترة التزهير والعقد بحيث لا تزيد فترات الري عن ٤ - ٥ يوماً حسب نوع التربة .

وفي حالة الصرف ودرجة الحرارة السائدة وتحتاج الأشجار الصغيرة لعناية خاصة بحيث تحتاج لتوفير الرطوبة بصفة مستمرة .

وبعد جمع محصول الخوخ تحتاج الأشجار من ريتين إلى ثلاثة ريات قبل تركها بدون ري خلال الفترة من أول ديسمبر حتى آخر يناير كما سبق ذكره .

أما في حالة الأراضي الجديدة التي تروى بالتنقيط فتتوقف كمية المياه المستعملة على ظروف المنطقة ونوع التربة وعمر الأشجار ودرجة الحرارة ، ويوضح الجدول التالي كمية المياه اللازمة لكل شجرة بالتر لكل يوم خلال أشهر السنة وهي معدلات إسترشادية يمكن الاسترشاد بها لوضع البرنامج المناسب لكل مزرعة .

وعند حلول شهر أكتوبر ونوفمبر يتم تقليل معدلات الري تدريجياً فتعطى كل شجرة ٤ لتر / يوم مع تباعد فترات الري بعد ذلك حسب نوع التربة وظروف المنطقة ريه كل ٧ - ١٠ أيام .

## **تربية وتقليم أشجار الخوخ النكتارين :**

**هناك نوعان من تقليم الأشجار هما :**


### **١- التقليم بغرض تربية الأشجار:**

فالأشجار الصغيرة يتم تقليمها من أجل تربيتها وتشكيلها من أجل الحصول على هيكل قوى يعطى إثماراً عالياً واقتصادياً في نفس الوقت وفي وقت مبكر من حياة الشجرة عقب زراعتها في المكان المستديم . حيث يتم إجراء أحد طرق التربية حسب مسافات الزراعة وإمكانيات المزارع المالية والغرض من إنشاء المزرعة (غرض التصدير أو الإنتاج المحلي).

**٢- التقليم من أجل رعاية وصيانة الأشجار عن طريق التحكم في إنتاجها**  
ويتم في الأشجار الكبيرة سنوياً من أجل صيانتها وتجديد وحدات الإثمار بها ، ويتم التحكم في فترة الإثمار عن طريق تجديد وحدات الإثمار والمحافظة عليها وكذلك إعطاء محصول على الجودة ولتسهيل العمليات الزراعية والجمع ، ويتم في التقليم التخلص من الأغصان المصابة والميتة والمكسورة وتساعد أيضاً عملية التقليم في خف ثمار المحصول ، مما يقلل من تكلفة الخف اليدوي ، أضف إلى ذلك فإن تقليم الأشجار المثمرة يزيد من عمر بقائها في الحديقة بحالة جيدة .

### **أولاً: التقليم من أجل تربية أشجار الخوخ:**

هناك الكثير من طرق التربية للخواخ تتوقف على مسافات الزراعة والأصناف  
ومن طرق التربية المعروفة .



### طرق التربية المختلفة

- ١ . الطريقة الكأسية .
- ٢ . طريقة القائد الوسطى .
- ٣ . طريقة الوسطى المحور .
- ٤ . طريقة القائد الوسطى المزدوجى .
- ٥ . الطريقة الريشية .
- ٦ . التربية على أسلاك عند الزراعة المكثفة للخواخ مثل طريقة التاتورا .



### طرق التربية المختلفة

وعموماً يمكن إجراء عملية التقليم الصيفي وهي ضرورية من أجل انتخاب الأفرع النامية في داخل الشجرة أو الأفرع غير المرغوب فيها وبذلك تعطى فرصة للأفرع الباقية لكي تنمو نمواً جيداً مع عدم المغالة في التقليم الصيفي حتى لا يؤثر ذلك على تقليل المواد الغذائية للشجرة وهي ضرورية من أجل البناء الكلى لها .

### ٢- تقليم الأشجار المثمرة:

ويتم فيه التخلص من الأفرع الجافة والمكسورة والمريضة والمصابة بالحشرات والمتعارضة والنامية إلى الداخل ، ويراعى عند تقليم الأشجار المثمرة شتاءً أن يتم تقصير الأفرع المختارة بمقدار الربع أو الثلث حسب قوة نموها في الأصناف المحلية للبخوخ ولا يتبع ذلك الإجراء في حالة الأصناف الأجنبية التي تحمل معظم محصولها في أطراف الأفرع ، وتختلف طريقة تقليم التقصير (القرط) باختلاف الأصناف وقوة طبيعة النمو ، كما أنها تعتبر وسيلة لخف الثمار عن طريق تقليم عدد الأفرع المعدة

للإثمار وفي نفس الوقت تبدأ سنوياً إزالة بعض الأفرع المثمرة المتزاحمة أو المتداخلة أو المتشابكة وذلك بغرض توفير الضوء والهواء للأفرع المثمرة المتبقية ، مع اللجوء إلى التقليم الجائر نسبياً عن الحاجة لتجديد سطح الإثمار عن طريق تجديد شباب الأشجار ، ويجب أن يكون التقليم في السنوات الأربع الأولى من عمر أشجار الخوخ خفيفاً حتى لا يحدث انخفاض المحصول بدرجة ملحوظة وقد وجد أن أحسن فترة لتقليم الخوخ المحلى (ميت غمر) هي من أول نوفمبر حتى نهاية ديسمبر ، أما الأصناف المبكرة مثل الفلوردا برنس والإيرلي جراندي فيفضل تقليمها في الفترة من منتصف أكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر ويجب بعد التقليم رش الأشجار أكسى كلور النحاس بمعدل ٣ كجم على ١٥٠ لتر ماء ويجب بعد إجراء التقليم التخلص من نواتج التقليم خارج المزرعة والتخلص منه بالحرق وحتى لا يكون مصدراً للإصابة بالحشرات وأهمها سوسة القلف والحفارات والأنارسيا ويؤدي عدم إجراء عملية التقليم بالطريقة الصحيحة إلى تدهور الأشجار ورداءة تلوين الثمار .

## جمع المحصول:

تعتبر ثمار الخوخ والنكتارين صالحة للقطف عندما تصل إلى درجة تكون فيها الثمار كاملة التكوين بستانياً ولكنها قادرة على تكملة نضجها وتلوينها بعد القطف مع احتفاظها بصفات استهلاكية عالية تمثل الصنف وبحيث تصل إلى المستهلك بحالة جيدة .

وهناك العديد من الدلائل على اكتمال التكوين (الصلاحية للقطف) وهي:

- ١ . عدد الأيام من تاريخ التزهير الكامل .
- ٢ . حجم ووزن الثمار المميز لكل صنف .
- ٣ . سهولة فصل الثمار من الشجرة .
- ٤ . قلة صلابة الثمار .
- ٥ . لون القشرة ولون اللب المميز لكل صنف .
- ٦ . سهول انفصال اللحم عن النواة .
- ٧ . زيادة المواد الصلبة الذائبة .
- ٨ . قلة النسبة المئوية للحموضة .

وعموماً يجب عند تحديد اكتمال النمو معرفة مجموعة الدلائل المشتركة وعدم الاعتماد على أحدها فقط ، ومن أهم الدلائل نمو أكتاف دروز الثمار ووصولها للحجم والوزن الممثل لكل صنف وتحول اللون الأساسي للجلد من الأخضر إلى الأصفر ثم ظهور اللون الأحمر بمساحته المميزة لكل صنف ، ودرجة إصفرار اللحم ، ووصول الصلابة والمواد الصلبة الذائبة للحد المناسب للجمع .

## زراعة القشطة

القشطة من محاصيل الفاكهة إستوائية النشأة وقد نجحت زراعة القشطة في بعض البلدان العربية مثل مصر منذ مدة طويلة لكنها مازالت محدودة الانتشار ، وتحقق مزارع القشطة الآن عائدا اكبر نتيجة لقلة المعروض منها وإقبال المستهلك المصري عليها وتلاقي بعض أصناف القشطة الفاخرة طلبا في الأسواق الخارجية حيث بدأ تصديرها وهي من محاصيل الفاكهة التي يتوفر لها مستقبلا كبيرا في التصدير، وتستخدم القشطة كثمار طازجة أو في بعض المثلجات والمصنعات وتحتوي عند النضج على سكريات ذائبة تصل إلى ٥٪. ومعظم أنواع القشطة نباتاتها أشجار أو شجيرات نصف متساقطة الأوراق مثل الجوافة والبشملة حيث تساقط أوراقها القديمة دفعة واحدة قبل موسم تفتح البراعم والنشاط في موسم النمو الجديد وجميع أنواع القشطة أوراقها بسيطة .

### المناخ المناسب:

تنمو شجرة القشطة بنجاح في المنطقة المعتدلة وهي تتحمل ارتفاع الحرارة صيفا كما أنها تتحمل البرودة إلى حد ما شتاءا، ولم يعرف للقشطة حتى الآن دور سكون شتوي مميز وتحتاج الثمار في نموها إلى جو حار صيفا وموسم نمو طويل مع عدم تعرضها للرياح الجافة خصوصا خلال فترة التزهير وبداية نمو الثمار ويؤدي جفاف الجو وإنخفاض رطوبته أثناء التزهير إلى فشل التلقيح والإخصاب وتساقط الثمار الصغيرة ، ويتحسن عقد الثمار وترتفع نسبته في الجو المرتفع الرطوبة بدرجة تزيد على ٥٪ مع درجة حرارة بين ٢٧ - ٣٠ درجة م .

## الأرض المناسبة:

لا تتحمل أشجار القشطة سوء التهوية وارتفاع الرطوبة في التربة (الأراضي الغدقة) إلا أنها تنجح في مجال كبير من أنواع التربة من الرملية لكنها تجود في الأراضي الصفراء جيدة الصرف وتتحمل الزراعة في الأراضي التي ترتفع بها نسبة الجير .

## إعداد الأرض للزراعة وطرق الزراعة:

يجري إكثار الأصناف التجارية خضريا بالتزوير الدرعي على أصول القشطة البلدي البذرية أو من الأنواع البرية - على أن يكون حجم الطعم كبيرا (٢.٥ سم) لضمان نسبة من النجاح ، ويتنشر حاليا إكثار القشطة بالتركيب بالشق حيث يعطى نسبة نجاح أعلى من طريقة التزوير ، وتزرع البذور لإنتاج الأصول في الربيع (مارس - أبريل) أو الخريف (أغسطس - أكتوبر) في المهاد أو أواني الزراعة ثم النقل إلى خطوط المشتل ، ويستخدم في ذلك بذور مخزنة لمدة عام حيث تعطى نسبة إنبات (٩٥٪) أفضل من البذور الحديثة ٤٥٪ وقد تستخدم البذور الحديثة بعد تعريضها للكمبر البارد لدرجة حرارة منخفضة صفر إلى ٢ درجة م لمدة أسبوع ، وتنبت البذور عادة بعد ٤٠ يوما من الزراعة ويمكن إسراع الإنبات بخدش البذور بورق الصنفرة أو بنقعها في الماء الدافئ مدة ثلاثة أيام قبل الزراعة للتخلص من المادة الشمعية التي تعيق دخول الماء للجنين ، ويجري التزوير الدرعي في فترتين الأولى في منتصف ابريل بأزرار قديمة وتعطى نسبة نجاح ١٥٪ والثانية من يونيو إلى سبتمبر (الميعاد المعتاد) بأزرار الموسم الجاري مع مراعاة حماية الطعوم في الميعاد

المتأخر خوفا من إنخفاض درجة الحرارة ، وتكون الأصول بعمر عام أو أكثر قليلا أما التركيب بالشق فيمكن إجراؤه في الفترة من ابريل إلى أكتوبر على أصول لا يقل عمرها عن سنتين .

### **إعداد الأرض للزراعة :**

تنقل النباتات إلى المكان المستديم ملشا أو بصلايا بعد سنتين من زراعة البذرة كنباتات بذرية أو بعد سنة من التطعيم، وتتم الزراعة بالأرض بعد تجهيزها على أبعاد تختلف بين الأصناف من ٣ إلى ٥ أمتار بطريقة المربع ، وقد تزرع القشطة كمؤقتات في بساتين المانجو حيث تبكر في الوصول إلى سن الإثمار وتتم الزراعة من يناير وحتى قبل بدء موسم النمو .

### **خدمة ما بعد الزراعة:**

#### **أ- التربية والتقليم :**

تربى الأشجار بالطريقة الكأسية ويقتصر في تقليم الأشجار المثمرة على إزالة الأفرع المتزاحمة والجافة والمصابة وكذلك الأفرخ المائية أولا بأول ، وعندما تتقدم الأشجار في العمر تحتاج إلى تجديد السطح المثمر بالتقليم الجائر في موسم الشتاء، وقد يتبع مع القشطة تقليما شتويا سنويا يشبه تقليم كرمات العنب حيث تقصر الأفرع الطويلة إلى ١٠ - ٤ سم مع إزالة جميع الفريعات الصغيرة .

#### **الري :**

تقل إحتياجات أشجار القشطة للماء عن أشجار معظم الأنواع الأخرى ، تروى بالغمر في الوادي مع تعطيش الأشجار شتاء ويتوقف توقيت الري تبعا

لظروف الجو والتربة وعمر النبات ومرحلة النشاط ويكون الري في الحداثق المثمرة أسبوعيا في الربيع والصيف أما الأراضي الجديدة فتروى بالتنقيط مع مراعاة ما سبق ، وتطول الفترات تدريجيا مع نهاية الصيف مع الحذر من تعريض الأشجار والثمار النامية لمعاناة العطش ويستخدم الري بالتنقيط في الأراضي الجديدة حيث يتم تنظيمه طبقا للقواعد المذكورة في محاصيل مستديمة الخضرة .

### التسميد :

تتوقف معدلات تسميد القشطة تبعا لنوع التربة ودرجة خصوبتها بالإضافة إلى عمر الأشجار وحالتها الغذائية ومستوى إثارها وطريقة الري والتسميد المتبعة، ففي الأراضي الصفراء الخصبية يكتفي في نظام الري بالغمر بالتسميد العضوي خلال الشتاء بمعدل ٥ متر مكعب سماد بلدي للندم على أن يخلط قبل إضافته بسماد السوبر فوسفات بمعدل ٥ كيلو جرام لكل متر مكعب وتتم إضافة السماد البلدي في الخريف ويخلط جيدا بالتربة ، أما في التربة الرملية والفقيرة فيجري التسميد العضوي كما سبق في الشتاء بالإضافة إلى التسميد المعدني بمعدل ١٨ جم أزوت، ٦ جم (P2 O5)، ١٥ جم (K2O) كمقنن سنوي للشجرة البالغة المثمرة في السنة ويوزع المقنن السنوي للأزوت والبوتاسيوم بالتبادل خلال الصيف في ثلاث دفعات لكل منهما ، أما السماد الفوسفاتي فيضاف كل المقنن دفعة واحدة قبل بداية شهر مارس تتدرج إحتياجات التسميد بعد الغرس في الزيادة على مدى خمس أو ست سنوات لتصل المقننات السمادية في نهايتها إلى المقررات المذكورة للأشجار

المثمرة كحد أقصى ، وكما هو معروف يفضل زيادة عدد مرات الإضافة في الأشجار الكبيرة السن ، حيث يوزع المقنن السنوي على ٤ - ٦ دفعات للأزوت، 3 - 4 دفعات للبتواسيوم، ٢ - ٣ دفعات للفوسفات ، ويراعى إتمام الري عقب كل إضافة مباشرة ، وتمثل الكميات المذكورة الحد الأقصى لتسميد القشطة في الأراضي الرملية والفقيرة .

### الإزهار والتلقيح:

تحمل أزهار القشطة مفردة أو في نورات صغيرة على النموات الحديثة في وضع جانبي والزهرة خنثى لا تتفتح بتلاتها طبيعيا كما أنها مبكرة المتاع لذا لا يمكن أن تلقح ذاتيا ، وبما أن البتلات لا تتفتح فإن التلقيح الحشري العادي لا يمكن أن يتم ولذلك استخدام التلقيح اليدوي مع القشطة لمدة طويلة ويعاب على التلقيح اليدوي صعوبة وارتفاع تكلفته وتعتبر مشاكل التلقيح من الأسباب الرئيسية التي تعوق انتشار زراعة القشطة وقد تمكن الباحثون في بعض دول العالم من تربية حشرات صغيرة ثابتة وإطلاقها في مزارع القشطة حيث تحققت نتائج إيجابية في التلقيح نتيجة لقيام تلك الحشرات بنقل حبوب اللقاح من الأزهار الكبيرة ثم تنتقل إلى الأزهار الأصغر سنا وتثقب بتلاتها وسبلاتها وتدخل إلى متاعها المستعد للتلقيح حاملة إليه حبوب اللقاح وبذلك تتم عملية التلقيح والإخصاب ، ويلجأ بعض المزارعين في الأراضي الجديدة إلى تشجيع نمو النمل لنقل حبوب اللقاح إلى الأزهار المستعدة للتلقيح .

## التزهير:

يمتد موسم إزهار القشطة البلدي والهندي في مصر ما بين مايو حتى أغسطس حيث تختلف الأصناف والمناطق في ميعاد الإزهار ، وعموما تبكر القشطة البلدي عن الهندي في التزهير بنحو ثلاثة أسابيع في نفس المنطقة، أما القشطة قلب الثور فلها موسمين للإزهار خلال العام الأول خلال يوليو وأغسطس وتتساقط أزهار هذا الموسم عادة ولا تنشأ عنها ثمار، أما الموسم الثاني للإزهار فخلال نوفمبر - ديسمبر حيث تعقد الثمار وتنمو لتعطي المحصول في يونيو ويوليو .

## التلقيح اليدوي للأزهار:

أزهار القشطة خنثى مبكرة المتاع - عديمة الرحيق ولذلك لا تجذب إليها الحشرات و يترتب على استحالة التلقيح بالدرجة التي تعطي محصولا تجاريا غير إجراؤه يدويا ، لهذا السبب فالتلقيح اليدوي من العمليات الهامة في بساين القشطة خصوصا في المناطق الجافة التي تقل فيها الرطوبة الجوية مما يعجل الجفاف المياسم وذبولها قبل أن يتاح لبعض حبوب اللقاح الاحتمالات الضئيلة للانتقال إلى المياسم بالوسائل الطبيعية ، مما يزيد من ضعف احتمالات التلقيح أن ظروف الجفاف في الجو الحار تعيق انتقال حبوب اللقاح بالوسائل الطبيعية كما تسرع من فقدانها لحيويتها وعموما فإن إجراء التلقيح اليدوي يزيد من المحصول في جميع مزارع القشطة ، لإجراء التلقيح اليدوي تجمع الأزهار التي نضجت وقاربت على التفتح (قبل انفراج البتلات) ويمكن تمييزها بلونها الأخضر الباهت أو الأبيض المائل للاخضرار - وذلك ساعة الغروب وتترك في مكان جاف حتى اليوم التالي

حيث تنتشر حبوب اللقاح ، وتبدأ عملية التلقيح اليدوي في الصباح وتوقف عندما تبدأ الحرارة في الارتفاع ثم تستأنف بعد الظهر عندما تميل الحرارة إلى الاعتدال ، وتستعمل فرشاة الرسم الرقيقة في توصيل حبوب اللقاح إلى المياسم بعد الضغط على البتلات بالأصابع لفتحها تسهيلا لوصول اللقاح ، وتكرر عملية التلقيح بالشجرة الواحدة مرة كل أربعة أيام حتى تضمن تلقيح معظم الأزهار التي تفتح متتابعة على طول موسم الإزهار .

### **الإثمار والمحصول:**

تبدأ أشجار القشطة في الإزهار بعد الغرس بنحو ٣ سنوات ويتزايد المحصول على توالي السنين ، ويبلغ متوسط محصول الشجرة بين ١٥ - ١٥ ثمرة سنويا عندما تبلغ ويستقر إنتاجها تبعا لحالة الأشجار وكفاءة التلقيح اليدوي ويكتمل نمو ثمار القشطة قلب الثور في يونيو ويوليو والبلدي من أواخر أغسطس حتى أكتوبر أما الهندي ففي أكتوبر ونوفمبر ، أما صنف عبد الرازق الشتوي وكذلك صنف فيني فيكتمل نموها في أكتوبر وتجري دراسات لتحديد مقاييس لقطف ثمار القشطة ، وقد جرت عادة زراع القشطة على عدم ترك الثمار لتنضج على الأشجار حتى لا تتشقق بل تجمع الثمار وهي متماسكة بعد أن تصل إلى اكتمال نموها ، ويجري إنضاج الثمار في هذه الحالة بالكمر في قش أرز جاف، وتستعمل حاليا غازات الأيثلين والأستلين في إنضاجها بنجاح .

## زراعة البرقوق



ينمو البرقوق بحالة برية في جهات كثيرة من المنطقة المعتدلة وهو أحد أنواع الفاكهة متساقطة الأوراق ذات النواة الحجرية والتي تشمل الخوخ والمشمش واللوز والكريز وتتبع العائلة وتقع تحت الجنس والثمرة حسلة وتتكون من كربة واحدة حيث يكون الإكسو كارب فيها قشرة الثمرة الرقيقة والميزو كارب (لب الثمرة) هو الجزء الذي يؤكل والإندو كارب (غلاف الثمرة الداخلي).

وهو عبارة عن النواة المتخشبة التي تحيط بالجنين وتحتوى الشار على مكونات غذائية هامة مثل الكربوهيدرات والأحماض العضوية والفيتامينات مثل فيتامين أ،

ب، ج .

## العوامل البيئية المناسبة

### العوامل المناخية:

تحتاج أصناف البرقوق الأوربي إلى برودة عالية خلال فصل الشتاء وذلك لإنهاء دور الراحة في براعمها ومن ثم لا تنجح زراعة هذه الأصناف ذات الشتاء الدافئ ، أما أصناف البرقوق الياباني فإن إحتياجاتها من البرودة قليلة بالمقارنة بالأصناف الأوربية (حوالي ٤٥٠ - ٤٠٠ ساعة أقل من ٧.٢ م) ولذلك فإن هذه الأصناف تنمو وتزدهر في المناطق ذات الشتاء الدافئ ، غير أنه يجب ملاحظة أن دفيئ الشتاء أكثر من اللازم يؤدي إلى عدم توفر ساعات البرودة اللازمة لخروج البراعم الزهرية والخضرية وعدم انتظامها مما يؤدي لعدم تداخل فترات التزهير للأصناف المختلفة وبالتالي عدم اكتمال عملية التلقيح والعقد وقلة المحصول لذلك يجب الرش بأحد المواد الكاسرة للسكون مثل مادة سيناميد الهيدروجين (لدورمكس) بمعدل ٢ لتر / ٦ لتر أو ١.٥ لتر + ٤ لتر زيت معدني صيفي لكل 6 لتر ماء مما يؤدي إلى التبكير في خروج البراعم وانتظام التزهير وتداخل فتراته للأصناف المختلفة وهذا يساعد على الحصول على محصول جيد وصفات ثمرة ممتازة مع ملاحظة أن يكون الرش وقت سكون البراعم وقبل تحركها بوقت كاف) قبل بداية التزهير بحوالي ٤٥ يوم (أي من الثلث الأخير من يناير إلى أول فبراير حسب ظروف المنطقة ومن الجدير بالذكر أن ثمار البرقوق تحتاج إلى حرارة معتدلة صيفاً للمساعدة على تلوين الثمار باللون الطبيعي الخاص بالصنف وكذلك سرعة النضج .

## التربة المناسبة:

يمكن لأشجار البرقوق أن تنمو بنجاح في أنواع مختلفة من التربة لتحملها رداءة التهوية لذا فإنه يزرع في أراضي أثقل نوعاً من باقي الفواكه ذات النواة الحجرية ولكن تجود زراعته في الأراضي الطينية الخفيفة جيدة الصرف حسنة التهوية الخالية من الأملاح والتي لا يزيد مستوى الماء الأرضي فيها عن ١.٥ م من سطح التربة حتى لا تصاب الأشجار بمرض التصمغ الفسيولوجي أما بالنسبة للأراضي الجديدة فيفضل الزراعة في الأراضي الصفراء والرملية الخالية من الملوحة والطبقات الصماء التي تمنع نفاذ الماء وتعمق الجذور .

## زراعة الشتلات بالمكان المستديم:

### أ- الزراعة في الأراضي القديمة:

تجهز أرض البستان جيداً قبل الزراعة عن طريق حرثها وتسويتها ومقاومة الحشائش وتحديد أماكن القنوات الرئيسية والمشايات وعمل مصدات الرياح في الأماكن المكشوفة .

تحفر الجور على مسافات ٥ × ٥ م (للأصناف القائمة النمو)، ٦ × ٦ م (للأصناف المنتشرة النمو) على أن تكون الجور باتساع ٧٠ × ٧٠ × ٥٠ سم مع إضافة ٢ مقطف من السماد البلدي المتحلل لكل جورة ١ + كجم سوبر فوسفات ١/٤ كجم كبريت زراعي ١/٤ + كجم سلفات نشادر .

يقلب السماد البلدي مع الكيماوي وناتج حفر الجورة جيداً ثم يعاد إلى الجورة مرة أخرى .

يتم تقليع الشتلات المطعومة من المشتل ملصا في شهر يناير وتقليم جذورها قليلاً خفيفاً بحيث تزال الجذور الجافة المريضة والملتوية والمكسورة والتي بها جروح مع تقصير الجذور الطويلة ثم يتم غمس المجموع الجذري في محلول مطهر مثل الريزولكس<sup>T</sup> أو الفيتافاكس بمعدل ٣ جم / لتر ماء .

يتم زراعة الشتلات في الجور بنفس العمق الذي كانت عليه بالمشتل ويراعى أن يكون ارتفاع الطعم ٤ - ١٠ سم من سطح التربة ويكون اتجاه منطقة التطعيم في الجهة البحرية حتى تقاوم الرياح .

تقرط الشتلة على ارتفاع ٧٠ - ١٥ سم من سطح التربة ويردم جيداً حول المجموع الجذري ثم تروى مباشرة بعد الزراعة ويتم دهان الجذع أسفل منطقة التطعيم بعجينة بوردو ثم توالى الشتلات بالري على فترات متقاربة حتى يثبت المجموع الجذري .

### بد الزراعة في الأراضي المستصلحة:

يجب أن تكون التربة خالية من الملوحة والطبقات التي تمنع نفاذ الماء وتسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضي في منطقة انتشار الجذور مما يؤدي لتدهورها وإصابتها بمرض التصمغ الفسيولوجي .

يتم زراعة مصدات الرياح قبل زراعة الشتلات بحوالي سنة أو سنتان على الأقل وتركب شبكة الري بالتنقيط .

يتم تشغيل مياه الري قبل حفر الجور بـ ٣ - ٢ أيام حتى يتم غسيل الأملاح وكذلك تسهيل عملية الحفر .

تحفر الجور على مسافات ٥ × ٤ أو ٦ × ٤ م على أن يكون الحفر باتساع ٦٠ × ٥٠ × ٥٠ م .

يتم وضع ٤ - ٢ مقطف سماد بلدي متحلل + نصف كيلو كبريت زراعي ١ + كجم سوبر فوسفات أحادي + ربع كجم سلفات بوتاسيوم + ربع كجم سلفات نشادر وتقلب جيداً وتوضع في الجورة ثم تغطى بالرمل وتروى .

**التسميد:**

تحتاج أشجار الفاكهة بصفة عامة إلى وجود العناصر الغذائية المختلفة في التربة بصورة متوازنة فزيادة تركيز البوتاسيوم يؤثر على امتصاص الماغنسيوم وزيادة الآزوت تؤثر على امتصاص البوتاسيوم ويمكن التعرف على حاجة الأشجار للتسميد عن طريقة تحليل الأوراق لتقدير محتواها من العناصر الغذائية وكذلك تحليل التربة ويلاحظ أن أشجار البرقوق تستجيب في تغذيتها لعنصر الآزوت بصفة رئيسية إلى جانب العناصر الأخرى مثل الفسفور والبوتاسيوم وبعض العناصر الصغرى مثل الحديد والزنك والمنجنيز ويجب مراعاة إضافة الأسمدة العضوية والكيماوية في المواعيد المناسبة وبكميات تتلائم مع نوع التربة وعمر الشجرة حتى يمكن الاستفادة منها بأقصى قدر ممكن .

### **التسميد في الأراضي القديمة:** **- التسميد العضوي:**

يضاف السماد العضوي بمعدل ٥-٧,٥ م<sup>٣</sup> للدنم (٤ - ٢ مقاطف / شجرة) أي بمعدل يتناسب مع عمر الشجرة وتكون الإضافة في آخر أكتوبر وخلال شهر نوفمبر نثراً حول الأشجار وعلى مسافة ٦ - ١٨ سم من جذع الشجرة

على أن يكون كامل التحلل وخالي من بذور الحشائش ويتم تقليبه في التربة بعد إضافة ١ كجم سوبر فوسفات + ربع كجم كبريت زراعي + ربع كجم سلفات نشادر لكل شجرة ثم تروى الأشجار رية غزيرة لتوفير الرطوبة اللازمة لتحلل السماد .

### - التسميد الأزوتي:

يضاف السماد الأزوتي بمعدل ٣ - ٢ كجم سلفات نشادر للشجرة / سنة (المعدل الأقل للشجرة من ٨ - ٤ سنوات والأكثر للشجرة أكبر من ٨ سنوات).

على أن تكون الإضافة على أربع دفعات وهي :

- دفعة عند بداية انتفاخ البراعم ١ / ٢ فبراير .

- دفعة عند تمام العقد آخر مارس .

- دفعة بعد شهر من الثانية أبريل .

- دفعة بعد جمع المحصول .

هذا ومن الجدير بالذكر أن حاجة الأشجار لهذا العنصر تكون كبيرة أثناء فترة

تحول الأزهار إلى ثمار - العقد .

### - التسميد البوتاسي :

تضاف سلفات البوتاسيوم بمعدل (١.٥ - ١ كجم / شجرة / سنة) ويكون

المعدل الأقل للشجرة من ٨ - ٤ سنوات والأكثر للشجرة أكبر من ٨ سنوات).

على أن تكون الإضافة على ثلاث دفعات وهي :

- دفعة مع السماد العضوي شتاءً .

- دفعة عند تمام العقد مارس .

- دفعة قبل الجمع بحوالي شهر مايو .

ويجب الاهتمام بالتسميد البوتاسي بنفس المعدلات المذكورة لأنه يلعب دوراً هاماً في تقليل تساقط الثمار وزيادة سرعة نضج الثمار وتحسين لونها وزيادة نسبة السكر بها .

- التسميد الفوسفاتي:

يضاف السوبر فوسفات بمعدل ٢ - ١ كجم / شجرة / سنة على أن تكون الإضافة في شهري أكتوبر ونوفمبر مع السماد العضوي .

- العناصر الصغرى:

إذا وجدت أعراض نقص لهذه العناصر مثل الزنك والحديد والمنجنيز فيجب رش الأشجار رشتين في أبريل ومايو ومرة ثالثة بعد جمع المحصول بما يلي ٤٠٠ جم حديد مخلبي ٥٠ + جم زنك مخلبي ٥٠ + جم منجنيز مخلبي ٥٠ + م بوركس ١٨ + جم يوريا على عبوة الموتور (١٥٠ لتر ماء) ويفضل في هذه الحالة استخدام الصورة المخلبية لهذه العناصر .

**معدلات التسميد لأشجار البرقوق:**

أ- التسميد في الأراضي الجديدة:

- التسميد العضوي:

يضاف بنفس المعدلات السابق ذكرها في الأراضي الطينية وفي نفس الميعاد إلا أن الإضافة تكون في جور أو خنادق على جانبي الأشجار على أن تغير

الاتجاهات سنوياً وتكون على عمق ٥٠ - ٤٠ سم ويفضل أن يكون من الكمبوست المصنع من مخلفات نباتية لضمان خلوه من بذور الحشائش والإصابات المرضية والحشرية .

### - التسميد النيتروجيني:

تضاف سلفات النشادر بمعدل ٣.٥ - ١ كجم / شجرة / سنة حسب عمر الشجرة (في الفترة من فبراير إلى آخر سبتمبر على أن تكون الإضافة على دفعات متساوية بمعدل ٣ : ٢ مرات في الأسبوع على أن يضاف ثلثي المقرر في الفترة من فبراير إلى يونيو والباقي بعد جمع المحصول وحتى نهاية سبتمبر .

### - التسميد البوتاسي:

تضاف سلفات البوتاسيوم بمعدل ٠.٥ - ٢ كجم / شجرة / سنة حسب عمر الشجرة (مع دفعات التسميد الأزوتي مع ملاحظة أن تضاف ثلثي الكمية قبل جمع المحصول والباقي بعد الجمع .

### - التسميد الفوسفاتي:

يضاف بمعدل ١٨ سم حمض فوسفوريك / شجرة / سنة على دفعات أسبوعية في السباد من فبراير إلى آخر يونية .

### - العناصر الصغرى:

ومن أهمها الحديد والزنك والمنجنيز وتضاف رشاً في صورة مخلبية بمعدل ثلاث مرات خلال شهر أبريل ومايو ومرة ثالثة بعد جمع المحصول بمعدل ٤٠٠ جم حديد مخلبي + ٢٠٠ جم زنك مخلبي + ٢٠٠ جم منجنيز مخلبي + 150 جم

يوربا / ١٥٠ لتر ماء مع إضافة البوراكس للأراضي التي تروى غمر بمعدل 4 - 5 جم للشجرة في موعد إضافة الخدمة الشتوية .



## الري

### الري في الأراضي الطينية:

١. في الأشجار الصغيرة يكون الري داخل بواكى وتكون فتراته متقاربة خصوصاً في فصل الصيف فيكون كل ثلاثة أيام تقريباً في الأراضي الخفيفة وكل خمسة أيام في الأراضي الطينية حين ثبات الشجرة جيداً في التربة ثم تتباعد فترات الري بعد ذلك .
٢. في حالة الأشجار المثمرة تكون الري الأولى في فبراير وتكون غزيرة وذلك استعداداً لدفع البراعم للتفتح وبدء النشاط في الربيع ويراعى أن يكون الري بعمل باكية عمالة وأخرى بطالة أو بعمل حلقات

حول جذوع الأشجار حتى لاتصل المياه إلى جذع الشجرة وتصاب بالصمغ .

٣. إيقاف الري أثناء فترة التزهير حتى لا تتساقط نسبة كبيرة من الأزهار وفي حالة الضرورة القصوى فيكون الري تجرية على الحامي .

٤. توالى الأشجار بعد ذلك بالري حسب حالة الجو - موسم النمو - نوع التربة - بحيث تتوافر الرطوبة المناسبة طوال فترة عقد الثمار ومراحل النمو المختلفة مع مراعاة عدم المغالاة في الري حتى لا تسبب الرطوبة الزائدة في تدهور الأشجار وتعفن الجذور.

٥. تقليل معدلات الري تدريجياً قبل وصول الثمار إلى مرحلة اكتمال النمو بحوالي ٤-١٠ يوم حتى لا تصبح الثمار عصيرية لا تتحمل النقل والتداول .

٦. لا يجب منع الري بعد جمع المحصول لأن ذلك يسبب ضعف الأشجار وتكوين براعم زهرية غير كاملة في الموسم التالي ولكن يجب إطالة الفترة بين الريات تدريجياً مع انخفاض درجات الحرارة .

٧. يوقف الري نهائياً في ديسمبر ويناير استعداداً لدخول الأشجار في دور الراحة .

## بد الري في الأراضي المستصلحة:

١. يكون الري تحت نظام التنقيط على فترات متقاربة خصوصاً في فصل الصيف وتتباعده فتراته خلال فصلى الخريف والشتاء ويراعى في ذلك عمر الأشجار - نوعية مياه الري وظروف التربة في تحديد زمن الري وفتراته .

٢. من بداية موسم النمو وحتى نهاية أغسطس يتم الري يومياً أو يوم بعد يوم .

٣. من أول سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر يتم إبعاد فترات الري بالتدريج فيكون بمعدل مرتين في الأسبوع ثم مرة واحدة ثم مرة كل عشرة أيام .

٤. في شهر نوفمبر يكون الري مرة كل ٤-١٠ يوم حسب ظروف التربة والظروف الجوية .

٥. في شهري ديسمبر ويناير يكون الري مرة كل ٤ - ٥ يوم حسب ظروف التربة والجو .

ويلاحظ أنه يجب إطالة فترات الري أثناء تزهير الأشجار وحتى تمام العقد بما يتناسب مع ظروف المزرعة .



## التقليم:

يعتبر التقليم أحد العمليات الزراعية الهامة لأشجار البرقوق لتأثيره على صفات الثمار وكمية المحصول ويجب على القائم بعملية التقليم أن يكون على معرفة تامة بطبيعة نمو الشجرة وطبيعة الحمل والإثمار حتى يتمكن من إجراء هذه العملية بطريقة صحيحة حيث يتم الحمل والإثمار في أشجار البرقوق على دوابر قصيرة تعرف بالدوابر الثمرية (الدبابيس) وتحمل هذه الدوابر على الخشب القديم) عمر سنتين أو أكثر ويكون حمل الثمار جانبياً على هذه الدوابر ، ويمثل أغلب المحصول ويصل عمر الدابرة إلى ٧ - ٥ سنوات ما لم تكن هناك إصابات حشرية أو مرضية كما تحمل الثمار جانبياً أيضاً على أفرع عمر سنة بنسبة قليلة .

## أهمية التقليم:

١. بناء هيكل قوى للأشجار مما يطيل من مدة بقائها كما يسهل إجراء العمليات الزراعية المختلفة .
٢. توزيع دوابر الإثمار على جميع أجزاء الشجرة توزيعاً منتظماً .
٣. المساعدة على تنظيم الإنتاج السنوي بالإقلال من تأثير ظاهرة تبادل الحمل .

- ٤ . التخلص من الآفات والأمراض عن طريق إزالة الأجزاء المصابة والميتة
- ٥ . الحصول على ثمار عالية الجودة من حيث الطعم واللون والحجم .
- ٦ . إيجاد توازن بين النمو الخضري والثمري .
- ٧ . الحصول على أشجار ذات شكل مناسب يسهل معه إدارة المزرعة بأقل تكاليف .

وينقسم التقليم في أشجار البرقوق إلى قسمين هما تقليم التربة وتقليم الإثمار

كالتالي:

### أولاً : تقليم التربة:

يهدف هذا النوع من التقليم إلى الحصول على الشكل المرغوب للأشجار وبناء هيكل قوى لها خلال السنوات الأولى من عمرها أي قبل الوصول إلى مرحلة الإثمار ومن أهم الطرق الشائعة في تربية أشجار البرقوق الطريقة الكأسية المفتوحة وطريقة القائد المحور إلا أن الطريقة الكأسية المفتوحة هي الأكثر شيوعاً .

#### ١- الطريقة الكأسية المفتوحة:

في هذه الطريقة يتم قرط الأشجار بعد زراعتها في المكان المستديم على ارتفاع ٦٠-٧٥ سم من سطح التربة وتزال باقي الأفرع الجانبية وإن وجدت منها بعض الفروع القوية ينتخب فرع أو أكثر منها وتقصر بطول مناسب لقوة نموها .

#### التقليم الشتوي الأول:

وفيه يتم انتخاب ٤ - ٣ أفرع أساسية قوية على الساق الرئيسية بحيث يبدأ التفريع على ارتفاع ٤٠ سم من سطح الأرض وتكون موزعة توزيعاً منتظماً وتبعد

عن بعضها مسافة ٤ - ١٠ سم وتقرط هذه الأفرع بطول يتناسب مع قوتها ويزال ما عداها .

### **التقليم الشتوي الثاني:**

وفيه يتم ترك ٣ - ٢ أفرع ثانوية على كل فرع رئيسي بحيث تكون هذه الأفرع متبادلة الوضع وفي اتجاهات مختلفة خارج الشجرة وليست متجهة إلى قلب الشجرة وتقرط هذه الأفرع بطول يتناسب مع قوتها مع ملاحظة إزالة الأفرع التي تظهر أسفل الفروع الرئيسية أو بينها وبذلك يكون قد تم تكوين الهيكل الأساسي للشجرة

### **التقليم الشتوي الثالث والرابع:**

وفيه تزال الأفرع المتشابكة والمتزاحمة بحيث لا يبقى على الأفرع الرئيسية غير الأفرع الثانوية المنتخبة من العام السابق مع المحافظة على فتح قلب الشجرة مفتوح ، هذا وتبدأ أشجار البرقوق في الإثمار بعد أربع سنوات من زراعتها في المكان المستديم وذلك طبقاً لظروف التربة والعناية بها .

### **٢- طريقة القائد الوسطى المحور:**

وهذه الطريقة تجمع بين مزايا الشكل الطبيعي والكأسي والأساس النظري لهذه الطريقة هو الحد من نمو الفرع الوسطى الأكبر سنًا والاستناد إلى فرع جانبي أقل عمراً وأكثر انفتاحاً في زاوية تفرعه وإعطائه السيادة الفعلية للنمو وفي هذه الطريقة يتم تقصير الشتلة عند زراعتها في المكان المستديم إلى ارتفاع ١٥ - ٦ سم من سطح التربة وفي السنة التالية تقلم الفروع الجانبية لتبقى منها أربعة فقط ويترك العلوي منها لينمو إلى أعلى أما الأفرع السفلية فتقصر بطول لا يزيد عن ١٥ سم وفي الشتاء التالي يتم اختيار القائد المحور الذي يحل محل القائد الوسطى من العام

السابق على أن يكون أطول من الأفرع الجانبية الأخرى حتى تكون له السيادة الفعلية وعندما تصل الشجرة إلى الارتفاع المطلوب (تلغى سيادة الفرع القائد) أي يقصر ولا يجدد قائد جديد .

### ثانيا : تقليم الإثمار في أشجار البرقوق:

عند إجراء تقليم الإثمار في أشجار البرقوق يجب توفير النموات الصيفية القوية باستمرار حتى يمكن انتخاب ما يصلح منها للتقليم الشتوي ليحل تدريجياً محل الأفرع التي انتهت إثمارها واستهلك دوابرها وبذلك يضمن المزارع لأشجاره الاستمرارية في الإثمار المنتظم الجيد عاماً بعد عام دون توقف وتحتاج أشجار البرقوق إلى تقليم إثمار متوسط الشدة ويشمل تقصير وخف ويجري سنوياً في موسم الشتاء خلال شهر يناير وحتى الأسبوع الأول من فبراير ففي حالة تقليم التقصير تقصر الأفرع التي يتم اختيارها إلى الربع أو الثلث حسب قوة نموها فيساعد ذلك على تكوين دوابر الإثمار على الجزء المتبقى ، أما تقليم الخف فتزال فيه الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة والأفرخ المائية بدرجة تسمح بتخلل أشعة الشمس والهواء إلى جميع أجزاء الشجرة مع مراعاة أنه في الأصناف التي يكون نموها قائماً (سانتاروزا - هوليد - ويكسون) يجب فتح قلب الشجرة لضمان التفريع المفتوح أما في حالة الأصناف المفترشة النمو (ياباني - بيوتى) فيجب اختيار النموات القائمة للحد من النمو المتهدل الذي يعوق العمليات الزراعية المختلفة ويجب مراعاة أن يكون التقليم خفيفاً في حالة الأشجار الصغيرة أما التقليم الجائر فلا يستخدم إلا في حالة تجديد شباب الشجرة الكبيرة حتى تتكون أفرع ثمرية جديدة

تحل محل الأفرع المسنة كذلك يجب أن يراعى أثناء التقليم التحكم في ارتفاع الشجرة عن طريق تقليم الأفرع الطويلة إلى أفرع جانبية قوية ويكون اتجاهها للخارج .

### بعض الملاحظات الواجب مراعاتها عند التقليم:

- ١ . إجراء التقليم أثناء موسم السكون وقبل تفتح البراعم .
- ٢ . معرفة طبيعة الحمل والتزهير للصنف المراد تقليمه .
- ٣ . عدم ترك كعوب عند إزالة الأفرع حتى لا تبطئ من التأم الجروح .
- ٤ . إزالة الأفرع المكسورة والمصابة بإصابات حشرية والتخلص منها بالحرق حتى لا تكون مصدراً للإصابة بالأناريسيا وخنافس القلف .
- ٥ . رش الأشجار بعد التقليم بمحلول مطهر مثل أكسى كلورور النحاس بمعدل ١٢٥ جم / ٦ لتر ماء ودهان مكان قرط الأفرع بعجينة بوردو أو الشمع الأسكندراني .
- ٦ . استعمال أدوات تقليم حادة .

### العزيق :

يحتاج بستان البرقوق إلى حوالي ثلاث عزقات وذلك للمحافظة على خصوبة التربة والتخلص من الحشائش فتكون العزقة الأولى بعد إضافة السماد العضوي والانتهاء من عملية التقليم وهذه العزقة تكون عميقة أما العزقة الثانية فتكون في أوائل الصيف وتكون سطحية أما الثالثة فتكون بعد جمع المحصول وتكون سطحية أيضاً لعدم الإضرار بالشعيرات الجذرية وهي ضرورية لإعداد الأشجار للدخول

في دور الراحة وهي في حالة غذائية جيدة أما الأراضي الجديدة فيجب إزالة الحشائش من محيط الشجرة بصفة دائمة .

## **قطف وتخزين ثمار البرقوق:**

### **قطف الثمار:**

لقطف وتخزين ثمار البرقوق يجب معرفة طبيعة الثمرة حيث أن ثمرة البرقوق هي ثمرة حسلة - نصف غضة تحتوى على نسبة كبيرة من الماء لذا فإنها ثمرة قابلة للتلف تحتاج لعناية خاصة أثناء الجمع والتخزين .

### **ميعاد القطف:**

تقطف ثمار البرقوق عند وصولها إلى مرحلة اكتمال النمو .

النضج البستاني (وهي تلك المرحلة التي يمكن أن تقطف فيها الثمار من على الأشجار ويمكنها بعد ذلك القيام بجميع وظائفها الفسيولوجية والوصول إلى الحالة الأكلية بعيداً عن الشجرة وتختلف ثمار البرقوق في الفترة التي تستغرقها للوصول إلى هذه المرحلة ويرجع ذلك لاختلاف الظروف الجوية واختلاف عوامل التربة والأصل المستخدم والصنف وظروف الخدمة لذا فإن الثمار تظهر في الأسواق على فترات مختلفة .

**أهم العلامات التي تدل على وصول الثمرة إلى مرحلة اكتمال النمو:**

- التغير في اللون الأساسي للثمرة من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر حسب الصنف .

- سهولة فصل الثمرة من على الشجرة ويرجع ذلك لتكوين طبقة الانفصال بين الثمرة وعنقها .

- زيادة نسبة المواد الصلبة الذائبة وهذه النسبة تختلف باختلاف الصنف .

- قلة نسبة الحموضة عند القطف التي تختلف باختلاف الصنف أيضاً -  
التغير في الصلابة التي تقل عند وصول الثمرة لمرحلة اكتمال النمو وتختلف باختلاف الصنف .

- عدد الأيام من التزهير الكامل وحتى اكتمال النمو وتختلف كذلك باختلاف الصنف .

هذا ويجب مراعاة قطف الثمار بعد زوال الندى حتى لا تتعرض للخدش والإصابة بالفطريات كما يجب تجنب سقوط الثمار على الأرض حتى لا تخدش وبالتالي تزيد نسبة التلف منها .

## **طرق قطف الثمار:**

### **القطف اليدوي:**

ويكون ذلك عن طريق مسك الثمرة باليد ولفها ويستحسن في هذه الحالة لبس قفاز يدوي حتى لا تخدش الثمار .

### **القطف بمقصات :**

وذلك باستعمال مقصات خاصة غير مدببة الطرف وتتميز هذه الطريقة بتفادي خدش الثمرة في مكان القطع ولكن يعاب عليها بطء عملية الجمع ولكن الجمع اليدوي هو من أكثر الطرق استخداماً في جمهورية مصر العربية وأسهلها ، وبعد عملية القطف تعباً الثمار في سلال صغيرة مبطنه ملساء أو صناديق من البلاستيك ثم تنقل إلى مكان ظليل في المزرعة لإجراء عملية الفرز والتدريج مع عدم خلط الأصناف حتى لا تقلل من قيمتها الاقتصادية .

### **الفرز والتدريج:**

تفرز الثمار لاستبعاد المجروح والزائد في النضج والمصاب ثم تدرج حسب الحجم واللون إلى ٣ - ٢ درجات .

### **التعبئة:**

تعبأ الثمار بطريقة تؤكد حمايتها أثناء التداول فترص في صناديق من الكرتون سعة ٣-٥ كجم أو في أقفاص من الجريد المبطن بالورق المثقب أو في أطباق من الفوم الأبيض وتغطى بالبولي إيثيلين المثقب .

## التخزين:

وهو عبارة عن عملية حفظ الثمار بحالة طبيعية لحين استهلاكها أو بيعها في وقت متأخر لذا فإنها تخزن على درجة (- 1° م) ورطوبة ٩٠٪ لمدة تتراوح ما بين ٨ - ٣ أسابيع حسب الصنف .

### الأسباب التي تؤدي لتدهور أشجار:

- عدم العناية بتربية الأشجار خلال السنوات الأولى من عمرها .
- عدم العناية بتقليم الإثمار قليلاً يتناسب مع طبيعة الحمل .
- الاعتماد على صنف البيوتي كملقح للياباني بالرغم من أن هذين الصنفين لا يتفقان في مواعيد تزهيرهما في بعض السنين لذا يجب زراعة أكثر من ملقح بالمزرعة الواحدة .
- عدم ري الأشجار بعد جمع المحصول وحتى قرب نهاية دور الراحة مما يضعف من حيويتها ويسرع من تدهورها .
- تعرض أصناف البرقوق المزروعة لشتاء دافئ مما ينتج عنه عدم انتظام التزهير وتداخل فتراته وبالتالي عدم إتمام التلقيح وقلة المحصول لذلك يجب الرش بأحد المواد الكاسرة للسكون بالتركيز المناسب وفي الميعاد المناسب .
- عدم الالتزام بالبرنامج الموصى به للتسميد ومقاومة الآفات .

## التحميل :

حيث يصير أغلب المزارعين على تحميل البرسيم والخضر والحمضيات تحت أشجار البرقوق وهذه المحاصيل تتعارض في احتياجاتها المائية والسمادية مع المحصول .

## الإكثار:

### ١- الإكثار بالبذرة:

تستخدم هذه الطريقة لإنتاج أصول للتطعيم عليها أو في برامج التربية لإنتاج أصناف جديدة لأنها تنتج أشجار تختلف كثيراً أو قليلاً فيما بينها سواء في التركيب الوراثي أو صفات النمو الخضري والشمري كما تختلف عن نبات الأم وهذه الطريقة تتبع في إكثار برقوق الميروبلان وفيها توضع البذور بين طبقات مندة من الرمل الناعم أو البيت موس وتحفظ في الثلاجة على درجة 5° م لمدة تتراوح بين ١٥ - ٩٠ يوماً ثم تزرع البذور بعد ذلك في شهر مارس وتبدأ في الإنبات بعد ٣ - ٢ أسابيع من الزراعة وتبقى في المشتل لمدة عام ثم تطعم في الربيع التالي وتبقى عام آخر في المشتل تنقل بعده إلى المكان المستديم .

### ٢- الإكثار بالعقلة:

تستخدم هذه الطريقة في إكثار برقوق الماريانا والميروبلان ٢٩ سى حيث تأخذ العقل من الخشب الناضج عمر سنة من أفرع سليمة قوية ويكون ذلك أثناء موسم السكون ويجب أن يكون القطع السفلى أفقياً وأسفل العقدة مباشرة أما القطع العلوي فيكون مائلاً وأعلى العقدة ثم يتم تخزينها في مرقد جيدة الصرف

بوضعها أفقية أو مقلوبة حتى يتكون الكالوس ثم تزرع في أرض المشتل في شهر مارس وتكون الزراعة في الثلث العلوي من الخط يتم وضع العقلة بميل ويظهر منها برعمان ثم تثبت التربة جيداً حولها وتروى مباشرة .

### ٣- التطعيم بالعين:

يستخدم في البرقوق التطعيم بالعين بعدة طرق وهي :

#### أ- التطعيم الدرعي:

وفيه يتم فصل البراعم بجزء من قلف الطعم على شكل درع ويعمل شق في الأصل على شكل حرف T يوضع فيه الدرع ويربط ربطاً محكماً بشرائط من البولي إيثيلين ، وتعتبر هذه الطريقة من أهم الطرق الشائعة في إكثار البرقوق وتجري في شهري يوليو وأغسطس .

#### ب- التطعيم بالكشط:

وفيه يتم فصل البرعم ومعه جزء من الخشب ثم يعمل مكان مناسب في الأصل يوضع فيه البرعم ويثبت بالبولي إيثيلين وتتميز هذه الطريقة بإمكانية إجرائها وقت بدء سريان العصارة خلال شهر فبراير .

#### ٤- التطعيم بالقلم:

وفيه يتم تركيب قلم يحتوى على عدة براعم (الطعم) على جزء آخر هو الأصل ومن أنواع التراكيب المختلفة التركيب السوطى واللساني والتركيب بالشق إلا أن التركيب السوطي هو من أكثر الطرق انتشاراً وفيه تؤخذ الأقلام من أشجار قوية النمو ذات إثمار جيد مثلة للصنف المراد إكثاره على أن تكون من المنطقة الوسطية من الفرع وبطول ٤ - ٥ سم ثم يبري كل من الأصل والطعم برية واحدة بحيث يكون القطع مائلاً وبطول ٧ - ٥ سم ويكون اتجاه بريه من أسفل إلى أعلى

وعكس ذلك في الطعم كما يجب أن تكون السطوح المقطوعة ملساء حتى يسهل الالتحام وتطبق برية الأصل على برية الطعم وتربط جيداً برباط التطعيم مع ملاحظة إجراء هذا النوع من التطعيم قبل بداية سريان العصارة مباشرة (نهاية الشتاء وبداية الربيع) وغالباً ما يكون ذلك خلال شهري فبراير ومارس .

**الشروط الواجب توافرها في الطعم:**

أن تؤخذ الطعوم من أمهات مثمرة مطابقة للصنف .

تؤخذ من أفرع عمر سنة متوسطة السمك .

أن تكون الأمهات خالية من الفيروس .

تستبعد الأجزاء الطرفية والقاعدية مع ضرورة إزالة الأوراق وترك جزء من

العنق .

ومن أهم أبحاث قسم بحوث الفاكهة المتساقطة في هذا المجال أنه أمكن الحصول على شتلات مطعومة من صنف البيوتى صالحة للزراعة خلال عام واحد وذلك عن طريق تطعيم عقل الماريانا الخشبية (كأصل لصنف البرقوق البيوتى) بطريقة التطعيم اللساني خلال شهر ديسمبر بعد معاملة قاعدة هذه العقل بـ ٧٥ جزء في المليون من مادة إندول بيوتريك " أسير " ثم تخزين هذه العقل في صناديق خشبية بها خليط من البيت موس ونشارة خشب بنسبة 1 : 1 على الأصل ثم يوضع طمي على الطعم حتى الأسبوع الأول من مارس وزراعتها بعد ذلك في خطوط المشتل .

## زراعة التفاح

### المناخ المناسب:

تحتاج أصناف التفاح إلى جو بارد بشكل عام أو معتدل، ولا تجود زراعته في المناطق الحارة.

### الأرض المناسبة:

يمكن زراعة التفاحيات في أي نوع من الأراضي بشرط قلة الأملاح الضارة بها وجودة تسميتها غير أن الكمثري أكثر تحملاً للملوحة وارتفاع مستوى الماء الأرضي عن التفاح ولا تتحمل الكمثري والتفاح ارتفاع الكالسيوم والقلوية بالتربة حيث تصاب بالإصفرار الجيري.

### خدمات ما بعد الزراعة:

مقاومة الحشائش بالعزيق وتعتبر عملية مكلفة وتستخدم العزاقات في كثير من المزارع إذا أمكن مرورها بين صفوف الأشجار وغالبا تجري عزقة شتوية عميقة أثناء فترة السكون، وتستخدم مبيدات الحشائش باحتراس عند الحاجة وفي حالة انتشار الحشائش النجيلية تستخدم مادة رواند أب (اللانسر) أو الفيزوليت ٢ - ٣ كيلو للدنم خلال شهر أبريل ومايو أما عند انتشار الحشائش الحولية تستخدم مادة الجرامكسون (١ لتر للدنم).

### الري :

في الأراضي الطينية يستعمل غالبا الري بالغمر إما بطريقة البواكي مع الأشجار الصغيرة أو الأحواض العادية والمعدلة مع الأشجار الكبيرة ويمنع الري في فترة الشتاء وتبدأ الري الأولى عقب السدة الشتوية مباشرة في فبراير وتكون

غزيرة أما أثناء موسم التزهير فتجري عملية الري باحتراس حتى لا يتساقط العقد والأزهار ... أما أثناء موسم نمو الثمار فتروي الأشجار عند الحاجة ويلاحظ عدم الإسراف في الري خصوصا في المناطق المعرضة لأمراض اللفحة حيث أن زيادة الري يؤدي إلى زيادة الإصابة بها .

### **الأراضي الجديدة :**

غالبية الأراضي الجديدة المستصلحة رملية ويستخدم معها الري بالتنقيط وقد سبق دراسة هذا الموضوع بالتفصيل في العام السابق ويراعي عند ري الأشجار أن تعيط يوميا أو كل يومين على الأكثر الكمية المحسوبة بدقة من الماء المذاب فيه الأسمدة مع مراعاة أن لا يقل الماء في منطقة الجذور على أن تكون الرطوبة الأرضية حول الجذور أعلى من نقط الذبول الدائمة ولا تزيد عن السعة الحقلية ، تزداد كمية الماء في الأشهر التي يزيد فيها البخر والنتج وتكون غالبا في مصر في شهري مايو ويونيو وتقل الكمية للحد الأدنى في أثناء سكون الأشجار وتحسب كمية الماء التي تضاف للشجرة من جداول خاصة يراعي فيها علاوة على النقطتين السابقتين مدى انتشار جذور الشجرة وحجم النمو الخضري - تركيب التربة، ويجب أن يكون عدد النقاطات حول الشجرة ذات تصرف يسمح بإعطاء كمية الماء للشجرة في وقت قصير ويمكن أيضا أن تخرج منها كمية الماء المطلوبة للشجرة في حالة ما تصل إلى أقصى إحتياجات مائية (شجرة بالغة في الأشهر التي يزيد فيها التتح).

## التسميد :

تسمد أشجار التفاح والكمثري والسفرجل بالأسمدة العضوية بمعدل ٣,٧٥ - ٤,٢٥ م٣ سماد بلدي قديم متحلل خلال الخريف وأوائل الشتاء وتسمد بالأسمدة الأزوتية بمعدل ١٥ - ٢٠ كغم للدم، وتضاف على دفعتين الأولى قبل التزهير في منتصف فبراير والثانية بعد تمام العقد خلال أبريل أو مايو وكما تنصح بإضافة دفعة ثالثة من الأسمدة الأزوتية بمعدل ٥ كجم أزوت صافي للدم خلال شهري يوليو وأغسطس لتشجيع تكوين البراعم الزهرية للعام التالي ، وتسمد بالأسمدة الفوسفاتية بمعدل ٤ كجم فو أ عند إضافة السماد العضوي شتويا كما يضاف سلفات البوتاسيوم مع الدفعة الأولى من الأسمدة الأزوتية بمعدل ٤٠٠ جرام بو - أ، للشجرة الواحدة أما الأشجار الصغيرة فيتم تسميدها بالأسمدة الأزوتية بما يعادل نصف الكمية المضافة إلى الأشجار البالغة وذلك خلال السنوات الثلاثة الأولى من زراعتها كما يضاف ٣ / ٢ الكمية إلى الأشجار عمر ٣ - ٥ سنوات شهريا على دفعات متساوية خلال موسم النمو من مارس إلى سبتمبر ، أما عند استخدام الري بالتنقيط في بستان أشجار التفاح والكمثري والسفرجل تسمد بنصف القيمة المضافة في التسميد بالغمر السابق مع إتخاذ الإحتياطات الواجب مراعاتها في الري التسميدي كما سبق .

## تربية وتقليم الأشجار :

تربي الأشجار المطعومة على أصول منشطة بالطريقة الكاسية في الكمثري وطريقة القائد الوسطى المحور في التفاح ، أما المطعومة على الأصول المقصرة وتصف المقصرة فتربي بالطريقة المغزلية أو طريقة الهرم الصغير ... يجري التقليم الشتوي أثناء سكون الأشجار بإزالة الأفرع المتزاحمة والمصابة مع مراعاة قص الأفرع بطريقة تشجع من تكوين الدواير الثمرية ، يلجأ للتقليم الصيفي بإزالة السرطانات باستمرار ويجري مع التفاح لإضعاف النمو الخضري للأشجار الزائدة النمو حتى لا يؤثر على تكوين البراعم ويعطي فرصة كافية لإضاءة الأشجار .

## التكاثر :

يطعم التفاح في المشتل على سلالات خضرية يجري إكثارها أما بالترقيد أو العقلة .

يلجأ البعض لاستعمال الأصول البذرية لخصتها إلا أنه يعاب عليها :

١ - غير متماثلة .

٢ - تتأخر في الإثمار .

٣ - درجة إصابتها بالأمراض والآفات غير معروفة .

إما الكمثري تتكاثر غالبا على أصول بذرية من أصل الكمثري الأوربية مثل

الكميونس ويعاب عليها :

١ - شدة الإصابة بمرض اللفحة النارية .

٢- عدم تماثل الأشجار .

٣- تأخر الأشجار المطعومة عليها في الإثمار .

ومن أحسن الأصول استخداما للمناطق الحارة أصل الكلاريانا ويمتاز بمقاومته لمرض اللفحة النارية وهو أصل منشط ولكن شديد الحساسية لزيادة نسبة الجير .

وقد استعمل أصل السفرجل الذي يتكاثر بالعقلة إلا أنه توقف الآن استعماله نتيجة للأسباب الآتية :

١- عدم موافقته للطعوم المطعومة عليه .

٢- شدة إصابته بمرض اللفحة النارية .

٣- عدم ملائمة لارتفاع قلوية التربة .

### الملقحات :

غالبية أصناف الكمثري والتفاح عقيمة ذاتيا أي لا تعقد ثمارا إلا إذا توفرت ملقحات في البستان أحيانا تكون هذه الأصناف ثمارا دون تلقيح وهو ما يعرف بالعقد البكري ، وفي هذه الحالة يكون المحصول منخفض أقل جودة في الصفات من الثمار الناتجة من عملية التلقيح والإخصاب والمتكون بها بذور، ويجب أن تتوفر الملقحات في البستان بنسبة ٨ : ١٠٪ على الأقل كما يجب توفير طائفتين من النحل لكل دنم للمساعدة على عملية التلقيح و أهم الملقحات هي : دورست جولدن - عين شامير - برخر الأحمر . وأهم ملقحات الكمثري : الصنف هود .

مسافات الغرس : التفاح : تتوقف مسافات الغرس في التفاح على الأصل المستخدم كالآتي :  $5 \times 5$  م في حالة الأصول المنشطة  $3 \times 4$  م في حالة الأصول النصف منشطة  $2 \times 4$  م في حالة الأصول المقصرة أما الكمثري :  $4 \times 4$  م و السفرجل :  $3.5 \times 3.5$  م في الأراضي الخفيفة ،  $5 \times 5$  م في الأراضي الطمية على أن تخفف الأشجار عند ازدهامها : موعد الزراعة : بالنسبة للتفاح خلال شهر يناير والسفرجل والكمثري شهر فبراير ، طبيعة التزهير : تتكون أزهار التفاح والكمثري من براعم مختلطة تحمل في نورات محدودة على قمة دوابر قصيرة أو أفرع عمر سنة في التفاح وعلى قمة دوابر متوسطة الطول في الكمثري .

### الخف :

تحمل أشجار التفاح في حالة توفر الملقحات كمية كبيرة من العقد مما يؤثر على حجم الثمار عند النضج كذا يؤثر على الحالة الصحية للأشجار لذا يجب هذا العقد وترك العدد الذي يناسب النمو الخضري للشجرة وتجري عملية الخف يدويا في أوائل أبريل حيث يترك ثمرتين فقط على الدابرة وإزالة الباقي باحتراس، يمكن إجراء هذه العملية كيمياويا باستخدام مركبات خاصة إلا أن هذه العملية خطيرة قد تؤدي إلى إضاعة المحصول بأكمله .

### الآفات:

يصيب الكمثري الآفات التالية - : أمراض اللفحات الكبترية - البياض - التشقق - التفحم التاجي .

- حشرات حفار ساق التفاح - المن - الذبابة البيضاء - الحشرات القشرية .
- آفات حيوانية أخرى : النيماتودا - الجرزان - الأكاروسات .

### أما الأمراض تصيب التفاح :

البياض - الجرب - التشقق - أعفان الجذور . الحشرات : حفار ساق التفاح - حفار التفاح - رائق الأجنحة - الجعال . المن - الذبابة البيضاء - حشرة التين الفنجانية - الحشرات القشرية ، ويتم دراسة تاريخ وحياة هذه الآفات ومقاومتها في مقررات أخرى . أما من الناحية البستانية فننصح بتشجيع انتشار الكائنات التي تتطفل أو تفرس هذه الآفات واستخدام الطريقة المتكاملة لمقاومة الآفات مع الحد من استخدام المواد الكيماوية إلى أقل درجة ممكنة .

### زراعة الرمان



الرمان من فواكه المنطقة تحت الاستوائية المتساقطة الأوراق .  
والرمان شجر مشمر من الفصيلة الآسية وثمرته الرمانة تتميز بحبوبها الحمراء اللؤلؤية، وزهره أحمر قان جميل يدعى الجلنار، والرمان على ثلاثة أنواع : حلو

وحامض ومزّ معتدل، وتختلف خصائصه باختلاف أنواعه. فالخلو يحتوي على السكاكر (٧ ٪) والماء ٨١ ٪ والبروتين ٠.٦ ٪ والدهن ٠.٣ ٪. كما يحتوي على ألياف بنسبة ٢ ٪ وعلى مواد عفصية كالتالين ومواد مرّة وعلى حمض الليمون ١ ٪ وعلى مقادير ضئيلة من الأملاح المعدنية وخاصة الحديد والفوسفور والكبريت والكلس والبوتاس والمنغنيز وعلى نسبة جيدة من الفيتامين " ث. " C \_ وفي الرمان الحامض تقل نسبة السكاكر وترتفع نسبة حمض الليمون حتى ٢ ٪ فهو موجود في الرمان أكثر من الليمون نفسه، وترتفع في بذوره نسبة البروتين إلى ٩ ٪ والدهن ٧ ٪ ، والرمان غذاء تمد كل ٦ جرام من الرمان بقراءة ١١٥ سعراً حرارياً، وإن كان الرمان قليل المحتوى من الفيتامينات إلا أنه يحوي المعادن، وهو مصدر جيد للسكريات، وتصل نسبة فيتامين ج «C» في عصير الرمان البلدي إلى حوالي ١٠ مليجرامات كل ٦ جرام من العصير، ويوجد في كل ٦ جرام من حبوب الرمان المواد الغذائية التالية: كالسيوم ٨ مليجرام، بروتين ١.٣ جرام، فسفور ٥ مليجرام، دهن ٠.٨ جرام، حديد ٠.٨ مليجرام، كربوهيدرات ١٠.٧ جرام، بوتاسيوم ٦٥٨ مليجرام، قشره دواء ولقشر الرمان الداخلي والخارجي فوائد شتى، وذلك لاحتوائه على مواد قلبية ومواد قابضة، فهو دواء لطرد الديدان من الأمعاء خاصة الدودة الشريطية، ويستخدم القشر أيضاً كمادة قابضة للبطن حيث تجفف القشور وتطحن وتستخدم عند الحاجة .

## المناخ المناسب:

تحتاج الأشجار لموسم نمو طويل يتوفر فيه الحرارة والجفاف حيث تحتاج ثمارها ليكتمل نموها إلى عدد كبير من الوحدات .

## الأرض المناسبة :

تنمو الأشجار وتثمر في مدى متسع من الأراضي من طينية إلى رملية وتفضل الأراضي العميقة والجيدة الصرف والتهوية .

تتحمل الملوحة إلى حد كبير وتعتبر من أكثر الأشجار تحملا للملوحة كما أنها تنمو وتثمر جيدا في الأراضي التي ترتفع بها نسبة كربونات الكالسيوم .

## طرق الزراعة:

غالبا ما يزرع الرمان على بعد  $3.5 \times 3.5$  م إلا أنه في حالة الري بالتنقيط يفضل زراعة الرمان في صورة متوسطة الكثافة على مسافة  $2 \times 4$  أو  $3 \times 4$  م تحفر الجور وتزرع الشتلات في شهر فبراير بالطريقة السابقة شرحها .

## الحمل والتزهير :

البراعم الزهرية خليطة تحمل جانبا على أفرع عمرها لا يقل عن سنتين وقد تحمل على أفرع عمرها سنة وتحمل الأزهار في طرف النموات الحديثة في عناقيد (١-٥) ويمكن تمييز نوعين من الأزهار، أزهار خنثى كاملة وأخرى مختزلة التلقيح في الرمان ذاتي .

## **خدمة ما بعد الزراعة: مقاومة الحشائش الري:**

تقاوم الأشجار الجفاف وتحمل العطش وارتفاع الملوحة لحد كبير إلا أنه في حالة ما يراد إنتاج محصول جيد يفضل توفير قدر من الرطوبة حول الجذور وتعطيش الأشجار في الشتاء في المناطق التي تروى بالغمر ، أما التي تروي بالتنقيط فيتم توفير الاحتياجات المائية على مدار العام ويلاحظ عدم تجاوز كمية المياه عن الحد المناسب خاصة عند نمو الشار لأن ذلك يسبب تشققها

### **التسميد:**

تسمد الأشجار بمعدل ٤ - ٥ م<sup>٣</sup> بلدي شتاءا بالإضافة إلى ٢٥ - ٥٠ كجم نترات جير للدنم على دفعتين خلال مارس ومايو بعد خف الشار، ١٨ - ٢٥ كجم سوبر فوسفات للدنم، ١٢,٥ - ٣٨ كجم سلفات بوتاسيوم للدنم خلال مارس .

### **التربية والتقليم:**

تربى الأشجار بالطريقة الكأسية ، هناك طريقة محورة لتربية أشجار الرمال وفيها يربى من ٢ : ٣ سرطانات قوية حول الجزع وتعامل بعد ذلك الساق الأصلي والسرطانات معاملة الأفرع الرئيسية في الطريقة الكأسية وتجري هذه الطريقة غالبا للحفاظ على الشجرة من الإصابة بالحفارات حيث أنها إذا ما أصيب ساقها الرئيسي تكون عرضة للجفاف أما إذا أصيب أحد الأفرع المرباة بالطريقة السابقة فإنه يمكن الاستغناء عن هذا الفرع وتربية سرطان آخر بدلا منه .

## التقليم السنوي :

يتم بإزالة الأفرع الجافة والمسنة ولا يزال جزء من الخشب الكبير حيث أنه يحمل البراعم الزهرية .

## اكتمال النضج وجمع المحصول:

تجمع الثمار عند اكتمال النمو عندما تصل للحجم المناسب والتكوين الجيد وتعباً في عبوات من الكرتون بعد الجمع مباشرة ، والرمال من الفواكه التي تلقى رواجاً في الأسواق الأجنبية ويجب في حالة تصديره اختيار الثمار الغير مصابة بأي مرض أو حشرة وألا تكون ذات جلدة مشقوقة كما يجري تدريج الثمار قبل تعبئتها .

## الأمراض والآفات:

الأمراض: البياض الدقيقي .

الحشرات: دورة ثمار الرمان - حفار ساق التفاح - البق الدقيقي - المن -

الذبابة البيضاء .

الآفات الحيوانية : الأكاروس .

## زراعة المشمش

يعتبر المشمش من الفاكهة ذات النواة الحجرية وهو من فواكه المنطقة المعتدلة وحوض البحر الأبيض المتوسط التي تحتاج إلى فترة من البرودة خلال فصلي الخريف والشتاء لإنهاء طور السكون في الأشجار .

وكان الاعتقاد أن الموطن الأصلي للمشمش هو أرمينيا ولذلك سمي بها ، وإلا أن الدراسات الحديثة أوضحت أنه يرجح أن يكون موطنه الأصلي هو غرب ووسط آسيا ، ويمتد شرقاً إلى الصين ومن هذه المناطق انتقل إلى اليونان وبعض دول

أوروبا ثم انتقل منها إلى سوريا وبعض دول شمال إفريقيا وأمريكا الشمالية وأستراليا .

والشمش من الفواكه الصيفية ذات القيمة الغذائية العالية الذي يدخل بجانب الاستهلاك الطازج في كثير من الصناعات الغذائية التي أهمها العصائر والمربات ورقائق المشمش التي تزيد من قيمته الاقتصادية .

### **الظروف الجوية:**

أشجار المشمش من الأشجار التي تتأثر بالظروف الجوية خصوصا خلال فترة التزهير والعقد الحديث حيث أن ارتفاع درجات الحرارة في فترة ما بعد العقد ونمو الثمار تؤثر تأثيرا سلبيا على المحصول وعلى صفات الثمار، كما أن زيادة الرطوبة الجوية خلال هذه الفترة تساعد على زيادة انتشار الأمراض الفطرية خصوصا أمراض البياض التي تسبب تدهور في الصفات التجارية للثمار.

علاوة على ذلك فإن عدم توفر درجات الحرارة المنخفضة والبرودة خلال فصل الخريف والشتاء تسبب عدم انتهاء فترة السكون وبالتالي التأخر في تفتح البراعم الزهرية والخضرية وعدم الانتظار في تفتحها.

وفترة السكون أو الراحة في أشجار المشمش قصيرة نسبيا إذا ما قورنت بأشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية الأخرى أو التفاحيات ولا تحتاج إلى برودة عالية لإنهاء طور الراحة فتكفيها ساعات قليلة من درجات الحرارة المنخفضة .

## زراعة أشجار المشمش في الأرض المستديمة الأرض المناسبة:

تعتبر التربة الطينية والطينية الصفراء العميقة الخالية من الأملاح والجيدة الصرف ومستوى الماء الأرضي منخفض لا يقل عن متر ونصف من أفضل أنواع الأراضي لزراعة المشمش .

أما بالنسبة للأراضي الجديدة فإن المشمش لا يوجد إلا في الأراضي الصفراء والرملية الخالية من الملوحة والطفلة والطبقات الصماء التي تمنع نفاذ الماء والتي تؤدي إلى ارتفاع الماء الأرضي في منطقة انتشار الجذور الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة للأشجار حيث تتدهور بسرعة وتصاب بالخلل الفسيولوجي والتصمغ وبذلك تكون عرضة لزيادة الإصابة بالأمراض والحشرات.

ويجب ألا يزرع المشمش في الأراضي التي تزيد فيها نسبة الملوحة عن ١.٦ مليموز أي حوالي ١٥ في المليون حيث كلما زادت الملوحة يقل المحصول، وكذلك الأراضي المحتوية على تربة زلطية شديدة التماسك والتي تحتوي على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم تكون شديدة الصلابة عند جفافها.

### مسافات الزراعة:

تزرع أشجار المشمش من الأصناف المحلية على مسافة ٦×٧ متر أو ٧×٧ متر نظرا لأن الأشجار كبيرة الحجم قوية النمو، أما صنف الكانيونو فتزرع على مسافة ٥×٥ متر أو ٦×٥ متر حسب نوع التربة نظرا لأن الأشجار قائمة ومحدودة النمو نسبيا عن الأصناف المحلية .

## تجهيز التربة وخدمة الأرض للزراعة طريقة الجور:

يفضل زراعة مصدات الرياح في الأماكن المكشوفة قبل الزراعة بوقت كاف يتم تخطيط الأرض وتحديد أماكن الجور وتركيب شبكة الري بالتنقيط يفضل تركيب خرطومين على جانبي الأشجار في خطوط الزراعة منذ بداية الزراعة ويركب على كل خرطوم (٢ نقاط) على جانبي كل شجرة تصرف ٤ لتر لكل ساعة نقاط وعلى مسافة ٥٠ سم أيضا حتى تكون على امتداد الخرطوم كله في خلال العام الثاني بعد عام الزراعة تكون المسافة بين الخرطوم والخرطوم الآخر على جانبي الأشجار ٥٠ سم عند الزراعة تزداد بالتدريج إلى أن تصل ١-١.٥ متر خلال العام الثاني ثم إلى ٢ متر من جذع الشجرة في كل اتجاه وذلك حسب حجم ومعدل نمو الأشجار بعد تحديد أماكن الجور وتركيب النقاطات يتم تشغيل مياه الري قبل حفر الجور بحوالي 2-3 أيام ولمدة ١٠ ساعات ليتم غسيل الأملاح التي قد توجد في التربة ولتسهيل عملية حفر الجور بعد ذلك يتم حفر الجور بواسطة الجرار بالبريمة أو بواسطة العمال على أن تكون بمقاسات  $70 \times 70 \times 80$  - ١٠٠ سم ، يتم إضافة عدد ٢-٤ مقاطف سماد عضوي كامل التحلل خارج الجور ويفضل إضافة كومبوست مصنع من مخلفات نباتية معد إعدادا جيدا لضمان خلوه من بذور الحشائش ومن أي مسببات مرضية أو حشرية ممكن أن تسبب أضرارا فيما بعد للجذور يتم إضافة ١-١.٥ كجم من مخلوط الأسمدة الكيماوية الآتية سوبر فوسفات الكالسيوم ٤.٥ % بمعدل ٥ شيكارة (١٢,٥ كجم للشيكارة) + ربع شيكارة

سلفات نشادر + ٣٠ + ربع شيكارة سلفات بوتاسيوم ٤٨٪ + ٢٥ كجم كبريت زراعي.

يقلب السماد العضوي أو الكومبوست مع السماد الكيماوي وناتج حفر الجور جيدا حتى تمام التجانس ثم يضاف إلى الجورة على أن تكون ال ٣٠ سم العليا من الجورة رمل فقط من ناتج حفر الجور المغسول جيدا بمياه الري يتم تشغيل مياه الري لمدة حوالي ١٠ ساعات قبل الزراعة وبذلك تكون الجور جاهزة للزراعة.

### **طريقة الخنادق:**

يفضل بعض المزارعين تجهيز الأرض للزراعة عن طريق عمل خنادق بدلا من الجور وفي هذه الطريقة تزيد تكلفة التجهيز نظرا لزيادة كمية الأسمدة العضوية والكيماوية المضافة وكذلك تكلفة حفر وردم الخنادق وتتم هذه الطريقة كما يأتي:

- يتم حفر خنادق بعمق وعرض ٨٠-١٠٠ سم.
- يتم إضافة ٤٠-٣٥٠ سماد عضوي كامل التحلل أو كومبوست على جانبي الخندق.
- يتم إضافة ٦٠-٧٥ كجم من مخلوط الأسمدة المعدنية السابق ذكرها نثرا على السماد العضوي.
- يتم قلب السماد العضوي والكيماوي من الرمل ناتج حفر الخندق وتسوية سطح الخندق مع التربة.
- يتم فرد شبكة الري وتشغيل الري لمدة ٣-٤ أيام حتى يتم تشبع الأرض تماما بالرطوبة.

- يتم تحديد أماكن زراعة الشتلات على المسافات المطلوبة وذلك بعمل جورة صغيرة يتم زراعة الشتلة بها.

وبعد إعداد الأرض للزراعة بأحد الطرق السابقة يفضل إضافة دفعة من المخصبات الحيوية عن طريق شبكة الري لرفع محتوى التربة من الكائنات الحية الدقيقة النافعة .

### **الزراعة في المكان المستديم: تجهيز الشتلات للزراعة :**

يتم تقليم جذور الشتلات المكسورة أو الطويلة بواسطة مقص التقليم يتم غمس المجموع الجذري للشتلات في محلول مطهر فطري مثل البنليت أو الريزولكس أو الفيتافاكس بمعدل 3 جم/ لتر قبل الزراعة وبذلك تكون الشتلات جاهزة للزراعة.

### **الزراعة:**

- يتم توزيع الشتلات المعاملة على الجور.
- يتم حفر حفرة صغيرة بكل جورة حوالي ٢٠ سم في الثلث العلوي من الجورة.
- تزرع الشتلات في هذه الجور مع مراعاة الآتي:  
أن تكون منطقة التطعيم في اتجاه معاكس للرياح حتى لا ينفصل الطعم عن الأصل بفعل الرياح.

أن تكون منطقة التطعيم على ارتفاع ١٠ سم على الأقل فوق سطح التربة أو نفس الارتفاع التي كانت عليه بالمشتل.

يتم تثبيت التربة وكبسها جيدا حول المجموع الجذري وحتى لا يتم المجموع الجذري فيؤدي إلى جفاف الشتلة .

يتم قرط الشتلات على ارتفاع ٧٠ سم من سطح الأرض ويتم إزالة جميع الأفرع الثانوية الموجودة على الساق الرئيسي للشتلة.

يتم الرش بمطهر فطري مثل أكسي كلور النحاس ودهان مكان قص الشتلات بعجينة بوردو.

يتم دهان الجذع أسفل منطقة التطعيم بعجينة بوردو.

يتم الري بعد الزراعة مباشرة لتوفير الرطوبة حول المجموع الجذري وسد الفراغات الموجودة في التربة حتى لا تتعرض الشتلات للجفاف.

مواصفات الشتلة الجيدة:

أن تكون ممثلة للصنف المطلوب زراعته وخالية من الأمراض.

أن تكون ذات مجموع جذري قوى خالي من الأمراض .

أن يكون الطعم بسمك لا يقل عن ٠.٨ - ١ سم وبطول لا يقل عن ٨٠ -

١٠٠ سم .

أن تكون منطقة التطعيم بارتفاع ١٥ - ٢٠ سم عن سطح الأرض.

## الري:

تحتاج شتلات المشمش المنزرعة حديثا إلى الري على فترات متقاربة خصوصا في العام الأول، فتروى يوميا على الأكثر يوم بعد يوم تحت نظام الري بالتنقيط وذلك في الأراضي الرملية الخفيفة ويجب اعطاء ريات غزيرة قبل الزراعة حتى يتم توفير الرطوبة المناسبة وطرده الأملاح في الأعماق التي ستتتشر بها الجذور ويتم طفي الأسمدة العضوية المضافة في جور الزراعة، ثم تعطى بعد ذلك المعدلات المناسبة اللازمة لإحتياجات الأشجار في اشهر ومراحل النمو المختلفة وحسب نوع التربة وظروف كل مزرعة ونوعية مياه الري ويمكن الإسترشاد بالمعدلات الآتية مع مراعاة زيادة معدل الري بحوالي ٦٪ عن المعدلات العادية في حالة وجود ملوحة بمياه الري زيادة عن الحدود المناسبة لأشجار المشمش ويراعى عدم إيقاف الري خلال فصلي الخريف والشتاء وأن يتم المحافظة على الرطوبة في منطقة انتشار الجذور من الجفاف خصوصا الموجودة في الطبقة القريبة من سطح التربة كما يجب عدم إعطاء كميات كبيرة من مياه الري لمساعدة الأشجار على الدخول في دور السكون خلال هذه الفترة يتم إعطاء رية غزيرة بمعدل ١٢-١٥ م<sup>٣</sup> للندم في بداية موسم النمو الجديد في خلال شهر فبراير.

## التسميد:

يبدأ في تسميد أشجار المشمش حديثة الزراعة بعد استكمال خروج البراعم الخضرية في خلال النصف الثاني من شهر مارس ويتم إضافة جميع العناصر الكبرى (الآزوت - الفوسفور - البوتاسيوم - المغنيسيوم) من خلال شبكة الري بالتنقيط

على دفعات يومية مع مياه الري أو تضاف بمعدل ٣مرات في الأسبوع وتوزيع إحتياجات الأشجار من الأسمدة المختلفة منذ بداية الموسم حتى نهاية شهر سبتمبر ، وتدرج بالزيادة مع زيادة معدل النمو وعمر الأشجار خلال الموسم ثم يوقف التسميد من بداية شهر أكتوبر حتى بداية موسم النمو الجديد في أوائل شهر مارس ويمكن إضافة العناصر الصغرى التي أهمها الحديد والزنك والمنجنيز في صورة مخلبية من خلال شبكة الري بالتنقيط على دفعات اسبوعية ويمكن رشها على المجموع الخضري ٣-٤مرات خلال موسم النمو يضاف عنصر الفوسفور في صورة حامض الفوسفوريك أثناء موسم النمو من خلال شبكة الري بالتنقيط مع عنصري الآزوت والبوتاسيوم تكون نسبة الآزوت إلى البوتاسيوم في بداية موسم النمو ١:٢ وأثناء نضج الثمار ١:٢ وبعد جمع المحصول ١:١ المعدلات الآتية معدلات إسترشادية لأشجار المشمش في الأراضي الرملية الحديثة الإستصلاح والتي تروى بالتنقيط يضاف ٦٪ من السماد الآزوتي في صورة نترات الكالسيوم ٤.٥ على دفعات إسبوعين بمفرده بدون خلطه مع الأسمدة الأخرى يتم رش الاشجار بالكالسيوم المخلبي على الأوراق بمعدل ٠.٥ جم/ لتر ٣-٤مرات خلال موسم النمو ولا يخلط بأي أسمدة ورقية .

### **الخدمة الشتوية لأشجار المشمش:**

نظافة الأرض من الحشائش التي تكون موجودة خلال هذه الفترة سواء بالنقاوة اليدوية للحشائش الحولية أو بالعزيق للحشائش النجيلية المعمرة ويراعى ألا يكون العزيق عميقا حتى لا يؤدي إلى تقطيع جزء كبير من الجذور إضافة

الأسمدة العضوية والمعدنية يتم إضافة من ٢-٤ مقاطف سماد عضوي قديم متحلل خالي من بذور الحشائش، ويفضل إضافة سماد الكومبوست المحضر بالمرعة من المخلفات النباتية، ويضاف السماد العضوي في خنادق أو حفر على جانبي الأشجار بعمق يتراوح بين ١٢-١٥ سم على آخر امتداد الجذور مخلوطا بناتج الحفر + ١-١.٥ كجم من مخلوط الأسمدة الكيماوية والكبريت الزراعي المكون من النسب الآتية:

٦٥ كجم سوبر فوسفات ١٥,٥٪ + ١٢ كجم سلفات نشادر + ١٢ كجم سلفات بوتاسيوم + ٢٥ كجم كبريت زراعي.

ويقلب جيدا السماد العضوي مع الكيماوي الناتج من حفر الجور ثم يعاد إلى الحفرة مرة أخرى ويغطى من أعلى بالرمل العادي ويكون ذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر وذلك في حالة الزراعة في جور ولا تجري هذه العملية في حالة الزراعة في خنادق بعد التقليم مباشرة يتم رش الأشجار بمحلول أكسى كلورالنحاس بمعدل ٣ كجم على عبوة الموتور ١٥٠ لتر ماء خلال الفترة من أول ديسمبر إلى منتصف يناير يتم رش الأشجار بالزيت المعدنى الشتوي بمعدل ٢.٥٪ + أحد المبيدات الحشرية مثل الملاثيون بمعدل ١.٥ في الألف، في حالة الرش بأحد المركبات المستخدمة في كسر سكون البراعم لتبكير المحصول في الأشجار التي لا يقل عمرها عن ٣ سنوات يتم الرش في خلال الأسبوع الأخير من يناير والأسبوع الأول من فبراير على الأكثر حسب المناطق ويكون ذلك قبل موعد

التزهير بحوالي ٤٥ يوم يتم إعطاء رشة بالسيدال في بداية تفتح البراعم وذلك لمقاومة حشرة الأنارسيا في حالة وجود إصابات بالمرزعة في السنوات السابقة في مرحلة بداية انتفاخ البراعم يتم الرش بمخلوط الكبريت وأكسى كلور النحاس بمعدل ١.٢٥ كجم من كل منهم على عبوة الموتور ٦٠٠ لتر ماء.

### **تقليم الأشجار أهميته:**

التقليم من العمليات الهامة لأشجار المشمش ويلعب دورا كبيرا في تكوين هيكل الأشجار وتوزيع المسطح الثمري عليه وتحسين صفات وجودة الثمار من ناحية الطعم واللون والحجم بالإضافة إلى تجديد الدوابر الثمرية التي انتهت مدة إثمارها والمحافظة على الأشجار المثمرة أطول فترة ممكنة .

ويؤدي التقليم إلى سهولة التحكم في إجراء عمليات الخدمة ومقاومة الأمراض والآفات ، كما يستخدم التقليم في تجديد شباب الأشجار الكبيرة والتي قل إنتاجها من الثمار.

## ميعاده:

يتم التقليم أثناء موسم السكون وقبل تفتح البراعم خلال الفترة من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر ديسمبر ولكي تتم عملية التقليم الشتوي السنوي لأشجار المشمش بطريقة صحيحة يلزم التعرف على طبيعة الحمل والتزهير ووحدات الإثمار في أشجار المشمش البرعم الزهري في المشمش برعم بسيط يحتوى على الأزهار فقط وتحمل هذه البراعم الزهرية على أفرع عمر سنة في السنوات الأولى من عمر الأشجار، وكلما تقدمت الأشجار في العمر تبدأ في تكوين الدوابر الثمرية التي تحمل الأزهار والثمار وتحمل هذه الدوابر على الأفرع التي يزيد عمرها عن عام واحد تستمر هذه الدوابر في الإثمار منذ بداية إثمارها حتى ٥ - ٧ سنوات حسب حالة الأشجار الغذائية والصحية.

## أنواع التقليم

يوجد نوعان من التقليم هما تقليم التربية وتقليم الإثمار.

### تقليم التربية :

الطريقة الشائعة في تقليم الأشجار والمناسبة لظروفنا المحلية وهي الطريقة الكاسية المفتوحة وفيها تربي الأشجار الحديثة الزراعة بأن يتم قرط الساق الرئيسي للشتلة على ارتفاع ٦٠ - ٧٠ سم من سطح التربة بعد الزراعة مباشرة وتزال جميع الأفرع الموجودة على الساق الرئيسي للشتلة لإعطاء فرصة لتكوين هيكل جيد للشجرة من البراعم الجديدة التي تخرج على الساق الرئيسي.

## التقليم الشتوي الأول:

في الشتاء الأول التالي لعام الزراعة يجري التقليم بانتخاب ٣-٥ أفرع رئيسية جيدة النمو تقصر بطول يتناسب مع قوة نموها ، تكون هذه الأفرع المنتخبة موزعة توزيعاً منتظماً حول الساق الرئيسي لا تخرج من نقطة واحدة وتبعد عن بعضها بمسافة ١٠-١٥ سم ، أن تكون زاوية كل فرع منتخب مع الساق الرئيسي زاوية منفرجة أن تكون بداية التفريع على ارتفاع ٣٠-٤٠ سم من سطح الأرض تزال باقي الأفرع وكذلك السرطانات الموجودة أسفل منطقة التطعيم إذا وجدت.

## التقليم الشتوي الثاني:

وبحلول فصل الشتاء الثاني تكون الأشجار قد أعطت عدداً كبيراً من الأفرع الجانبية نامية على الجذع الأساسي وعلى الأفرع الرئيسية المنتخبة في الشتاء الماضي . وفي هذا الموسم يتم انتخاب عدد من الأفرع الثانوية الموجودة على الأفرع الرئيسية السابق انتخابها من الموسم الماضي بحيث تكون الأفرع المنتخبة متجه للخارج ومتباعدة عن بعضها بما لا يقل عن ١٠-١٥ سم وتقصر بطول يتناسب مع قوتها وقوة نمو الأشجار ويكون عددها متناسب مع قوة نمو الأشجار . وبهذا التقليم يتكون الهيكل الرئيسي لشجرة المشمش المرباه بالطريقة الكأسية المفتوحة .

## التقليم الشتوي الثالث والرابع:

يقتصر هذه التقليم في شتاء العام الثالث والرابع لأشجار المشمش على إزالة الأفرع التي تظهر على الساق الرئيسي أسفل الأفرع الرئيسية المنتخبة أو فيما بينها

، وكذلك السرطانات النامية أسفل منطقة التطعيم خف الأفرع المتزاحمة والمتشابكة حتى يسمح بتخلل الهواء وأشعة الشمس لجميع أجزاء الشجرة لتشجيع نمو الدوابر على الأفرع السفلية إزالة الأفرع الجافة أو المصابة بخنافس القلف وقمم الأفرع المصابة بحشرة الأناريسيا مع التخلص منها بالحريق.

### **تقليم الأشجار المثمرة:**

المعروف أن الحمل في أشجار المشمش يكون على دوابر ثمرية تحمل جانبيًا على الخشب القديم وهذه الدوابر تعطي أغلب المحصول ويتم التزهير والإثمار أيضا على براعم تحمل جانبيًا على أفرع عمر سنة ولكن نسبة المحصول على هذه الأفرع قليلة جدا بالنسبة للمحصول الرئيسي للشجرة ويصل عمر الدوابر الثمرية في أشجار المشمش إلى ٥-٧ سنوات وبذلك تحتاج الأشجار إلى تقليم ثمرى متوسط يشمل تقصير وخف الأفرع بعد إنتاج دوابر ثمرية جديدة تحل محل الدوابر التي انتهت مدة إنتاجها الثمرى وكذلك الدوابر المصابة والتالفة أثناء فترة جمع الثمار ينحصر التقليم الثمرى لأشجار المشمش المثمرة في الآتي:

إزالة الأفرع الحديثة الموجودة في داخل قلب الأشجار وكذلك الأفرع القائمة والضعيفة المتشابكة والأفرع المائلة بأعلى الشجرة لتشجيع نمو البراعم الموجودة على الأفرع السفلية مع قرط قمم الأفرع الجانبية المحافظة على الإرتفاع المرغوب والمناسب للشجرة بحيث تكون قمة الشجرة مفتوحة حتى تسمح بتخلل أشعة الشمس والهواء مما يساعد على تكوين دوابر جديدة مع توزيع الإثمار توزيعا منتظما حتى يمكن للشجرة أن تستمر في الإثمار المنتظم على توالى السنين يراعى عدم

التقليم الجائر حتى لا تتجه الأشجار إلى النمو الخضري الغزير ويقل تكوين البراعم الثمرية وينخفض المحصول ، لا يتبع التقليم الجائر إلا في حالة تجديد شباب الأشجار المسنة يجب عدم ترك كعوب عند إزالة الأفرع مع مراعاة إزالة كعوب الأفرع المزالة في العام السابق إذا وجدت على الأشجار ، وتزال الأفرع المكسورة أو المصابة بشدة بإصابات حشرية أو مرضية والتخلص منها بالحرق يراعى رش الأشجار بمحلول مطهر بعد التقليم مباشرة ودهان أماكن قرط الأفرع الكبيرة بعجينة بوردو، وكذلك دهان جذوع الأشجار أسفل منطقة التطعيم

### **خدمة مزارع المشمش المثمرة الري:**

يعتبر الري من العمليات الهامة والمحددة للإنتاج في أشجار المشمش، وتختلف الاحتياجات المائية لأشجار المشمش حسب عمر الأشجار وطبيعة ونوع التربة ونوعية مياه الري وطريقة ونظام الري وموسم النمو والظروف الجوية وتحتاج الأشجار المثمرة إلى توفير الاحتياجات الفعلية من الرطوبة بالتربة على صورة سهلة الامتصاص، فلا تحتاج الأشجار إلى زيادة كبيرة لدرجة التشبع ولا قلة الرطوبة لمستوى الجفاف وعادة تكون الري الأولى عند بداية موسم النمو رية غزيرة بمعدل ١٢-١٥ سم للندم خلال أوائل شهر فبراير حتى تغمر المياه جميع أعماق التربة الموجود بها المجموع الجذري وتوفير الرطوبة المناسبة وطرده الأملاح الموجودة حولها وحتى تدفع البراعم على التفتح والتزهير مع المحافظة على الرطوبة المناسبة حتى لا يتسبب الجفاف التام ثم الري وقت التزهير إلى سقوط الأزهار والعقد

الحديث وتحت نظام الري بالتنقيط يكون الري على فترات متقاربة خصوصا أثناء فصل الصيف وتتباع فتراته خلال فصل الخريف والشتاء ،وتراعى ظروف التربة ونوعية مياه الري وعمر الأشجار في تحديد زمن الري وفتراته ويتم الري يوميا أو يوم بعد يوم منذ بداية الموسم حتى نهاية شهر أغسطس ومن أول شهر سبتمبر يتم تقليل زمن الري وابعاد فترات الري بالتدريج فيكون الري بمعدل مرتين في الأسبوع ثم مرة واحدة ثم مرة كل عشرة أيام حتى شهر أكتوبر خلال شهر نوفمبر مرة كل 15 - 10 يوم حسب ظروف التربة والظروف الجوية للمحافظة على الرطوبة المناسبة في منطقة انتشار الجذور خلال شهري ديسمبر ويناير يكون الري كل 15 - 20 يوم حسب التربة والظروف الجوية وتراعى النقاط الآتية في ري مزارع المشمش.

ألا تزيد نسبة الملوحة في مياه الري عن ١٥٠-٧٠٠ جزء في المليون حيث يقل المحصول وتتأثر الأشجار بشدة بزيادة نسبة الملوحة عدم الإسراف في الري أو التعطيش أثناء فترة التزهير والعقد الحديث توفير الاحتياجات المائية المناسبة أثناء مراحل نمو الثمار يجب عدم إيقاف الري بعد جمع المحصول أو تقليل معدلات الري عن الحد اللازم للأشجار حيث يعتقد خطأ أن ذلك يساعد على زيادة الإثمار في العام التالي وهو ما يسبب عكس ذلك يساعد على زيادة الإثمار في العام التالي وهو ما يسبب عكس ذلك ويؤدي إلى ضعف الأشجار وعدم تكوين البراعم الزهرية والتي يتم تكوينها خلال فصل الصيف في الفترة من يونيه حتى أغسطس ثم تبدأ

الأشجار بعد ذلك في الدخول في فترة الراحة والسكون عدم إيقاف الري خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير ولكن تعطى دفعات صغيرة وعلى فترات متباعدة للمحافظة على الشعيرات الجذرية السطحية من الجفاف إعطاء دفعة غزيرة من الري عند بداية موسم النمو في خلال شهر فبراير عدم تحريك خراطيم الري للداخل والخارج ويجب تثبيتها على بعد مناسب من جذع الأشجار حتى لا يؤدي تحريكها إلى طرد الأملاح من الخارج إلى الداخل الإدارة الجيدة لبرنامج الري لدفع الجذور للعمق المناسب للتثبيت الجيد للأشجار بالتربة وفيما يلي معدلات إسترشادية لوضع برنامج الري لمزارعي المشمش مع مراعاة عمر الأشجار وظروف كل مزرعة ونوعية التربة بالتر للشجرة في اليوم

### **التسميد:**

تحدد كفاءة الأشجار وطاققتها الإنتاجية على اختيار برنامج التسميد المناسب ومدى ملائمته للإحتياجات الفعلية للأشجار. ويمكن الإستدلال على البرنامج سهادي المناسب من نتائج تحليل الأوراق لتقدير محتواها من العناصر الغذائية.

ويعتبر عنصر الآزوت من العناصر السهادية الهامة لأشجار المشمش وتشتد حاجة الأشجار لهذا العنصر أثناء فترة العقد.

وأشجار المشمش لا ينشط مجموعها الجذري إلا بعد تفتح البراعم الخضرية ويزداد نشاط امتصاص الجذور للعناصر الغذائية بمحلول التربة بعد حوالي ٣-٥ أسابيع من بداية تفتح البراعم الخضري.

وتحتاج أشجار المشمش المثمرة إلى المقررات السهادية الآتية:

### - في الأراضي الرملية:

٦٥٠-٧٥٠ جم آزوت للشجرة تعادل ٢.٥ كجم نترات نشادر

٣٣.٣٪ ويمكن أيضا استبداله ب 3.5 كجم سلفات نشادر ٢٠.٥ بالمائة.

٥٠٠-٦٠٠ جم بوتاسيوم للشجرة تعادل حوالي ١.٥ كجم سلفات بوتاسيوم

حوالي ٤٨ بالمائة.

١٠٠-١٥٠ جم فوسفور للشجرة تعادل حوالي ١ كجم سوبر فوسفات أو

حوالي مقدار ٢٠٠ جم حامض فوسفوريك.

٤٠٠-٥٠٠ سلفات مغنيسيوم.

يضاف المعدل الآزوتي على دفعات متساوية ابتداء من منتصف شهر فبراير

حتى أواخر سبتمبر على أن يضاف ثلثي المقرر من فبراير حتى يونيو ثم يضاف الباقي

بعد جمع المحصول حتى نهاية شهر سبتمبر ويقسم المعدل الشهري على دفعات

تضاف بمعدل ٢-٣ مرات في الأسبوع.

يضاف عنصر البوتاسيوم مع دفعات الآزوت على أن يضاف ثلثي الكمية

حتى الإنهاء من جمع المحصول ويضاف الباقي بعد جمع المحصول.

وتوزع كميات الماغنسيوم بالتساوي مع دفعات التسميد الآزوتي والبوتاسي

أما عنصر الفوسفور فيضاف على صورة حامض فوسفوريك على دفعات اسبوعية

تضاف العناصر الصغرى التي أهمها الحديد والزنك والمنجنيز في صورة مخلبية رشا

على الأشجار مرتين خلال شهري أبريل ومايو ومرة ثالثة بعد جمع المحصول بتركيز

100 جم من كل عنصر على عبوة الموتور ٦٠٠ لتر ماء أي لا يزيد تركيزها عن ٠.٥ جم/ لتر تضاف الأسمدة العضوية خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى أوائل ديسمبر بمعدل ٢-٤ مقاطف لكل شجرة في جور أو خنادق على جانبي الأشجار على أن تغير الاتجاهات سنويا وتكون الخنادق بعمق ٤٠-٥٠ سم وعلى نهاية امتداد الجذور يضاف لكل شجرة ١ كجم من مخلوط أسمدة السوبر فوسفات وسلفات النشادر وسلفات البوتاسيوم والكبريت الزراعي ١: ٥: ١: ٢ على التوالي، وتضاف على السماد العضوي وتقلب جيدا مع ناتج حفر الجور ثم تضاف في الخنادق أو الجور المحفورة يفضل أن تكون الأسمدة العضوية خالية من الأتربة وبذور الحشائش وقديمة ومتحللة ويفضل أن تكون من الكومبوست المصنع بالمرعة من المخلفات الزراعية والأسمدة العضوية القديمة والغير مخلوطة بالتربة الزراعية ، وتفيد الأسمدة العضوية الجيدة التصنيع في الأراضي الرملية في:

- زيادة محتوى التربة من العناصر الغذائية الصالحة للإمتصاص مثل النيتروجين والفوسفور والعناصر الصغرى.
- رفع قدرة الأرض الرملية على الاحتفاظ بالماء وزيادة تماسكها إلى حد ما
- تقليل الفاقد من العناصر الغذائية بالرشح عند زيادة مياه الري.
- يؤدي إلى زيادة النشاط الحيوي بالتربة وتحلل المواد العضوية غير المتحللة.
- تحسين الخواص الطبيعية للتربة.

- كل هذا يؤدي إلى توفير الحالة الغذائية السليمة للأشجار والعناية بالحالة الصحية لها ورفع كفاءتها الإنتاجية ومقاومتها للآفات.

### الإكثار:

يتم إكثار المشمش عن طريق التطعيم، ويعتبر التطعيم من أفضل الطرق لإكثار المشمش لمزاياه التي أهمها إنتاج أشجار متجانسة في النمو وفي مواعيد الإزهار والإثمار مما يسهل عمليات الخدمة والجمع والتسويق.

ويتم تطعيم الأصناف المطلوبة على الأصول البذرية التي يتم إنتاجها بزراعة بذور المشمش الطازجة الناتجة من نفس الموسم عندما تكون صالحة للتطعيم.

وتزرع البذرة لإنتاج الأصول التي يتم التطعيم عليها في خلال شهر أكتوبر في المشتل حيث تأخذ البذور احتياجاتها من البرودة اللازمة لكسر طور الراحة بها خلال فترة الشتاء وتنبت البذور في بداية موسم النمو في أوائل فبراير تم تطعيم الشتلات البذرية الناتجة خلال الصيف التالي بأحد الطرق الآتية التطعيم بالعين خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر، التطعيم بالكشط بأخذ العين بجزء من الخشب خلال الفترة من شهر فبراير ومارس أو خلال فترة الصيف التطعيم بالقلم خلال شهر يناير وفبراير وقبل سريان العصارة ولا تفضل هذه الطريقة في إكثار أشجار المشمش نظرا لسهولة انفصال الطعم عن الأصل في حالة وجود رياح شديدة وعدم الالتحام الجيد بين الأصل والطعم ولا يفضل زراعة المشمش عن طريق البذور حيث يعتقد وأصحاب المشاتل والزراع أن زراعة البذور الناتجة من ثمار الأصناف الممتازة يعطى أشجارا تعطى ثمارا متشابهة تماما مع ثمار الأشجار الأم ونظرا لعدم

تمثل الأشجار الناتجة من حيث صفاتها مع الأشجار الأم لوجود إنعزالات وراثية للإكثار عن طريق البذور.

### علامات النضج وجمع المحصول:

تنضج ثمار المشمش الكانينو خلال الأسبوع الأول من يونيه في المزارع المبكرة وخلال النصف من يونيه وحتى أوائل شهر يوليو في المزارع العادية وفي بعض المناطق.

ويمكن دفع الأشجار للتزهير المبكر باستخدام المواد الكاسرة للسكون فتبدأ الثمار في النضج من الأسبوع الأخير من شهر مايو.

وتعرف علامات نضج الثمار بتحول اللون من الأخضر إلى اللون الأصفر الفاتح ثم الأعماق قليلا وتصل نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية إلى حوالي ١٦-١٧ ٪ ويجب مراعاة النقاط الآتية عند جمع وتعبئة ثمار المشمش:

ألا تترك الثمار حتى تصل إلى مرحلة اكتمال النضج على الأشجار حيث يصعب تعبئتها وتداولها يفضل أن يتم جمع الثمار بجزء من عنق الثمرة لتظل محتفظة بحيويتها لفترة طويلة مراعاة عدم سقوط الثمار على الأرض وقطفها بعناية وتكون عبوات الجمع مبطنة بطبقة من الأسفنج الخفيف حتى لا تتعرض الثمار للإصابة بجروح وبالتالي تصاب بالتلف والفساد السريع يجب فرز الثمار قبل تعبئتها واستبعاد الثمار التالفة والمخدوشة والمصابة بالحشرات خصوصا ذبابة الفاكهة حتى لا تؤدي إلى تلف الثمار المحاطة بها بفضل تدريج الثمار وتعبئة كل حجم على حدة

يفضل أن تكون العبوات من الكرتون وأن يكون بين كل طبقة من الثمار والأخرى حاجز أو فاصل من الورق وفي حالة العبوات المصنوعة من جريد النخيل يجب أن تكون مبطنه بالورق يفضل عدم جمع الثمار أثناء ارتفاع درجات الحرارة حيث ترتفع درجة حرارة الثمار وبالتالي يؤدي تعبئتها وهي ساخنة إلى سرعة تلفها وقصر فترة تداولها بالأسواق لذلك يفضل الجمع في الصباح الباكر قبل ارتفاع الحرارة وذلك لعدم توفر إمكانية المكافحة.

### **المتكاملة لآفات المشمش:**

- تقليم الأغصان الجافة والمصابة بالحفارات والحشرات القشرية والأنارسيا أثناء الشتاء والتخلص منها خارج الحديقة.
- العزيق الشتوي وتنظيف الأرض من الحشائش للحد من الإصابة من الجاسيد والعنكبوت والمن وغيرها من آفات التربة.
- الرش بالكبريت الميكروني عند انتفاخ البراعم ضد العنكبوت.
- جمع حشرات جعل الورد الزغبى من على الأشجار باليد مع -وضع المصائد المائية بمعدل ٤٠ مصيدة/ للدنم ويجب خلط السماد البلدي بالجير مع التقليب الجيد قبل الإضافة للتربة.
- خلال الموسم يتم جمع الثمار المصابة بالأنارسيا والتخلص منها .
- الإقلاع عن الزراعات المختلطة وعزيق التربة وجمع ودفن الثمار المصابة سواء من على الأشجار أو على الأرض ودفنها في حفرة بعمق ٥٠ سم يقلل من الإصابة بذبابة الفاكهة والأنارسيا.

- الرش بالمبيدات صديقة البيئة مثل الفيرتيميك حسب توصيات وزارة الزراعة.

- الرش بالمبيدات الآمنة مثل الباسودين ضد الآفات الحشرية أثناء الموسم .

- تعليق مصيدة فرمونية في الحديقة لتحديد وجود الآفة من عدمه وكثافة الإصابة في حال وجودها.

## زراعة الباباظ

الباباظ من الفواكه الاستوائية ، موطنها الأصلي جنوب المكسيك وتنتشر زراعتها حاليا في الهند وسيلان والملايو وأستراليا وجنوب أفريقيا والمكسيك ووسط وجنوب أمريكا وجزر هاواي وبالرغم من ثبوت نجاحه في العديد من البلدان العربية إلا أن المساحات المزروعة منه مازالت محدودة الانتشار ، ويطلق على الباباظ مسميات مختلفة منها البابا أو شام باباو .

## المناخ المناسب:

يعتبر الباباظ محصول استوائي إحتياجاته الحرارية غير محدودة كباقي المحاصيل الاستوائية وكذلك يمكنه النمو في المناطق المعتدلة الخالية من الصقيع ولكن الثمار تقل جودة في هذا الجو عن الجو الحار ، وقد وجد أن الباباظ يتحمل صقيع خفيف إذا كانت النباتات غير معرضة للعفن والزراعة تكون أنجح إذا كانت المنطقة خالية من الصقيع . وتسبب درجة الحرارة المنخفضة إلى - ٢ درجة م تحت الصفر إلى موت أنسجة النبات كما أن الدرجة المرتفعة عن ٤٣ درجة م لا

يتحملها النبات وخصوصا في الجو الجاف ، ويتاثر الباباظ بالرياح القوية ولذلك يجب حماية النباتات بمصدات الرياح .

### **الأرض المناسبة :**

ينجح في أي نوع من الأراضي طالما أن الصرف مناسب ولكن يكون نموه طبيعي في الأراضي الخصبة الغنية بالمواد العضوية عن الأراضي الفقيرة كما ينمو بنجاح في الأراضي الرملية إذا أضيف التسميد المناسب ولكن يفضل عامة التربة الصفراء المفككة ، ويجب عدم زراعة الباباظ في الأراضي الغدقة فقد لوحظ أن ركود الماء لفترة حوالي ٤٨ ساعة حول النبات تسبب هلاكها .

### **إعداد الأرض للزراعة:**

١ - يزرع الباباظ بالنظام الرباعي على مسافات ١.٥ - ٢ م وعند الزراعة يضاف ١ - ٣ مقاطف سماد بلدي متحلل تخلط مع تراب الجورة ويجب قطع الأوراق الكبيرة عند نقطة اتصالها بساق الشتلات مع ترك الأوراق الطرفية فقط ، كما لا يجب زراعة الشتلات في الجورة على عمق أقل مما كانت عليه في أحواض البذرة أو على خطوط المشتل ، ونبات الباباظ سريع الذبول والعفن إذا ما استمر تجمع الماء حول قاعدته ولذا يجب تلاقي ذلك عند الزراعة .

### **الري :**

يؤدي نقص الماء إلى وقف النمو وبالتالي نقص المحصول بالإضافة إلى ذلك أن جذور الباباظ سطحية ولا تمتد إلى عمق كبير ولذا فهي تحتاج للري على فترات متقاربة دون أن يتراكم الماء حول جذوع النباتات ولذا فان استخدام الري بالتنقيط

يلائم زراعة الباباؤ حيث يسمح بتنظيم الامدادات المائية بكفاءة ويراعي ما سبق ذكره في الري بالتنقيط .

### **التسميد :**

نباتات الباباؤ سريعة النمو إذا ما أحسن تغذيتها والنباتات التي تحافظ على قوة نموها تعطي دائما محصولا مريحا ولذا يجب أن تسمد عضوي شتاء (٣ مقاطف لكل شجيرة) كما يضاف سماد نتراني بواقع ٣ - ٤ كجم على دفعات تتراوح بين ٤ - ٦ دفعات في العام وإضافة نصف شوال ٥٠ كغم سوبر فوسفات وجوال سلفات بوتاسيوم للذنم ، وإذا ما استخدم الري التسميدي في نظام الري بالتنقيط القواعد السابق ذكرها في الجوافة .

### **التلقيح:**

أن إخصاب العديد من البويضات بالزهرة يعتبر من العوامل الأساسية للحصول على ثمار جيدة التكوين وقد وجد أن نقل كمية حبوب اللقاح التي تصل إلى الأزهار قد تمنع إخصاب البويضات القاعدة بالمبيض وبالتالي تؤدي إلى الحصول على ثمار أقل من محتواها من السكريات وردئة الطعم ولا توجد ظاهرة عدم الإخصاب الذاتي في الأصناف أحادية المسكن وفي النباتات الثنائية المسكن فانه يجب توفير الأشجار المذكرة في المزرعة بحيث توجد شجرة مذكرة لكل ١٢ - ١٦ شجرة مؤنثة .

## التكاثر:

### ١- الإكثار بالبذرة :

وهو الشائع بصورة عامة حيث تحتوي الثمار على عديد من البذور المتوسط الحجم التي تستخرج وتزرع مباشرة أو تخزن بعد استخراجها وتزرع البذور متكاثفة في مهد البذرة أو أواني الزراعة ويفضل الأخير حيث يسهل تطهيرها وذلك لمنع إصابة البادرات بالذبول وتنبت البذور بعد ١ - ٣ أسابيع من زراعتها وتفرد عندما تصل بطول ١٠ سم أما في أوعية أكبر أو على خطوط في المشتل.

### ٢ - الإكثار بالعقل أو التطعيم:

يمكن إكثار الباباظ بالعقل والتطعيم ولكن هذه الطرق غير منتشرة لان عدد النباتات التي يمكن الحصول عليها قليلة نظرا لعدم تفريع نباتات الباباظ .  
الآفات:

١ - مرض تبقع الأوراق مرض فطري ويقاوم بالرش بمحلول بوردو . ٢ -

مرض عفن الثمار مرض فطري ويقاوم مع بقية الأمراض الفطرية .

٣ - البياض الدقيقي ويقاوم بالرش بالكبريت من ٢ - ٣ مرات كل ١٠ أيام  
رشة .

٤ - الحشرات التي تصيب الباباظ : ذبابة ثمار الباباظ - دودة ثمار الباباظ -

الذبابة البيضاء - الذبابة الحمراء وتقاوم بنفس الطرق المذكورة في

الفاكهة مستديمة الخضرة الأخرى .

## زراعة التين

يعتبر التين واحدا من أقدم أنواع الفاكهة التي ظهرت على الأرض حيث ذكر في الكتب السماوية خاصة القرآن ، وهي شجرة متساقطة الأوراق من أشجار المنطقة تحت إستوائية وأحيانا يصل في بعض الأصناف إلى شجيرات كبيرة ، تزرع بنجاح في المنطقة المعتدلة الدافئة. يزرع التين في مصر منذ عهد قدماء المصريين حيث وجدت صور من أشجاره وثماره على جدران كثير من معابدهم ومقابرهم .

### المناخ المناسب:

شجرة التين تتميز بمزايا النباتات التحت استوائية والمعتدلة حيث أنها تتحمل ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها إلى حد كبير إلا أن مدى الإحتياج للحرارة المثلئ للنمو بين ٢٩ - ٣٧ درجة م ، ولبراعم أشجار التين دور سكون شتوي مميز إلا أن وحدات البرودة اللازمة لكسر دور السكون لم تحدد بعد تحديدا كاملا ، وكثيرا من أصناف التين تحتاج إلى نسبة مرتفعة من الرطوبة الجوية وإنخفاض الرطوبة في أوقات معينة يؤدي إلى تساقط الثمار ، وتتأثر أشجار التين بحرارة الشمس الشديدة وينصح بطلاء جذوع الأشجار بالجير في هذه المناطق .

### الأرض المناسبة:

ينمو التين في أنواع كثيرة من الأراضي، فالتين المزروع في أرض رملية يكون ذو حجم جيد وله صفات ممتازة ولكن الأشجار تتدهور بسرعة لإنتشار الإصابة بالنيماتودا وتنجح زراعة التين أيضا في الأراضي الثقيلة بشرط جودة الصرف .

### العوامل المحددة لنجاح زراعة التين وثماره:

- ١ - إخفاق أو فشل ثمار التين في استكمال النمو وتظل محمولة على الأشجار حتى تسقط أثناء الشتاء وهي خضراء اللون (الباط).
- ٢ - عدم ملائمة بعض المناطق لنجاح إثمار بعض الأصناف.
- ٣ - شدة إصابة الأفرع بحشرة التين، الفنجانية الشعمية أو إصابة الأوراق بالاكاروس يؤدي إلى ضعف الأشجار وتساقط الثمار.
- ٤ - معاناة الأشجار للعطش خصوصا في مرحلة نمو الثمار خاصة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار.
- ٥ - استمرار نشاط النمو الخضري حتى بداية الخريف وإخراج ثمار لا تجد فترة كافية للنضج لانخفاض درجة حرارة الجو وعدم ملائمتها لنضج الثمار في أوائل الخريف لاسيما أثناء الليل.

## طرق الزراعة:

هناك طرق عديدة لإنشاء مزارع التين :

١- في المناطق التي تعتمد على الري الدائم:

(أ) المزارع العادية : تزرع الأشجار على مسافة  $4 \times 4$  م وتربى حيث تكون أشجار كبيرة الحجم .

(ب) مزارع نصف كثيفة : وفيها تزرع الأشجار على مسافة  $2 \times 2$  م

وتربى الأشجار بحيث تكون صغيرة الحجم .

٢- المناطق البعلية (الغير مروية) :

يزرع التين في الأراضي التي تتوفر فيها رطوبة مناسبة في التربة ويكون مياه

الأمطار بها غزيرا.

## مقاومة الحشائش:

تقاوم بالطرق السابق ذكرها سواء للحشائش الحولية أو المعمرة .

## التسميد:

يراعى الاسترشاد بهذه المعدلات في رسم البرنامج السمادي المناسب للتربة وكثافة الزراعة ويراعى الحذر في التسميد الأزوتي دون إسراف أو تقتير حتى يمكن تحقيق إثمار متوازن مع النمو الخضري ، وعادة ما تقوم برامج تسميد التين على السماد العضوي بمعدل ٤-٦ م٣ سماد بلدي أو ما يعادلها من أسمدة عضوية أخرى ويراعى خلط السماد العضوي قبل إضافته بسماد السوبر فوسفات بمعدل ٥ كجم لكل ٣ م٣ سماد عضوي ويتم التسميد العضوي خلال فصل الشتاء وتحتاج الأشجار المثمرة بالإضافة إلى ذلك إلى تسميد معدني بمعدل ٨٠-١٠٠ جم أزوت صافي للشجرة تضاف دفعة واحدة في الربيع (مارس) وأبريل ويخلط جيدا بالتربة ويضاف البوتاسيوم بمعدل ١٢-١٨ كجم للدنم .

## التقليم:

ترك أشجار التين دون تربية أو تقليم إلا أنها تستخدم معها إحدى الطرق

الآتية:

### (أ) الطريقة المفتوحة المركز:

تربى أشجار التين بالطريقة مفتوحة المركز عند الزراعة الخفيفة . وتربى أشجار التين بطريقة تربية كرمات العنب بالطريقة الرأسية . وتتبع هذه الطريقة في المزارع النصف كثيفة أما في المزارع الكثيفة فتحتاج إلى تقليم جائر سنويا .

## (ب) التقليم السنوي :

تعددت الآراء والنظم المتبعة في تقليم التين وفي المزارع القديمة لا يجري تقليم شتوي وينصح حالياً إجراء تقليم سنوي شتوي للأفرع عمر سنة ويفضل إتباع التقليم القصير أو التقليم الدائري بطريقة مماثلة لما يتبع في العنب ويرى البعض الإقتصار على إزالة أطراف الأفرع فقط لزيارة الإثمار.

## الجمع:

تتميز شجرة التين بإمتداد موسم صلاحية الثمار للقطف مع تعرض الثمار لسرعة التلف ما لم تجمع في الوقت المناسب ويستثنى من ذلك الأصناف الجديدة التي تصلح ثمارها للتجفيف ويحدد صلاحية الثمار للقطف عدة مقاييس خاصة أهمها وصول الثمار للحجم الكامل وتلون القشرة الخارجية وبدأ ليونة الثمرة ويجب أن تجمع الثمار كل يومين على الأكثر وترص في عبوات التسويق مباشرة ويلاحظ أن ثمار التين التي تتكون متأخرة في الموسم لا تصل إلى تمام النضج ويرجع ذلك إلى عدم توافر الإحتياجات الحرارية - ويختلف محصول الأشجار المميزة إلى حد كبير تبعاً لظروف البيئة وللرعاية والصنف والتربة وطريقة التربة وعموماً يعطى الدنم محصولاً يتراوح ما بين ٥٠٠ - ٢٠٠ كغم تبعاً للعوامل المذكورة.

## زراعة التين الكاكي (الكاكا)

الكاكي شجرة متساقطة الأوراق قصيرة متوسطة الحجم قليلة التفرع وهي من الأنواع التي كانت زراعتها محدودة في الشرق الأقصى حتى مدة قريبة ثم انتشرت زراعتها في الولايات المتحدة الأمريكية وحوض البحر الأبيض المتوسط .

## الأرض المناسبة:

تنمو أشجار الكاكي في مدة متسع من أنواع التربة إلا أن أنسب تربة لها هي التربة العميقة الخصبة الجيدة الصرف .

## التكاثر:

تتكاثر نباتات الكاكي أساسا بالتطعيم على أصول بذرية وأكثر الأصول استعمالا حتى الآن هو الطرابلس نظرا لكثرة بذورة .

زراعة البذور : تستخدم البذور من ثمار الطرابلس في الخريف وتزرع مباشرة على خطوط المشتل وتنبت بسهولة ويفضل أن تزرع داخل الصوب المظلمة ، وتستورد الآن بذور الطرابلس من الخارج نظرا لعدم إنتاج كمية كافية من البذور و بعد أن تنبت البذور ويصبح طول الباذرة حوالي ٨ سم تقلع البادرات من المهاد ويزال ١ / ٤ الجذر الوتدي لتشجيع الفروع الجانبية ثم تزرع البادرات داخل أكياس في مخلوط مناسب توضع داخل الصوبة حتى تصل للحجم المناسب .

## إعداد الأرض للزراعة:

تنمو أشجار الكاكي في مدة متسع من أنواع التربة إلا أن أنسب تربة لها هي التربة العميقة الخصبة الجيدة الصرف .

## **خدمة ما بعد الزراعة: مقاومة الحشائش :**

تستعمل نفس الطرق السابق الإشارة إليها في المحاصيل السابقة.

### **الري :**

يجري الري بالغمر عند الحاجة في الأراضي القديمة وبالتنقيط في الأراضي الحديثة مع مراعاة ما سبق مناقشته من ظروف لتحديد الحاجة الفعلية للري .

### **التسميد :**

يجب عدم المغالة في التسميد الأزوتي حتى لا يتأخر نضج الثمار وتحسن صفات الجودة بها ويناسبه برنامج التسميد المتبع في الخوخ .

### **تقليم الأشجار :**

ترك شجرة الكاكي لتنمو حرة دون تربية مع إزالة الأفرع المتزاحمة في غالبية بقاع العالم إلا انه يستعمل الآن في بعض البلدان طريقة القائد الوسطي المحور أو الطريقة الكاسية كما تجري في إيطاليا الطريقة الريشية التي تعتمد على الأسلاك .

### **المحصول:**

غالبية أصناف الكاكي إثمارها لا يكون غزيرا وتبدأ الأشجار في الإثمار بعد ٣ سنوات من الزراعة وتصل إلى الإثمار الكامل بعد ٨ - ١٠ سنوات من بدء الإثمار ، تجمع الثمار عند اكتمال نموها . ويعتمد غالبا على اللون وحجم الثمرة في معرفة هذا الموعد كذلك قد تستخدم نسبة المواد الذائبة الكلية لهذا الغرض ، وتباع الثمار الحلوة مباشرة بعد الجمع دون معاملة ، أما الثمار ذات الطعم القابض فيجب أن تزال المادة القابضة قبل التسويق بحفظ الثمار داخل عرف ترفع فيها درجة الحرارة ويضاف

لجوها كمية من غاز الايثلين كالايتون بتركيز ١٥ جزء في المليون ، تعبأ الشار في عبوات من الخشب أو من الكرتون يتراوح سعتها من ٢ - ٥ كجم ، وبعض أصناف الكاكي يمكن أن تخزن في الثلاجات لفترات تختلف حسب النوع .

### الآفات :

آفات مرضية : مثل التدرن التاجي، وآفات حشرية : مثل ذبابة فكهة البحر المتوسط - البق الدقيقي - المن - حفار الساق ، وآفات حيوانية : العناكب .

### زراعة الزيتون



الزيتون شجرة معروفة منذ القدم وقد ورد ذكرها كشجرة مباركة في كل الكتب السماوية ويتخذ غصن الزيتون رمزا للسلام وكانت شجرته أول ما نبت على سطح الأرض بعد الطوفان في عهد سيدنا نوح عليه السلام ... ومن المعتقد أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو الموطن الأصلي للزيتون.

## الأرض المناسبة:

يجب أن تجهز الأراضي التي سوف تزرع زيتونا وتكون غالبا أرضا بكرالم يسبق زراعتها بإخلائها من النباتات الطبيعية وحرثها عدة مرات لتنقية وتخليص التربة من بقايا هذه النباتات .

## إعداد الأرض للزراعة:

تسوى التربة إذا كانت ستروى بالغمر ، أما في الأراضي حديثة الاستصلاح والتي تروى بالتنقيط فيحدد مكان الجور على مسافة  $10 \times 10$  م أو  $8 \times 8$  م أو  $6 \times 3$  م ، حسب الكثافة المطلوبة في المزرعة، وتحفر الجور باستعمال أجهزة الحفر لعمق مناسب وتجهز بوضع أسمدة في قاعها وطبقة من الرمل ثم تغرس الشتلات وأفضل موسم لغرس الشتلات هو الفترة من نوفمبر حتى فبراير إلا أنه من المتبع ممكن غرس شتلات الزيتون في أي شهر من أشهر السنة ما عدا الأشهر الشديدة الحرارة أو البرودة .

## المناخ المناسب:

تنجح زراعة الزيتون تجاريا في المنطقة المعتدلة الدافئة ، ويناسبه مناخ البحر المتوسط (حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء) ويتراوح المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في مناطق زراعة الزيتون بين ٤ ، ٥ م وقد ترتفع درجة الحرارة القصوى إلى ٤٠ م في بعض المناطق دون حدوث ضرر للأشجار إما درجة الحرارة الصغرى فلا يجب أن تقل عن -٧ م .

تحتاج شجرة الزيتون إلى كمية مناسبة من البرودة الشتوية تختلف حسب الأصناف وذلك للحاجة إليها في تكوين الأزهار ويجب أن يكون واضحاً أن شجرة الزيتون ليست بالأشجار متساقطة الأوراق وإن إحتياجاتها للبرودة ليس لكسر دور السكون الشتوي (دور الراحة) ولكن إحتياج البرودة يكون لتنشيط عملية تكوين الأزهار داخل البراعم ، وتتميز معظم مناطق زراعة الزيتون بعدم انتظام الأمطار بها والتي غالباً ما تسقط شتاءً وتؤثر زيادة الرطوبة الجوية تأثيراً سيئاً على الأشجار حيث تشجع على نمو الفطريات ويفضل أن تبعد مزارعة مسافة لا تقل عن كيلو متر من شواطئ البحار . وتعتبر شجرة الزيتون من الأشجار ذات الإحتياجات الضوئية المرتفعة ولذلك يجب تجنب زراعة أشجار الزيتون تحت ظلال أشجار أخرى .

### **التربة المناسبة:**

تنمو أشجار الزيتون بنجاح في أنواع مختلفة من الأراضي تشمل الأراضي القاحلة حيث تزرع الأشجار في مناطق صخرية على سفوح المرتفعات وذلك في جور تنسف بالديناميت قبل زراعة الأشجار وتنجح زراعة الزيتون في التربة الرملية والكلسية والطينية ، أما الإنتاج الاقتصادي من زراعة أشجار الزيتون (إنتاج المحصول) فيرتبط ارتباطاً كبيراً بنوعية التربة ، ويفضل عند زراعة الزيتون في المناطق الجافة مثل التربة الرملية التي تخزن الماء في طبقات عميقة حتى لا يضيع الماء المختزن من الطبقات السطحية بالبخر السريع وتحمل أشجار الزيتون ارتفاع كلوريد الصوديوم في التربة إلى حد كبير والمفضل زراعة الزيتون في تربة يقل فيها

كلوريد الصوديوم عن واحد في الألف إلا أنه قد لوحظ نجاح بعض سلالاته التي تروي بماء ري يصل فيها تركيز كلوريد الصوديوم إلى ١٢٥٠ جزء في المليون .

### **الإحتياجات المائية والري:**

الإحتياجات المائية لشجرة الزيتون قليلة نسبيا بالمقارنة بأنواع الفاكهة الأخرى ويزداد إحتياج شجرة الزيتون للماء بدرجة واضحة خلال الفترة التي تبدأ قبل الأزهار وتمتد إلى أن يتم العقد وتتجاوز الثمار مرحلة النمو النشط . وهذه الفترة في المناطق الشمالية حيث موسم الأمطار الشتوية وقد لوحظ أن في السنوات التي تقل فيها هذه الأمطار يؤثر الجفاف على تكوين مبايض الأزهار مما يؤدي إلى قلة المحصول بعد ذلك ، أما الفترة الثانية التي يزيد فيها إحتياج الأشجار للماء توافق مرحلة تصلب النواة (الغلاف المحيط بالبذرة) ويحدث ذلك في شهر أغسطس أي في أشد الشهور جفافا .

### **التغذية والتسميد:**

يتطلب تحقيق الإنتاج الاقتصادي بزراعات الزيتون توفير حاجة الأشجار من العناصر الغذائية ويعتبر عنصر الأزوت من أهم العناصر التي يجب مراعاة الدقة في كمية وتوقيت ما يضاف منها دون إفراط أو تقترير حيث أن زيادته في غير حاجة إليه قد يترتب عليها زيادة النمو الخضري وقلة الإثمار بينما تؤدي إضافته بكميات كبيرة في الربيع وخاصة قبيل عقد الثمار إلى زيادة المحصول على حساب حجم الثمار ، ولا تفيد الكميات المبالغ فيها من الأزوت في مقدار المحصول النهائي للأشجار بالأراضي الخصبة ، أما في الأراضي الرملية أو الفقيرة فتظهر حاجة

أشجار الزيتون إلى التسميد الفوسفاتي والبوتاسي بالإضافة إلى التسميد الأزوتي ، وبصفة عامة يعتبر تحليل الأوراق وتقدير مستوى العناصر الغذائية بها من أفضل الطرق المستخدمة في معرفة الإحتياجات السبادية الحقيقية لأشجار الزيتون بالإضافة إلى فائدة تحليل الأوراق في متابعة مدى استجابة الأشجار لبرامج التسميد المستخدمة ويعتبر التسميد ضروريا عندما ينخفض محتوى المادة الجافة للأوراق من الأزوت عن ١.٣٪ ومن الفوسفور عن ١.٥٪ ومن البوتاسيوم عن ٠.٨٪. وتحتاج الأشجار الصغيرة قبل عمر الإثمار إلى تسميد أزوتي بمعدل ٦٠ جم أزوت صافي، تسميد فوسفاتي بمعدل ١٥ جم خامس أكسيد فوسفور (فورا) وتسميد بوتاسي بمعدل ٣٥ جم بوا وذلك لكل سنة من عمر الشجرة . وتختلف كمية السباد الأزوتي تبعا لمقدار محصول الشجرة ، وقد يصل الإحتياج الأزوتي السنوي إلى ١ كجم أزوت صافي بمعدل مستوى مقداره ٤٠٠ جم أوت، ٥ جم فوا، ١٨ جم فوا وتوفر الإحتياجات السبادية من الأزوت في صورة عضوية وغير عضوية وتزداد أهمية التسميد العضوي بالأراضي حديثة الاستصلاح والمناطق الغير مروية (الزراعات البعلية) حيث يتم التسميد العضوي بمعدل ٢,٥ - ٥ متر مكعب سباد بلدي للدنم أو ما يعادله من الأسمدة العضوية الأخرى ، وتضاف الأسمدة العضوية خلال فصل الخريف في خنادق أسفل المحيط الخارجي لظل الأشجار مع ملاحظة تغيير الخندق من سنة إلى أخرى ، ويراعى خلط السباد البلدي قبل إضافته بسباد السوبر فوسفات بمعدل ٥ كجم لكل متر مكعب سباد بلدي ثم

يضاف المخلوط خلال الخريف أو الشتاء ، ويضاف السماد الأزوتي المعدني في الأعمار الصغيرة على ثلاثة دفعات متساوية في مارس، مايو، أغسطس أما في الأشجار المثمرة فيضاف اتمقنن على دفعتين الأولى وتشمل ٣/١ المقنن السنوي وتضاف قبل تفتح البراعم الزهرية والباقي يضاف في يونيو ويضاف السماد البوتاسي على دفعات متساوية بالتبادل مع دفعات التسميد الأزوتي ويوزع المقنن السنوي من السماد الفوسفاتي على دفعتين أو دفعة واحدة مع التسميد الأزوتي .

### **تبادل الحمل :**

يتميز الكثير من أصناف الزيتون بالظاهرة المعروفة بتبادل الحمل حيث تحمل الشجرة محصولا غزيرا في أحد السنوات ولا تحمل محصولا في السنة التالية ويمكن بتنظيم عملية التقليم وخف الثمار في سنة الحمل الغزير التغلب على هذه الظاهرة .

### **التقليم وتربية الأشجار :**

تربى شجرة الزيتون وتهذب في أول حياتها بطريقة تجعل هيكلها قويا يتكون من ساق رئيسية طولها حوالي ٥٠ سم ويخرج عليها من ٣ - ٤ أذرع وتترك الأذرع لترتفع ارتفاعا مناسباً ويسمح بخروج أفرع ثانوية عليها وتحقق هذه الطريقة المزايا التالية :

- ١ - قلة التعرض لضرر الرياح .
- ٢ - الإثمار المبكر .
- ٣ - قلة نفقات جمع المحصول .
- ٤ - حماية الساق من لفحة الشمس .

## ٥ - شرعة تغطية سطح التربة .

ويجب عدم إزالة حجر الشجرة أي الجزء السفلي منها والذي يزيله كثيرا من المزارعين بحجة أن الثمار تلامس سطح الأرض حيث أنه قد ثبت أن هذا الجزء يحمل أكثر من ٥٠٪ من المحصول نتيجة لأن محمي من الظروف الجوية الغير ملائمة ، ومن الأفضل إجراء التقليم سنويا للأشجار بإزالة الأفرع الجافة والمتزاحمة كذلك ، خف عدد من الأفرع التي يتحمل الثمار إلا أنه من النادر إتباع هذه الطريقة نظرا لقلة الأيدي العاملة المدربة في المناطق التي يزرع فيها زيتون .

### التكاثر:

### أولا التطعيم:

أ- التطعيم الدرعي : يستعمل في تطعيم الزيتون بنجاح كبير ويتم في شهر أبريل ويفضل أن يستبقى بالطعم جزء من الورقة حيث أنه يؤثر على نسبة النجاح بدرجة كبيرة.

ب- التطعيم القلبي الطرفي المفرد : فيه تقطر الشتلات قرب سطح الأرض في نهاية شهر مارس ويركب فيها قلم .

ج- التطعيم باللصق : كان يستعمل بكثرة بل كانت الطريقة الوحيدة للإكثار إلى وقت قريب إلا أنه يحتاج إلى مجهود كبير ويحد من الأعداد التي ينتجها المشتل علاوة على أن منطقة التطعيم تكون ضعيفة سهلة الكسر وعموما لا يلجأ للتطعيم الآن إلا في حالة الأصناف التي يصعب

إكثارها بالعقلة حيث أن العقل هي الوسيلة السريعة والسهلة في إكثار

الزيتون .

### ٣- العقل الساقية :

**أ- العقل النصف خشبية :** وهي أكثر الوسائل انتشارا لإكثار أصناف

الزيتون الآن وتجهز العقل النصف خشبية من المنطقة التحت طرفية

وذلك في جميع أوقات السنة حيث يتم استبعاد الجزء الطرفي من أفرع

عمر سنة وتؤخذ العقلة من الجزء التحت طرفي وتزال كل الأوراق عدا

ورقتين وبعد تجهيز العقل بهذه الطريقة نغمس قواعدها في محلول

كحولي من اندول حامض الخليك بتركيز (٣٠٠٠ - ٤٠٠٠ جزء في

المليون) وتترك العقل بعد المعاملة لمدة ١٠ دقائق حتى يتطاير الكحول

ثم تغرس في صواني زراعة العقلة في مخلوط من الرمل والبيت موس

بنسبة ٣ : ١ وتوضع أواني الإكثار تحت ضباب متقطع (٥ ثواني كل ٤

دقيقة) من شروق الشمس إلى غروبها ويقضل الضباب طوال الليل وفي

أشهر الشتاء يدفأ قاع العقلة بوضع الأواني فوق أجهزة التدفئة وترفع

درجة الحرارة ٥ لمدة ٣ شهور وبعد بدء تكون الجذور ترفع الصواني من

أحواض الضباب وتترك لتقسيتها لمدة حوالي شهرين

داخل الصوبة على أن تروي بالرش العادي ثم تفرد الشتلات الناجحة

في أكياس من البولي إيثيلين الأسود بارتفاع ٣٠ سم وقطر ١٥ سم

ويعتني بتغذية الشتلات ومكافحة الآفات وتكون جاهزة للبيع

والغرس بالمكان المستديم بعد سنة من تاريخ التفريد . وتختلف نسبة

نجاح العقله النصف خشبية في هذه الطريقة تبعا لإختلاف الأصناف وهناك أصناف سهلة في إخراج الجذور مثل البيكوال والعجيزي وتصل نسبة النجاح إلى ٧٠٪ وبعضها قليل النجاح لا تزيد نسبة نجاح عقلها النصف خشبية عن ٥٪ مثل كلاماتا والتفاحي .

**بـ العقل الساقية الخشبية :** هناك طرق عديدة لزراعة العقل الخشبية حيث يمكن زراعتها بكل الطرق التي درست في أساسيات البساتين وتجهيز العقل الخشبية خلال الفترة من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير .

#### **٤ـ القرم والسرطان :**

وهي طريقة التكاثر القديمة التي كانت سائدة في حوض البحر المتوسط وفيها تؤخذ التورمات الموجودة في قاعدة ساق الأشجار المسنة وهي اعرف باسم القرم وكذلك السرطانات من مزارع قديمة وتزرع مباشرة في البستان وهذه الطريقة لا تتبع الآن في المزارع التجارية .

#### **ثانياً: التكاثر البذري:**

تزرع بذر الزيتون لإنتاج شتلات بذرية للتطعيم عليها ، تجمع الثمار تامة النضج (السوداء) تغسل عدة مرات بالماء والرمل وتنقع في محلول كربونات صوديوم ٤٪ لمدة ١ / ٢ ساعة - ثم تغسل بماء جاري لمدة طويلة وتزرع البذرة غالباً في شهر نوفمبر متكاثفة في مهاد البذرة ثم تنقل البادرات بعد أن يخرج عليها ٦ أوراق إلى خطوط المشتل حتى يصل سمكها إلى سمك القلم الرصاص ثم تطعم .

## الملقحات :

لظاهرة عدم التوافقى الذاتي أو عدم التوافق الخلطي أو الظاهرتين معا وهو ما يعرف بالعقم الجزئي ومن المفضل للتغلب على مشكلة عدم التوافق الذاتي والخلطي الجزئي زراعة أصناف مختلفة في البستان الواحد لضمان العقد وضمان الحصول على محصول كافى ويراعى توافق وتداخل مواعيد التزهير وينصح باستخدام الصنف (كروناكي) كملقح في زراعات الزيتون وفي الغالب يكفي زراعة الصفوف المحيطة بالمرعة من هذا الصنف التلقيح حيث أن ثماره صغيرة لا تصلح إلا لاستخراج الزيت .

## مقاومة الحشائش وعزيق التربة:

نظرا لأن الزيتون يغرس غالبا في مناطق جافة فإنه من الواجب حرث الطبقة السطحية من التربة باستمرار لتقليل عملية البخر من التربة وبالتالي المحافظة على الماء في الطبقات السطحية أما في المزارع الحديثة التي تروى بالتنقيط تنظف مواضع الجور باستمرار من الحشائش كما تخلى الأرض من الحشائش فيما بين صفوف الأشجار ، وفي حالة توفر الآلات المناسبة تجري علة عزقات سطحية لنفس الغرض السابق ويمكن استخدام مبيدات الحشائش للتخلص من الحشائش النجيلية في مناطق الجور ويستخدم الالاسر (الروندآب) بتركيز ٢٪/رشا على النموات للحشائش وهي في قمة النشاط مع الاحتراس من وصول المبيدات إلى الشار.

## تجديد الأشجار المسنة:

كثيرا ما نصادف بمزارع مهملة وصلت فيها الأشجار لمرحلة الشيخوخة مما ينتج عنه ضعف النمو الخضري وقلة الإثمار ولتجديد حيوية مثل هذه الأشجار يجري الآتي :

١ - قرط أذرع الشجرة الرئيسية قرطا جائرا .

٢ - إزالة الأفرع الجافة .

٣ - خف ٥٠٪ من الأفرع الحديثة على الجزء المتبقي من الأفرع .

٤ - مقاومة الآفات التي تصيب الشجرة .

٥ - تسميد الشجرة تسميدا غزيرا .

### **الإثمار وكمية المحصول:**

تبدأ الأشجار البذرية الإثمار في العام الخامس لزراعتها في المزرعة ولا تصل إلى حد الأقصى للإنتاج قبل ٥ عاما من غرسها ، أما الأشجار المكثرة بالعقلة فإنها تحمل محصولا ابتداء من العام الثالث لزراعتها في المزرعة ويختلف المحصول باختلاف الصنف ومعاملة الأشجار ، ولا يعتبر المحصول اقتصاديا إذا قل عن ٣٠ كجم للشجرة .

### **مراحل النضج وجمع المحصول:**

يكتمل نمو الثمار فتصل إلى أقصى حجمها بعد ٦ إلى ٨ أشهر من الأزهار تبعا للأصناف والمواسم والمناطق ، ويتحدد الميعاد المناسب لجمع الثمار تبعا للغرض المطلوب من أجله الثمار ، فإذا ما كانت للتخليل الأخضر فإنها تقطف عندما يكتمل نموها وتصل إلى تمام الحجم المميز لها وتكون عندئذ بلون أخضر باهت يميل قليلا

للاصفرار ، وأما إذا كانت للتبيل (تمليح الزيتون الأسود) أو لإنتاج الزيت فترك على الأشجار حتى تتم تغيرات اللون النهائي حيث يتحول اللون الأخضر والفاتح وتدرجياً إلى البنفسجي الباهت ثم البنفسجي الداكن ثم الأسود وعنده تصل الثمار إلى تمام النضج . وقد وجد أن نسبة الزيت بثمار الأصناف الخاصة باستخراجه ترتفع تدريجياً حتى تصل إلى أقصاها عندما تصل الثمار إلى درجة التلوين الأسود ويتم ذلك حوالي آخر شهر أكتوبر .

### **طرق جمع الثمار:**

ثمار الزيتون لا تكون طبقة انفصال طبيعي عند النضج فلا يجري معها عملية هز الأشجار عند الجمع ولهذا فغالبا ما تقطف الثمار يدويا مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتصل تكاليف الجمع في بعض الحالات إلى ٧٠٪ من التكاليف الكلية التي تنفق على الإنتاج في المزرعة وقد تفاقمت هذه المشكلة في كثير من البلدان مما جعلهم يفكرون في عملية الجمع الآلي للثمار والتي يمكن أن تتم الآن بعد تكوين طبقة انفصال صناعية والطريقة المستعملة الآن هي الرش قبل موعد الجمع بخوالي ٥ أيام محلول مائي من الأبيون تركيزه ٥٥-١٠٠٠ جزئي في المليون وقد تستخدم مواد أخرى مماثلة ومولدة للإثيلين ومن ناحية أخرى فقد استخدم آلات لجمع الثمار تعتمد على هز الأشجار ومن هذه الآلات ما يعتمد على تثبيت ذراع الآلة على أحد أذرع الشجرة فينتقل إليه عند التشغيلذبذبة سريعة جدا تؤدي إلى تساقط الثمار على غطاء من البلاستيك يفرش تحت الشجرة ويتوقف نجاح هذه الطريقة على العوامل التالية :

١ - الصنف : وقد لوحظ أن هذه الطريقة تنجح مع بعض الأصناف ولا تنجح في الأصناف الأخرى .

٢ - الظروف الجوية : حيث يساعد ارتفاع الحرارة والجفاف على تسهيل عملية الانفصال .

٣ - مدى تساقط الأوراق : لأنه في بعض الأحيان يؤدي إتباع هذه الطريقة إلى تساقط كثير من الأوراق مع الثمار مما يضر بالشجرة نفسها .

### **الآفات والأمراض**

الحشرات القشرية - ذبابة الزيتون - دودة أوراق الزيتون - حفار الساق - ثاقبات الأوراق، خنافس القلف، ناخرة أوراق الزيتون، الأكاروس ، وتتم مكافحة طبقا للبرامج الخاصة بهذه الآفات في التوصيات الصادرة من وزارة الزراعة والتي ورد ذكرها مع المحاصيل الأخرى .

### **الآفات الحيوانية : النيماتودا .**

أمراض فطرية : تبقع الأوراق ( عين الطاووس) ذبول الفرتسليم ويصيب المجموع الجذري .

## زراعة النخيل (البلح) المناخ المناسب:

١- الحرارة: يتحمل نخيل البلح البالغ المثمر إنخفاض درجة الحرارة شتاء إلى ما دون الصفر المئوي وارتفاعها صيفا إلى ٥٠ درجة م، وتزداد مظاهر الضرر التي يعاني منها النخيل إذا ما استمرت هذه الظروف القاسية لفترات طويلة ويكون الضرر في تناسب عكسي مع العمر، ولا يزهر النخيل في المناطق التي تنخفض فيها درجة الحرارة في الظل عن ١٨ درجة م، صيفا، أما تكوين الثمار ونضجها فيحتاج خلال موسم النشاط (مايو - أكتوبر) إلى متوسطات درجات حرارة يومية يزيد عن ٢٧ درجة م للأصناف الطرية ويزيد عن ٣٢ درجة م في الأصناف نصف الجافة والجافة، وفي هذا النطاق تبكر ثمار الصنف الواحد في النضج في تناسب طردي مع ارتفاع متوسطات الحرارة كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب.

٢ - الرطوبة الجوية والأمطار: يحتاج الإنتاج التجاري للبلح إلى جو جاف خال من الندى والضباب ولا تتوفر فيه فرصة الأمطار وخاصة خلال فترة الإزهار والتلقيح وكذلك أثناء نضج الثمار، ويتحمل نخيل البلح جفاف الجو وانخفاض الرطوبة الجوية إلى ٥ ٪ كما هو الحال في المناطق الصحراوية. ويلاحظ أن هذه النسبة من الرطوبة لا تلائم معظم أنواع الفاكهة الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأضرار التي تترتب على

زيادة رطوبة الجو ترجع أساسا إلى ملائمة هذه الظروف لانتشار الأمراض والآفات .

٣- **الضوء:** نخيل البلح من الأنواع المحبة للضوء وتفشل في تحقيق إثمار كفاء في المناطق التي تكثر فيها السحب والغيوم حتى لو توفرت بها درجات الحرارة والإحتياجات الحرارية المناسبة حيث تميل النباتات إلى النمو الخضري واستطالة الساق .

٤ - **الرياح** تسبب العواصف الشديدة سقوط النخيل الطويل المتقدم في السن والضعيف ، أما الثمار فتسبب الرياح الشديدة إصطدامها بالسعف وتؤدي إلى ظهور البقع السوداء على الثمار الخضراء كما يؤدي هبوب الرياح الشديدة إلى إعاقة عملية التلقيح .

### **التربة المناسبة :**

تنجح زراعة نخيل البلح في أنواع مختلفة من الأراضي بدرجة تفوق الكثير من أشجار الفواكه الأخرى ويعتبر عمق التربة وانخفاض مستوى الماء الأرضي من أهم العوامل اللازمة في مزارع النخيل فتجود زراعة وإنتاج نخيل البلح في الأراضي العميقة حتى ولو كانت فقيرة عن زراعته في أراضي خصبة ولكن غير عميقة (ضحلة).

### **مدى تحمل أشجار النخيل للملوحة التربة**

تتحمل أشجار النخيل ملوحة التربة بدرجة تفوق الكثير من أشجار الفواكه الأخرى ولو أن إنتاجيتها تقل مع زيادة ملوحة منطقة انتشار الجذور ولا ينصح

بزراعة النخيل في الأراضي التي تتعدى نسبة ملوحتها ٧٠٠٠ جزء في المليون في منطقة انتشار المجموع الجذري إلا أن نسبة الملوحة في الطبقة السطحية قد تزيد عن ذلك ولكن العبرة في المنطقة التي تنمو بها الجذور .

### **قوام بعض أنواع الأراضي وكيفية علاجها:**

الأراضي الصفراء الرسوبية : وهي أنسب أنواع الأراضي لزراعة أشجار النخيل بشرط خلوها من الملوحة العالية وانخفاض مستوى الماء الأرضي بالتربة .

### **تكاثر النخيل ورعايته:**

من الممكن إكثار نخيل البلح بأي من الطريقتين الجنسية أو اللاجنسية (الخضرية) كما يلي :

#### **أولا : التكاثر الجنسي:**

حيث تنتج الفسائل الجديدة من نمو الأجنة الجنسية الموجودة بالبذور (النوى) وهذه الطريقة كانت سائدة من فترة قصيرة في كثير من مناطق زراعة التمر وإن كان قد قل استخدامها حيث مازالت تستخدم على نطاق ضيق في بعض المناطق المنعزلة أو على نطاق بحثي ولا ينكر أن النخيل النامي من زراعة البذرة موجود في كثير من المناطق المشهورة بزراعة النخيل كما أن غالبية الذكور (الفحول) المنتشرة والمستمدة في التلقيح ناتجة من زراعة البذور .

## عيوب الإكثار بالنوى:

الثمار الناتجة من النخيل البذري أقل جودة في صفات الثمار والمحصول عنها في ثمار الأصناف المعروفة والتي أكثر خضرياً (بالفسائل) ويقدر نسبة النخيل البذري الذي يعطى ثماراً تفوق جودة ثمار الأمهات بما لا يتجاوز ٠.١٪ من النخيل الناتج .

نخيل البلح من النباتات وحيدة الجنس لذلك من المتوقع الحصول على نخيل نصفها مؤنث والنصف الآخر مذكر (فحول) ويصعب التفريق بين الذكور والإناث في المراحل المبكرة من نموها وهذا يستوجب خدمة جميع النباتات الناتجة وحتى يمكن التفرقة بين الأجناس بعد الوصول لمرحلة التزهير .

غالباً تتأخر الأشجار البذرية في وصولها إلى مرحلة الإزهار والإثمار مقارنة بالنخيل المتكاثر بواسطة الفسائل كما أن ثمار الأصناف البذرية تباع بأسعار منخفضة جداً مقارنة بأسعار ثمار الأصناف المعروفة وبالرغم من عيوب الإكثار فإنها الطريقة الوحيدة لانتخاب الأصناف الجديدة والتي تتميز بصفات يرغبها المربي سواء كمية محصولها وخصائص ثمارها أو لمقاومتها لأمراض معينة مثل مرض البيوض أو زيادة تحمل ملوحة ماء التربة أو الري . . . إلخ .



## **الحجم المناسب للفصل ثانيا : التكاثر الخضري - الإكثار بالفسائل :**

من عهد قريب وقبل التقدم في تقنية زراعة الخلايا والأنسجة النباتية كانت الفسائل هي الطريقة الوحيدة لإكثار النخيل خضرياً وتنتج الفسائل من المرستيات الموجودة في إبط الأوراق القريبة من سطح التربة وهي بذلك تكون جزء من الأم وجميع أصناف النخيل سواء كانت إناثاً أم ذكوراً تنتج فسائل في السنوات الأولى من عمر النخلة وتدعى المنطقة التي تربط بين الفسائل الصغيرة وبين قواعد النخيل (بالسلعة أو الفطامة) وعن طريق هذه السلعة تمد النخلة فسائلها بالغذاء حتى تنمو جذورها ويمكنها الاعتماد على نفسها عند الفصل ، ومن هذه السلعة دون غيرها يجري فصل الفسائل من أمهاتها .

### **كيفية الحصول على فسائل جيدة**

من المرغوب الحصول على فسائل متجانسة وجيدة ويمكن تحقيق هذا الهدف

بالآتي :

تربية عدد محدود من الفسائل حول الأم (٥ - ٦ فسائل) موزعة بانتظام حول جذوع النخلة .

العناية بخدمة وتربية الفسائل في قواعد أمهاتها والمحافظة على سعتها إلى حين وقت فصلها من حول الأم .

يقتصر التقليم خلال مرحلة تربية الفسائل على إزالة الأوراق الصفراء والجافة من الفسائل المختارة .

يمكن تشجيع النخلة على إنتاج فسائل من قاعدتها بتكوين التربة حول الجذع وحتى ارتفاع نصف المتر مع تربيطها بالماء لتشجيع نمو المرستيات الإبطية وتكوين الجذور .

## **فصل الفسائل**

تختلف الطرق المتبعة في فصل الفسائل حسب المناطق ويمكن تلخيص أهم طرق الفصل فيما يلي :

### **أ- الفصل الكامل:**

قبل ميعاد الفصل بشهرين ينظف حول الفسيلة حيث تزال الفسائل الصغيرة ثم يكوم حولها التراب ليساعدها على تكوين مجموع جذري قوي .

ثم يتبع الخطوات التالية عند الفصل :

- يقلم جريد الفسيلة بحيث لا يبقى منه سوى صفيين حول القلب لحماية البرعم الطرفي (الجمارة) ويقرط الجريد المتبقي إلى حوالي نصف طوله ثم يربط ربطاً هيناً قرب الطرف حتى لا يعيق عملية التقليم .

- يـقلم الكرناف السفلى بدقة بحيث لا يترك منه شيئاً حول الساق .
- يزاح التراب من حول الفسيلة المراد فصلها حتى يظهر مكان اتصالها بالأم (السلعة أو الفطامة) ثم يكشف عن قاعدة الفسيلة .
- يؤتى بالعتلة (آلة حادة تشبه من طرفها الأزميل وقمتها غليظة بطول حوالي متر) توضع بين الأم والفسيلة ثم يضرب عليها بعتلة أو مطرقة ثقيلة من الخشب حتى تنفصل الفسيلة عن الأم مع جزء من الجذور وقد يقوم العامل المدرب برفع العتلة بيديه ويهوى بها على منطقة الاتصال ويكرر الضرب حتى يتم قطع الفطامة وكما تم الفصل بعدد أقل من الضربات كلما دل ذلك على مهارة العامل .
- عندما تقارب الفسيلة على الانفصال فعلى أحد العاملين أن يتلقاها برفق حتى لا تسقط على الأرض فترتطم بها والذي قد يؤدي إلى حدوث شروخ أو رضوض بالجذارة .
- تنظف الجذور القديمة بعد انفصال الفسيلة كما تزال الجذور المجروحة أو المهشمة وتقصّر الجذور الباقية .
- يجب أن يتم النقل برفق وحذر خوفاً على الجذارة وأن تلف بشكل مناسب (خيش أو قش أرز أو أكياس) يحمى قمتها من الجفاف قبل أو بعد الزراعة .



الفسيلة بعد الفصل الكامل

### ب- الفصل الجزئي:

في حالة الفسائل الكبيرة الحجم نسبياً (أطوال من ١ - ٢ متر) من الأفضل أن يتم فصلها بطريقة تدريجية (فصل جزئي) حيث يتم فصلها مبدئياً في الخريف ثم استكمال الفصل في أوائل الربيع وبذلك تكون الخلفة قد استقلت عن الأم استقلالاً نصف كامل بما أنتجته من جذور عرضية عند منطقة الفصل ويساعد ذلك على رفع نسبة نجاح الفسيلة بعد فصلها عن الأم وزراعتها مستقلة في المكان المستديم . ويفضل تعقيم منطقة الجرح بأحد المبيدات الفطرية حتى لا تكون عرضة للإصابة بالفطريات خاصة فطر الدبلوديا أو غيره .

### الاستفادة من الراكوب (الفسائل الهوائية) في الإكثار :

أما الفسائل التي تخرج على الجذع في إبط الأوراق بعيدة عن سطح الأرض فتسمى بالراكوب أو الطاعون أو الفسائل الهوائية وقليلاً ما تستعمل في الإكثار

وذلك لصعوبة نجاحها لعدم وجود مجموع جذري إلا أن بعض السلالات النادرة والمرغوبة والتي تعدت مرحلة إنتاج الفسائل فيتم استخدام طريقة الترقيد الهوائي لهذه الطوائع بعمل تجريح في منطقة الاتصال واستخدام بعض منظمات النمو المشجعة على التجذير بغرض تشجيع تجذيرها قبل فصلها عن الأم وتحاط بأكياس البولي إيثيلين أو صندوق خشبي يحيط بقاعدة الراكوب وتربط أو تثبت بجذع النخلة الأم مع توفير وسط من البيت موس أو نشارة الخشب والرمل وبعد ٤ - ٦ شهور يتكون مجموع جذري حول الراكوب ويمكن فصله عن الأم ويزرع في المشتل أو الأرض المستديمة مباشرة .

### **الاستفادة من النخيل المسن المرتفع الجذع:**

يمكن إعادة فصل وزراعة بعض السلالات البذرية النادرة والمرغوبة ذات الصفات الجيدة والتي لا تعطى فسائل نتيجة لكبر عمرها عن طريق إزالة الكرناف وعمل تجريح على الجذع بطول ٥ - ٤ سم (ويكون ذلك أسفل رأس النخلة بمترين) مع استخدام بعض منظمات النمو المشجعة على التجذير بغرض تشجيع تجذيرها في هذه المنطقة المجروحة ، ثم يثبت صندوق خشبي حول الجذع وتعامل بنفس الطريقة التي سبق ذكرها في حالة الراكوب أو الفسائل الهوائية ، ثم بعد نجاح خروج الجذور في منطقة التجريح يتم فصل الجزء العلوي عن بقية الجذع بعد تقليم السعف مع ترك صفيين منه حول القلب (الجمارة) ويتم الفصل بالاستعانة بونش كهربائي ذو شوكتين لقبض الجذع أسفل رأس النخلة حتى يتم فصلها بالمنشار

أسفل منطقة الجذور وفي حالة عدم توفر الونش يمكن فرش الأرض أسفل النخلة ببالات من قش الأرز التي تعمل كمخدة تقلل من أثر ارتطام الجزء المفصول بالأرض وذلك للمحافظة على البرعم الطرفي (الجمارة) من الموت أو الكسر .

### **العناية بالفسائل المفصولة:**

تعتبر العناية بالفسائل بعد فصلها من الأمور الهامة لضمان نجاحها وينصح باتباع الآتي :

- عدم تعرض الفسائل المفصولة لظروف تساعد على الجفاف حيث يجب أن تحفظ في مكان ظليل وترطب جذورها بالماء أو توضع قواعدها في ماء جاري حتى موعدها زراعتها .
- في حالة نقل الفسائل لزراعتها في أماكن بعيدة أو تأخير زراعتها لأي سبب من الأسباب يجب أن يلف المجموع الجذري وكذلك الأوراق بالقش أو الأجوالة أو أكياس مع ترطيبها حين زراعتها خوفاً عليها من الجفاف .
- يفضل أن تعقم السطوح المجروحة بالمطهرات الفطرية وقد تدهن السطوح المطهرة بمادة تمنع بخر الماء ومهاجمة الكائنات الدقيقة مثل البيوتامين .
- ينصح بتبخير الفسائل بغاز بروميد الميثيل لقتل الحشرات التي تكون موجودة عليها .
- يجب أن يتم تداول الفسائل بلطف حتى لا تتعرض للصدمات والتي قد تسبب شروخ أو تشققات في منطقة الجمارة مما يتسبب في موت الفسيلة .

- يجب الإسراع في زراعة الفسائل بعد فصلها وعدم التأخر في زراعتها لفترات طويلة وعموماً فكلما أسرعنا في زراعتها كلما أعطت نسبة أعلى من النجاح .

الحصول على فسائل من النخيل الذي فقد قدرته على إنتاج الفسائل .



## ري النخيل

على الرغم من تحمل أشجار النخيل للجفاف إلا أنه إذا تعرض للعطش مدة طويلة فإن معدل النمو الخضري للأوراق يقل بوضوح وتقل صفات الثمار وينخفض محصولها بدرجة كبيرة وعلى العكس من ذلك حيث تستطيع جذور النخيل أن تتحمل غمر التربة بالماء لمدة طويلة أيضاً ولكنها لا تفضل الحالتين إذا أردنا لها النمو والإثمار بدرجة جيدة وبالرغم من تحمل الشجرة للجفاف إلا أن إحتياجاتها المائية مرتفعة وتختلف الإحتياجات المائية للنخيل باختلاف نوعية التربة والماء المضاف وطريقة الإضافة والظروف الجوية المحيطة وحالة النشاط الفسيولوجي للنخلة ومراحل نموها والتي يمكن تقسيمها كالتالي :

### **أ- فترة ما بعد جمع المحصول:**

- يراعى عدم إهمال الري في هذه الفترة للمساعدة في تكوين الطلع الجديد ويكون الري على فترات متباعدة شتاءً .

- بداية مرحلة النمو الخضري والنشاط قبل فترة التلقيح.

- يكون الري على فترات متقاربة حيث أن عدم الري يقلل من نشاط النمو الخضري والزهرى مما يؤثر على المحصول وصفات الثمار الناتجة .

### **ب- فترة التزهير والعقد:**

يكون الري خفيف على الحامى مع تجنب العطش أو الإسراف حيث أن انخفاض أو زيادة الري في هذه الفترة تسبب تساقط جزء كبير من الأزهار والعقد الصغير .

### **ج- فترة نمو وتكون الثمار وتلوينها:**

يجب أن يكون الري على فترات متقاربة حتى فترة اكتمال نمو الثمار حيث أن نقص الماء بعد العقد يسبب انخفاض في سرعة نمو الثمار ويؤدي إلى سقوط الكثير منها وصغر حجمها ، وفي بعض الأصناف ذات الحساسية الكبيرة للرطوبة والتي تؤدي إلى حدوث ظاهرة التشطيب في الثمار (تكوين خطوط غير منتظمة الشكل طولية وعرضية على جلد الثمرة) يجب تقليل كميات ماء الري في المراحل الأخيرة من تكوين الثمار وقبل تلوينها كما يجب عدم زراعة محاصيل بينية بين أشجار النخيل حتى لا تسمح بزيادة الرطوبة الجوية حول الثمار في تلك المرحلة .

وفي بعض الأصناف مثل البرحي يعتبر تقليل كمية المياه والتحكم في الري خلال هذه الفترة ذات أهمية بالغة لتفادي التأثير السيئ للرطوبة على الثمار .

## د- فترة نضج الثمار:

يكون الري على فترات متباعدة وخفيف للعمل على سرعة نضج الثمار وتلوينها وزيادة حلاوة سكرياتها ويحافظ على صلابتها فتكون أكثر تحملاً للنقل والتسويق وعلى العكس من ذلك فالري الغزير خلال هذه الفترة يؤدي إلى تأخر نضج الثمار وزيادة رطوبتها وقلة صلابتها مما يؤدي إلى سرعة تلفها.

تنجح زراعة أشجار النخيل في أراضي لا تنجح بها زراعة أنواع أخرى من أشجار الفاكهة ، وتتميز أشجار النخيل بمجموع جذري كبير يمتد لمسافات كبيرة بالتربة مما يمكنها من الحصول على الكميات المناسبة من الماء والعناصر الغذائية .

وقد أكدت معظم الدراسات المائية أنه لعمل برنامج للنخيل يجب دراسة إحتياجات الأشجار تحت ظروف كل منطقة لتقدير الحاجة للري ومعدله وتوقيته مع الأخذ في الاعتبار تفاعل العوامل المختلفة والمؤثرة حتى نستطيع رسم سياسة إرشادية للري في كل منطقة وفيما يلي نعرض برنامج استرشادي لري أشجار النخيل .

## إنشاء مزارع النخيل:

يجب العناية في اختيار التربة الصالحة للزراعة وضرورة التأكد من توفر ماء الري الصالح .

## إعداد الأرض للغرس:

تحرث أرض المزرعة مرتين ثم تزحف حتى تصبح مستوية تماماً وذلك في حالة المزارع التي تروى بالغمر وتقسم الأرض إلى مربعات حسب مساحتها وتحدد مواقع جور الزراعة على الأبعاد المطلوبة والاهتمام بتوسيع الجور بما يتلائم مع

حجم قواعد الفسائل لذا يفضل أن تكون أبعاد الجورة  $1 \times 1 \times 1$  م ويجب تجهيز الجور قبل موعد الزراعة بوقت كافى على أن يستبعد التراب الناتج من الحفر ويؤتى بخلطة مكونة من ١ جزء طمي + ٢ جزء رمل إذا كانت الأرض طينية ، ٢ جزء طمي + ١ جزء رمل إذا كانت الأرض رملية وفي حالة عدم توفر الطمي أو الرمل تستخدم تربة سطحية نظيفة بعد خلطها بما يعادلها من سماد عضوي قديم متحلل ويفضل إضافة من ٢ - ١ كجم سوبر فوسفات و ٢ كجم من الكبريت يخلط جيداً مع مخلوط الزراعة في الجورة .

### **أبعاد الغرس:**

يلجأ كثير من مزارعي النخيل بغرس أكبر عدد من الفسائل في مزارعهم دون مراعاة المسافة اللازمة بين الأشجار مما ينعكس ضرره على الإنتاج وصفات الثمار والخدمة وقد عرف منذ القديم فوائد الزراعة المتباعدة للنخيل وينصح حالياً بزراعة النخيل في الأراضي الجديدة باستخدام النظام المستطيل غالباً على أبعاد  $8 \times 6$  متر أما الأراضي القديمة تكون المسافة  $7 \times 7$  أو  $8 \times 8$  متر في المزارع المنتظمة أو على  $10 \times 10$  متر في حالة التربة الطينية أو على مسافة ٦ متر بين الأشجار حول المزارع أو المشايات العريضة .

## زراعة الفسيلة في الأرض المستديمة:



ويراعى وضع الفسيلة في الجورة ويكتفى بموارة منطقة الجذور في التربة مضافاً إليها ١٠ - ٢٠ سم ، ويجب ألا يتعدى الردم أكبر قطر في قاعدة الفسيلة مع ملاحظة أن يكون القلب بعيداً عن الشمس وقت الظهيرة وبعيداً عن مستوى سطح التربة ، ويردم حول الفسيلة جيداً بكبس التربة حولها ثم يجري الري لتثبيت التربة ويزداد الردم في الجور التي تهبط تربتها بعد الري مع مراعاة تغطية الفسائل بعد الغرس بخيش أو قش أرز أو أكياس لحمايتها من حرارة الصيف أو برودة الشتاء . ويمكن الاستفادة بالمسافة بين النخيل بزراعة الخضروات والمحاصيل الحقلية أو أشجار المؤقتات وبالتالي يستفيد النخيل من سماد المحاصيل الثانوية كما تستفيد هذه المحاصيل من أشجار النخيل في وقايتها من موجات الصقيع شتاءً أو شدة الحرارة صيفاً .

في حالة زراعة الفسائل المفصولة بالمشتل للعناية بها وتركيز خدمتها فإنها تستمر لمدة ٢ - ٣ سنوات تصبح بعدها صالحة للنقل للمكان المستديم وتعرف حينئذ باسم الفسيلة " بنت الجورة " .

**الري:**

يعتبر ماء الري هو أحد العوامل الهامة للتوسع في زراعة أشجار النخيل حيث يتوقف نجاح زراعته إلى حد كبير على توفر إحتياجاته المائية بالرغم من مدى تحمله للعطش والجفاف مقارنة بأشجار الفاكهة الأخرى .

### **نوعية ماء الري للنخيل:**

يتحمل نخيل البلح ارتفاع ملوحة ماء الري إلا أن تركيز الأملاح يقلل من النمو الخضري وبالتالي المحصول ، فوجد أن النخيل ينتج محصول كامل إذا كانت نسبة الأملاح في ماء الري أقل من ١٢٥ جزء في المليون ، وينخفض المحصول بمعدل ٥٠ ٪ إذا وصل التركيز إلى ١٢٥ جزء في المليون ، معنى ذلك أن النخيل يتحمل زيادة الملوحة في ماء الري ولكن ذلك يكون على حساب المحصول وعموماً فإن موضوع ري نخيل البلح بوجه خاص يلزمه دراسات عملية مكثفة في المناطق .

### **تسميد النخيل:**

يحسن عند زراعة الفسائل الحديثة عدم الإسراف في وضع السماد البلدي المتحلل في قاع الحفرة بل يراعى خلطه جيداً بتراب القاع ثم يغطى الخليط بالتراب السطحي للحفرة ثم يتم غرس الفسيلة ويدك حولها التراب جيداً ، كما يفضل في حالة مزارع النخيل الحديثة زراعة الأسمدة الخضراء مثل البرسيم ولوبيا العلف ثم حرثها بالتربة فهذه الأسمدة تحسن من خواص التربة

وتختلف برامج تسميد النخيل اختلافاً كبيراً من مكان إلى مكان تبعاً لاختلاف نوع التربة ومستوى الخصوبة وعمر الأشجار المزروعة ، ومن مميزات إضافة السماد العضوي هو المساعدة في تماسك التربة الرملية والعمل على زيادة احتفاظها بالماء وهو يساعد في تفكك التربة الثقيلة بالإضافة لما تحويه هذه الأسمدة من العناصر الصغرى الهامة في التغذية .

### **في حالة الري بالغمر:**

التسميد العضوي والفوسفوري في حالة الري بالغمر يضاف السماد العضوي في خنادق على شكل نصف دائرة حول جذع النخلة على بعد ٧٠-١٠٠ سم كما يضاف في نصف الدائرة المقابل في العام الذي يليه وهكذا .

ويكون الخندق بعرض وعمق من ٥٠ - ٤٠ سم حيث يوضع السماد العضوي المتحلل بمعدل ١٠٠ كجم (٤ مقاطف) لكل خندق تضاف دفعة واحدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر مع خلطه بالسماد الفوسفوري بمعدل ٠.٥ - ١ كجم سوبر فوسفات الكالسيوم ٤٪ للنخلة الواحدة للمساعدة على تحليل المواد العضوية بالسماد البلدي مع إضافة ١ - ٠.٥ كجم من الكبريت القابل للبلل حيث يفيد في معالجة التربة القلوية أو الجيرية ويخفض من PH التربة ويسهل في عملية الامتصاص ويغطي بطبقة من التراب ، وتختلف الكمية المضافة لكل نخلة حسب عمرها وقوتها ونوع السماد المستخدم وتقل هذه الكمية إلى النصف أو الثلث في حالة سماد الدواجن أو سماد الحمام على الترتيب .

ويلاحظ أهمية إضافة المادة العضوية في الأراضي الرملية حيث تعمل على زيادة حموضة التربة وإذابة العناصر الممسوكة (الغير ذائبة) وتحسين الخواص الفيزيائية للتربة .

يراعى عدم خلط السوبر فوسفات بأي سماد يحتوى على كالسيوم ذائب مثل نترات الجير المصري ٤٪) عبود أو أبوطاكية (أو أي سماد يحتوى على الحديد أو الأمونيوم حتى لا يتحول الفوسفات إلى صورة غير ذائبة فتقل الاستفادة منه) الصورة الثلاثية .

### **التسميد الأزوتي :**

أثبتت الدراسات والبحوث أن إضافة الأسمدة النتروجينية للنخيل المثمر أدت إلى زيادة مؤكدة في المحصول من حيث نمو السعف وزيادة حجم ووزن الثمار وتراوح احتياجات النخلة من الأزوت الكلى ما بين ٨٠٠-١٢٠٠ جم أزوت للنخلة سنوياً تبعاً لمستوى خصوبة التربة وتوزع على ثلاث دفعات متساوية طول موسم النمو ابتداء من شهر مارس (قبل التزهير وعملية التلقيح) ومايو ويوليو ، تزداد إلى ٤ دفعات في الأراضي الرملية والفقيرة ، وفي حالة الأشجار الغير مثمرة يضاف نصف هذه الكمية على دفعات شهرية ابتداء من مارس حتى سبتمبر ، تضاف الأسمدة نثراً حول جذع النخلة وعلى مسافة تتلائم مع مدى انتشار الجذور الحديثة للنخلة ويقلب بالتربة .

ويفضل تحت ظروفنا المحلية إضافة سلفات النشادر ٥.٦٪ حيث أنها تحتاج ريتين بالتربة وذلك بسبب صعوبة غسل النشادر وأهميتها في خفض درجة الحموضة (PH)، بينما الأسمدة النترائية الأخرى سهلة الذوبان والغسيل في التربة فتذوب وتفقد بسرعة .

### **التسميد البوتاسي:**

يعتبر عنصر البوتاسيوم من أهم العناصر تأثيراً في النمو الخضري والثمري ، وترجع أهمية البوتاسيوم في قيامه بدور هام في تصنيع المواد الكربوهيدراتية والعمل على انتقال السكريات والمواد الذائبة ، كما يساعد على عملية امتصاص الجذور للماء والمواد الغذائية الذائبة من التربة كما يعمل على زيادة نشاط التنفس وانقسام الخلايا ويعمل على تحسين لون الثمار وسرعة نضجها ويراعى عدم الإسراف في التسميد البوتاسي حيث أن الإسراف يؤدي إلى نقص امتصاص الكالسيوم والمغنسيوم كما يجب تجنب استخدام كلوريد البوتاسيوم عند وجود نسبة من الكلور في التربة أو ماء الري .

وتضاف سلفات البوتاسيوم بمعدل ٢ - ١.٥ كجم للنخلة سنوياً تبعاً لعمر النخلة وتقسم على ٣ دفعات متساوية خلال شهر مارس ومايو ويوليو أثناء موسم النمو ، وفي حالة الأشجار التي لم تثمر بعد يضاف السماد البوتاسي على دفعات شهرية من مارس حتى سبتمبر نثراً حول جذع النخلة ويقلب بالتربة أو يضاف في الخنادق مع التسميد البلدي شتاءً .

## العناصر الصغرى :

لم تثبت الأبحاث والدراسات مدى إحتياج النخيل لإضافة هذه العناصر وهذا يرجع إلى الكمية الضئيلة التي تتطلبها أشجار النخيل من هذه العناصر النادرة والتي يمكن للمجموع الجذري المتعمق والمتنشر أن يمتصها من أعماق التربة كما أن استخدام الأسمدة العضوية قد يوفر كمية لا بأس بها من هذه العناصر تلبى إحتياجات أشجار النخيل منها ، ولكن في الأراضي الرملية فإن إضافة العناصر الصغرى لمزارع النخيل تحسن كثيراً من نموها وإثمارها وتعتبر عناصر الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والمولبدنم من أهم العناصر الصغرى التي يظهر أعراض نقصها في الأراضي المصرية وتعالج بإضافة أملاح الكبريتات لهذه العناصر للتربة أو رشها على الأوراق كما أن بعض الأصناف أظهرت حساسية كبيرة لعنصر البورون والذي يؤدي نقصه إلى فشل العقد في بعض الأصناف ويعالج بإضافته للتربة قبل التزهير على صورة بوريك آسيد .

## التسميد في مياه الري:

هي من أفضل الطرق لتوزيع الأسمدة على أشجار البستان خاصة في حالة الري بالتنقيط .

ومن أهم مميزات هذه الطريقة:

- الترشيد في استخدام الأسمدة وتوصيلها لمنطقة الجذور وعدم فقد كمية كبيرة منها .

- سهولة توزيع الأسمدة في الوقت المناسب التي تحتاج فيه الأشجار للتسميد وتوزيعها بصورة منتظمة .

وهناك عدة أنواع من أجهزة التسميد تتركب أول شبكة الري ومنها نوعين رئيسيين:

#### ١- السمادات:

وهي تتكون من وعاء له فتحتان يدخل الماء من إحدهما ويمر على السماد الجاف (الموضوع بالوعاء).

بالسرعة التي تسمح بإذابة الجزء المطلوب منه خلال فترة زمنية معينة ويخرج محلول السماد من الفتحة الثانية التي يتحكم فيها بحيث يخلط المحلول مع مياه الري بطريقة معينة لتصل الكمية المطلوبة منه إلى الأشجار في مدة زمنية محددة وقد قل استخدام هذا النوع الآن .

#### ٢- أجهزة الحقن:

يكثر الآن استخدام أجهزة الحقن ، وتركب هذه الأجهزة في أول خط الري بالنسبة لأشجار النخيل البالغة .

في حالة الري بالتنقيط:  
**التسميد العضوي:**

يضاف كما هو في حالة الري بالغمر من حيث المعدل وطريقة الإضافة في الخنادق أسفل حافة المساحة المبثلة بعيداً عن جذع النخلة مع إضافة الكبريت بمعدل ٠.٥ كجم للنخلة .

## التسميد الآزوتي:

يستخدم سماد نترات الأمونيوم ٣٣٪ في نظام الري بالتنقيط ويضاف عن طريق السمادة بمعدل حولي ٨٠٠ جرام آزوت للنخلة المثمرة سنوياً وتقسم على دفعات متساوية أسبوعية إبتداء من شهر مارس وحتى شهر أغسطس ويضاف نصف هذه الكمية للنخيل الصغير أقل من ٥ سنوات من شهر مارس حتى شهر أكتوبر مع مراعاة ألا يزيد تركيز الأملاح السمادية بالمحلول سمادي عن ٠.٥ جم في اللتر .

## التسميد البوتاسي :

تضاف دفعات السماد البوتاسي في السمادة بمعدل ١.٥ - ١ كجم سلفات بوتاسيوم للنخلة سنوياً مع السماد الآزوتي مع مراعاة إذابة سلفات البوتاسيوم منفردة عن السماد الآزوتي ويترك لمدة ٢٤ ساعة ثم يؤخذ المحلول الرائق ويضاف للسمادة ، ويمكن أن يضاف دفعات السماد البوتاسي مع الماغنسيوم إما في السمادة معاً بالتبادل مع السماد الآزوتي وذلك بمعدل ١.٥ - ١ كجم سلفات بوتاسيوم ومن ١ - ٠.٥ كجم سلفات الماغنسيوم للنخلة الواحدة سنوياً تبعاً لعمر وحالة الأشجار حيث تذاب معاً ، وقد يضاف السماد البوتاسي والماغنسيوم تكميلاً أسفل النقاطات ، وفي هذه الحالة تضاف على دفعتين للنخيل المثمر في شهر مارس ومايو وعلى ٣-٤ دفعات متساوية للنخيل الذي لم يصل لمرحلة الإثمار بعد .

## التسميد الفوسفوري:

وفي حالة استخدام حمض الفوسفوريك لغسيل الشبكة وكمصدر للفوسفور يضاف مقننه السنوي وهو ١٥٠ جم فوسفور للنخلة الواحدة على دفعات أسبوعية في السمادة منفرداً أو مذاب مع السماد الآزوتي مع مراعاة ألا يزيد تركيز الحامض عن ٠.٢ جم لكل لتر من ماء الري وألا يزيد تركيز الأملاح السمادية بالمحلول عن ٠.٥ جم في اللتر .

أهم العوامل التي تحجب أثر التسميد:

- ارتفاع مستوى الماء الأرضي وسوء نظام الصرف يؤثر على امتصاص العناصر ، إذاً لابد من توفر نظام صرف جيد .
- يجب الري عقب التسميد السطحي مباشرة حيث أن الماء يذيب العناصر الغذائية فيسهل الاستفادة منها .
- إضافة السماد بعيداً عن منطقة الجذور لا تستفيد منه الأشجار .
- نقص أو زيادة رطوبة التربة إلى درجة الجفاف أو الغرق يعيق الجذور في تأدية وظيفة الامتصاص .
- وجود أملاح كربونات الصوديوم بالتربة تؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية المضافة وعلاجها بإضافة الجبس الزراعي والمادة العضوية
- يراعى ألا يزيد تركيز الأملاح في ماء الري عن ٠.٥ جم في اللتر عند إضافته بنظام الري بالتنقيط .

- يراعى ألا يزيد ما يعطى للنخلة الواحدة المثمرة عن ٤٠ جم من المصادر السماوية في اليوم الواحد وألا يزيد عن ٥ جم للنخيل الأقل عمراً في حالة الري بالتنقيط .

- إصابة الأشجار بالآفات الحشرية والمرضية تحجب أثر التسميد فيجب الاهتمام ببرنامج مكافحة هذه الآفات ، انياً عمليات الخدمة الفنية التي تجري على النخلة .

### **التقليم :**

تعتبر عملية التقليم في النخيل من عمليات الخدمة الهامة ويقصد بها قطع السعف الأصفر والجاف والمصاب والسعف الزائد عن حاجة النخلة وإزالة الأشواك والرواكب والليف ، ويجب أن يقتصر التقليم في السنوات الأولى من عمر النخلة على إزالة السعف الجاف فقط والذي توقف عن أداء وظيفته ، فإذا بدأت النخلة في الإثمار اتبع نظام معين في التقليم لكل نخلة حسب صنفها وقوة نموها .

### **فوائد التقليم:**

- التخلص من السعف الجاف والأصفر وخاصةً إذا كان مصاباً بالحشرات الحشرية يتم جمعه وحرقه .

- إنتراع الأشواك من السعف يسهل على النخال الوصول لإغريض النخلة أثناء التلقيح أو جمع الثمار ، كما يمنع تجريح الثمار عند احتكاكها بالأشواك

- السماح لأشعة الشمس أن تصل إلى العذوق مما يساعد في تحسين نوعية الثمار والإسراع في نضجها ، كذلك المساعدة في تقليل الإصابة بالأمراض

- الإستفادة من مخلفات التقليم من سعف وليف في بعض الصناعات الريفية

### **ميعاد التقليم:**

يختلف موعد التقليم من منطقة إلى أخرى وهو لا يتعدى ثلاثة مواعيد هي :

في الخريف بعد جمع الثمار مباشرة .

في أوائل الربيع وقت التلقيح .

أثناء إجراء عملية التقويس في الصيف .


ولكن أفضل موعد هو موعد تمام خروج الأغاريض المؤنثة الجديدة حيث تكون النخلة قد امتصت كل ما بالجريد من غذاء أثناء تكوين وخروج الأغاريض (العذوق) ، وفي بعض المناطق المنتشر بها سوسة النخيل الحمراء ينصح بإجراء التقليم خلال شهر يناير حيث يكون نشاط الحشرة ضعيفاً أثناء فترة الشتاء .

### **إجراء عملية التقليم :**

يقوم بعملية التقليم عمال مدربون ويتم ذلك بإزالة السعف الجاف بإستخدام آلة حادة (بلطة أو سيف) على أن يكون القطع على ارتفاع ١٢ - ١٠ سم من قاعدة الكرنافه وأن يكون القطع من أسفل إلى أعلى بحيث يكون سطح القطع منحدرًا إلى

الخارج حتى لا تتجمع مياه الأمطار بين الكرنافة وجذع النخلة ، وعادة ما يزال السعف الجاف وبعض الأوراق الخضراء الذي يبلغ عمرها ثلاث سنوات فأكثر على أن يترك حلقين من السعف على الأقل أسفل العراجين المتكونة في السنة السابقة ، ويجب الحذر من إزالة السعف بطريقة جائرة تؤثر على أنشطة نمو الإزهار والإثمار ، وقد أثبتت الدراسات التي تمت في هذا المجال في حالة تقليم السعف الأخضر بدرجة كبيرة ينعكس أثره على نقص الإنتاج وقلة كمية الإزهار والعراجين التي تظهر في الموسم التالي ، وقد وجد أن ترك عدد ٩ - ٨ أوراق خضراء لكل عذق على النخلة تؤدي إلى زيادة في حجم الثمار وتحسين نوعيتها ويرجع السبب في ذلك إلى أن السعف الأخضر يصنع غذاء النبات ويمد الثمار بما تتطلبه من مواد غذائية ومواد سكرية أخرى .

يجب عقب الانتهاء من عملية التقليم رش الأشجار بأي مطهر فطري مثل أوكسي كلورور النحاس بمعدل ٥ في الألف بالإضافة للرش بأي مبيد حشري بمعدل ٣ في الألف أو التعفير ببودرة السيفين مع الكبريت بنسبة ٨ - ٢ على الرواكب والليف للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء .



عملية التقليم وتهذيب جذع النخلة

### التلقيح:

تعتبر نخلة التمر أحادية الجنس ثنائية المسكن نظراً لتمييز أشجارها إلى ذكور تعطي نورات مذكرة وإناث تحمل نورات مؤنثة .

ويتوقف النجاح في إنتاج المحصول الاقتصادي على نجاح إجراء عملية التلقيح وإتمام الإخصاب ومن الممكن أن تتم عملية التلقيح طبيعياً بواسطة الرياح التي تحمل حبوب اللقاح إلى الإناث القريبة منها إلا أنها غير اقتصادية ، لأنه لا بد من توفر أعداد متساوية من النخيل المذكر والمؤنث بالمرزعة لكي يتحقق الاستغلال الاقتصادي لعناصر الإنتاج ، ولهذا يلجأ إلى تقليل عدد الذكور إلى أقل عدد ممكن على أن يجري التلقيح يدوياً أو ميكانيكياً وفي هذه الحالة يكفي حبوب اللقاح التي تنتجها أزهار نخلة مذكرة لتلقيح ما بين ٦ - ٥ نخلة مؤنثة تبعاً لاختلاف الطريقة المتبعة في التلقيح من صنف إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ، بالإضافة إلى ذلك

يختلف العدد تبعاً لعدد النورات التي يعطيها الذكر (٥ - ١٠ إغريض) ومدى حيوية وكفاءة حبوب اللقاح وكذلك تباين الأشجار المؤنثة للأصناف المختلفة في عدد ما تحمله من نورات مؤنثة (١٢ - ٨ إغريض) وتخرج الأغريض المذكرة مبكرة (تبدأ من فبراير) عن المؤنثة وعند تمام نموه ونضجه ينشق طولياً وتبرز الشماريخ الحاملة للأزهار المذكرة ، أم الإناث فإنها تخرج من أوائل مارس حتى أوائل مايو تقريباً .

ويختلف عدد الأغريض التي تحملها الأشجار تبعاً لعوامل كثيرة منها المستوى الغذائي للنخلة ، وفي جميع الحالات لا تخرج النورات دفعة واحدة بل يتتابع خروجها على النخلة فترة تصل إلى ٢٠ - ٣٠ يوم ، وعندما تفقد الأغريض نسبة من رطوبتها ينشق الغلاف وهذا دليلاً على تمام تكوين ونضج أزهاره سواء المذكرة منها أو المؤنثة ويجب أن ينتخب اللقاح من ذكور قوية ومعروفة بارتفاع حيوية حبوب اللقاح وكفاءتها في الإخصاب والعقد ومن حيث تأثيرها على خصائص الثمار الناتجة فقد وجد أن لقاح فحول معينة تؤثر على حجم ولون الثمار وكذلك نسبة السكر بها بالإضافة إلى موعد نضجها ، ويفضل أن تكون من لقاح نفس السنة مع مراعاة بعد انشقاق الإغريض المذكر فيجب قطعه من النخلة ثم يشق طولياً وتستخرج الشماريخ مباشرة وتفرّد إلى مجاميع أو حزم من ٤ - ٣ شماريخ وتنشر فرادى دون تكدس في مكان ظليل بعيداً عن تيارات الهواء مع تقليبها لمدة ٢ - ٣ أيام حتى لا تتعرض للتلف نتيجة الرطوبة ، بعد جفاف

الشماريخ توضع في صندوق أو سلة بعيداً عن الرطوبة أو الحشرات أو التعرض للحرارة الشديدة وتحفظ لحين تفتح الأغاريض المؤنثة .

وتكون معظم الأزهار المؤنثة قابلة للتلقيح عقب انشقاق الإغريض مباشرة ، عندئذ ينزع الغلاف الخارجى كلياً ثم يؤتى بحزمة أو مجموعة من الشماريخ المذكورة من ١٠ - ٧ شماريخ والتي سبق تجفيفها وتنفض بإصبع السبابة بشدة على الأزهار المؤنثة مع تحريك اليد من قاعدة العرجون المؤنث إلى طرفه وفي مختلف الاتجاهات لضمان توزيع اللقاح على جميع أزهاره مع وضع مجموعة الشماريخ مقلوبة وسط شماريخ الإغريض المؤنث ويربط ربطاً خفيفاً بخصوص من السعف لتبقى الشماريخ المذكورة ليتنثر منها اللقاح مع اهتزاز العرجون بفعل الهواء لتلقيح الأزهار التي تأخر نضجها عن وقت إجراء التلقيح ، وقد يوضع قليل من مسحوق حبوب اللقاح على قطعة من القطن وتهز على الأزهار المؤنثة ثم توضع بداخل الإغريض كما في الطريقة السابقة ، ويراعى إعادة عملية التلقيح في حالة هبوب الرياح أو سقوط الأمطار بعد عملية التلقيح ، كما أنه لا يجب التأخير عن إتمام عملية التلقيح لأكثر من ٥ أيام من وقت تفتح غلاف النورة المؤنثة وهي الحالة السائدة في معظم الأصناف وتتوقف الفترة التي تظل فيها المياسم قابلة لاستقبال ونمو حبوب اللقاح تبعاً للصف والظروف الجوية السائدة .

## التلقيح المركزي :

تستخدم طريقة التلقيح المركزي بدلاً من الطريقة العادية التي تتطلب ضرورة صعود العامل لقمة النخلة عدة مرات وما تتطلبه من وقت وجهد وارتفاع أجور العمالة كما أن النورات الزهرية لا تخرج دفعة واحدة بل يتتابع خروجها على النخلة خلال ٣ أسابيع مما يتطلب ارتفاع النخلة عدة مرات لإجراء عملية التلقيح ، فقد توصل المشتغلين في مجال النخيل إلى طريقة التلقيح بالحزمة المركزية التي يمكن عن طريقها توصيل حبوب اللقاح إلى الأغاريض المؤنثة مرة واحدة دون اللجوء لصعود النخلة عدة مرات ، فعند انشقاق ٤ - ٣ أغاريض يصعد العامل لقمة النخلة ومعه حزمة من الشماريخ المذكورة (حوالي ٥٠ شمراخ) ، يقوم بتنفيذ حبوب اللقاح باليد على أزهار الأغاريض المنشقة لضمان توزيع اللقاح على جميع الأزهار مع وضع حزمة اللقاح في قلب النخلة من الجهة البحرية في وضع أفقي لضمان انتشار حبوب اللقاح مع اهتزاز رأس النخلة بفعل اهواء لتلقيح الأغاريض التي تخرج وتنشق أغلفتها فيحدث التلقيح للأزهار ويتم الإخصاب وتكون الثمار العاقدة .

## التقويس (التدليل):

يقصد بعملية التقويس سحب العراجين من وضعها بين السعف وتدليتها مع توزيعها بانتظام حول النخلة على أن يتم ذلك قبل أن تتخشب سيقان العذوق (العراجين) حتى لا تنكسر عند ثنيها ، وهي تجري في شهر يونيو للأصناف المبكرة وفي يوليو للأصناف المتأخرة أي بعد العقد بحوالي ٨ - ٦ أسابيع ، أي قبل ازدياد

وزن وكبر الثمار ويمكن إجراؤها أثناء عملية الخف اقتصاداً للوقت والمصاريف وتتم بثني ساق العراجين وربطها على الجريد مما يؤدي لتعريض الثمار للشمس وتهويتها وعدم خدشها بالشوك وتسهيل جمعها عند النضج ، وهي تجري غالباً للأصناف ذات العراجين الطويلة الساق كما في الأصناف الزغلول والسمانى والسيوى والحيانى والأمهات أما الأصناف ذات العراجين القصيرة فلا يجري تقويسها بالطريقة السابقة لقصر ساقها لذلك تسند إلى غصن ذو شعبتين تركز على جذع النخلة لتفادى انكسار العرجون عندما يكون حملها (محصولها) ثقیل .

#### **الخف:**

تجري عملية الخف لتساعد على زيادة وزن وحجم الثمار وتحسين خواصها والتبكير في النضج ولعلاج ظاهرة تبادل الحمل وتجري عملية الخف إما بإزالة بعض السوبات الكاملة حتى يكون هناك التناسب بين عدد الأوراق وعدد السوبات وفي هذه الحالة تزال السوبات الصغيرة الحجم والقريبة من قلب النخلة ، أما في حالة الأصناف ذات الشماريخ الثمرية الطويلة مثل الزغلول والسمانى والأمهات والسيوى والحيانى يكون أساس الخف فيها من ( ٥ - ٦ ٪ ) من طول الشماريخ على السوباطة ، بينما في الأصناف ذات السوبات القصيرة المنضغطة مثل العمري وبنت عيشة يكون أساس الخف فيها إزالة عدد من الشماريخ من وسط السوباطة ٦ - ٥ ٪ وهذا يساعد على تحسين التهوية داخل السوباطة ويمنع تراكم الرطوبة داخلها خاصة في المناطق المرتفعة الرطوبة ، بينما المناطق الجافة الشديدة الحرارة يناسبها تقصير الشماريخ ، وقد تستخدم بعض منظمات النمو في

الخف ويتم برش بعض المواد الكيماوية مثل 2.4 - 5 TNAA وهذه المواد سببت خفاً مناسباً عندما استخدمت بتركيزات من ٦ - ١٠ جزء في المليون بعد التلقيح بأسبوعين ، ونتج عنها ثمار جيدة وتبكير في النضج هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأثيفون بتركيز من ٢٠٠ - ٤٠٠ جزء في المليون رشاً على الأشجار كان فعالاً في خف ثمار البلح وكان الخف أكثر شدة مع التركيزات العالية وعندما يتم مبكراً بعد العقد ، وعموماً فإن طريقة الخف تتوقف على الظروف الجوية وطبيعة الإغريض ويمكن الجمع بين أكثر من طريقة للخف على النخلة الواحدة .



خف تقصير طول الشماريخ

خف إزالة الشماريخ من وسط السوباطة.

## **التكميم (تغطية العذوق):**

أحياناً يجري تغطية العذوق بأغطية تحميها من الأحوال الجوية والآفات ، وهي عبارة عن اسطوانات ورقية كبيرة يتم إدخال العذق فيها وتربط نهايتها العليا حول العرجون وفوق نقطة خروج الشماريخ وتترك نهايتها السفلى مفتوحة ، وتستخدم في بعض مناطق النخيل لحفظ الثمر من الأمطار كما تستخدم في بعض المناطق الجافة الحارة كما في تونس حيث تسبب جفاف الثمار الزائد في صنف " دجلة نور " لذا فقد أمكن تحسين نوعية الثمر بتغليفها بأكياس بلاستيكية قبل الإرباط ، وتتم عملية التكتيم في خلال فترة الخلال (البسر وقبل مرحلة الرطب فإذا حدث وكممت قبل تلك الفترة فإنها تسبب زيادة قابلية الإصابة بالأمراض الفطرية وذلك لزيادة الرطوبة حول الثمار

أيضاً التكتيم الذي يجري على العذوق بتغليفها بشباك بلاستيكية وهي تتم في خلال فترة الخلال (البسر وقبل مرحلة الرطب وذلك لمنع سقوط الثمار الناضجة على الأرض ولمنع دخول فراشات الحشرات إلى الثمار كما تسهل من جمع العذوق .

## **جنى وقطف الثمار:**

تعتبر عملية جنى وقطف الثمار هي المحصلة النهائية للعديد من العمليات الزراعية التي أجريت على الأشجار والتي لها علاقة مباشرة بالمحصول وصفات الجودة للثمار ، لذا يجب الاهتمام بهذه الثمار أثناء المراحل المختلفة بداية من تحديد الدرجة المناسبة لقطف الثمار وحتى وصول الثمار للمستهلك والتي تحتاج إلى

استخدام أفضل الطرق الفنية للحصول على ثمار عالية الجودة سواء للمستهلك المحلي أو التصدير .

### تحديد درجة القطف المناسبة :

تعتبر ثمرة البلح مكتملة النمو عند بلوغها مرحلة البسر (أي مرحلة التلوين) وتختلف الدرجة المناسبة للقطف باختلاف الصنف حيث تقطف ثمار بعض الأصناف في مرحلة البسر ، خاصة تلك الأصناف التي تتميز بخلوها أو احتوائها على كميات قليلة من المواد التانينية القابضة مثل أصناف الزغلول والسمانى بينما توجد أصناف أخرى تصبح صالحة للاستهلاك عند وصولها مرحلة الرطب حيث تخلو معظم أصناف البلح من الطعم القابض في هذه المرحلة من مراحل نمو الثمار مثل الأمهات والحيانى والسيوى وغيرها ، وعموماً تتميز الثمار التي تستهلك في مرحلة البسر أو الرطب بزيادة نسبة الرطوبة بها مما يعرضها لسرعة التلف ، لذلك يجب العناية بتحديد مواعيد القطف مع سرعة تسويق أو تخزين الثمار وقد يستمر قطف الثمار في الصنف الواحد من ٤ - ٣ أسابيع ، كما أن هناك العديد من أصناف البلح التي تستهلك ثمارها وهي جافة أو نصف جافة حيث تقل نسبة الرطوبة بها عن ٦٪ وهي تتحمل التخزين لفترات طويلة ، ومثال ذلك الأصناف النصف جافة مثل السيوى والعمرى والعجلانى ، والأصناف الجافة مثل الملكابى والبرتمودة والسكوتى والشامية . . . إلخ ويجدر الإشارة إلى أن ثمار الأصناف الرطبة يمكن قطفها في مرحلة البسر (اكتمال النمو) وترطيبها صناعياً ، كذلك فإن

الأصناف الجافة والنصف جافة يمكن قطفها قبل بلوغها مراحل نضجها النهائية ومعاملتها صناعياً وذلك عند الرغبة في تجنب ظروف غير ملائمة كسقوط الأمطار أو تقليل نفقات الجمع بتقليل عدد مرات القطف .

### **طريقة قطف الثمار :**

تختلف طرق القطف باختلاف المرحلة التي ستقطف فيها حيث أنه بالنسبة للثمار التي تستهلك في مرحلة البسر (الملونة) تقطف الثمار بقطع السوبات دفعات واحدة دون انتظار مرحلة الترطيب وبعد أن يتم وصول نسبة مناسبة من الثمار إلى مرحلة النضج المناسبة ، بينما تقطف الثمار التي تستهلك في الطور الرطب قبل أن تتحول أنسجتها إلى اللون حتى تتحمل عملية التداول والتسويق ، حيث يتم لقط الثمار الرطبة من السوبات مثل صنف الأمهات والحياني وبنيت عيشة وغيرها ، بينما تقطف الثمار نصف الجافة عندما تلين أنسجتها وتقطف ثمار الأصناف الجافة عند جفاف أنسجتها حيث تهز العذوق لتفصل الثمار الناضجة ويبقى البسر ملتصقاً بالثمار ، ويؤدي تساقط الثمار على الأرض نتيجة هز السوبات إذا لم يغطى سطح التربة بأغطية من الحصر أو القماش السميك إلى التصاق الأتربة والرمال بالثمار مما يقلل من صلاحيتها إضافة إلى تلوثها بالكائنات الحية الدقيقة مما يساعد على تعرض الثمار للتعفن والتخمر ، كما أن تساقط الثمار اللينة أو الرطبة يؤدي إلى تعرضها للتهشم والتعجن مما يفقدها شكلها المميز (مظهرها) والإقلال من جودتها الاستهلاكية .

## إعداد وتعبئة الثمار:

وهي تعتبر الخطوة التالية لعملية القطف حيث يجب تجميع الثمار بعد قطفها في مكان مخصص بالمرزعة ، حيث يقوم العمال بإجراء عملية فرز مبدئي للثمار قبل تعبئتها في عبوات الحقل حيث وجود أي ثمار معطوبة أو مهشمة أو ملوثة بالأتربة والرمال أو مصابة بأي أضرار تؤثر على بقية ثمار العبوة بالكامل ، ومن العمليات الهامة التي يقوم بها المزارعين خاصة بالنسبة للثمار الجافة والنصف جافة هو إجراء عملية التبخير أو التشجيع حديثاً للثمار مبكراً وذلك لتقليل نسبة إصابة الثمار بالحشرات ، وأفضل العبوات التي تستخدم في القطف ما كان مصنوعاً من الخشب أو البلاستيك وبدون غطاء مع الاهتمام بتنظيفها وتطهيرها بشكل منتظم ، وفيما يلي شرح مختصر للعمليات التي تجري على الثمار بوجه عام لإعدادها لكي تكون صالحة للتعبئة والتداول .

## إنضاج ثمار البلح:

### H- إنضاج البسر (أو ترطيبه):

قد لا يساعد مناخ بعض المناطق على إنضاج ثمار البسر على الأشجار فيتم قطع السباطات وهي مازالت في دور البسر حيث يحتوى على نسبة مرتفعة من الماء ومن السهل تحويل الثمار التي في نهاية طور البسر أو بداية طور الرطب إلى رطب بعدة طرق صناعياً نوضحها في الآتي :

## ١- تعريض الثمار لحرارة الشمس :

ويتم تعليق السوباتات في أماكن خاصة ويتم تلقيط الثمار التي تصل لمرحلة الرطب أولاً بأول أو هز السوباتات مع وضع أغطية من الحصى أو القماش أسفل السوباتات أو يتم نشر ثمار البسر بسلك طبقة واحدة على حصير سميك ويعاب على هذه الطريقة إحتياجها لفترة طويلة أو حدوث كرمشة للثمار نتيجة فقد الرطوبة لطول فترة الإنضاج .

## ٢- إستخدام الخل:

حيث يتم معاملة ثمار البسر بالخل بتركيز ٦٪ مع وضعها في غرفة محكمة لمدة ٢ - ١ يوم فتبدأ في الترطيب ويعاب عليها بأن صفات الثمار لا تكون بالجودة المطلوبة وسرعة تعرضها للإصابة بالعفن والتخمر بسبب الخل وزيادة نسبة رطوبة الثمار .

## ٣- الإنضاج بالأيثفون:

أجريت بعض التجارب على إنضاج ثمار البلح باستخدام الأيثفون (الإيثريل) وقد أعطت نتائج جيدة في سرعة نضج الثمار وتجانس النضج في الثمرة فضلاً عن جودة الثمار إلا أن الثمار كانت سريعة التلف . وبوجه عام فإن مجال إنضاج ثمار البلح البسر باستخدام منظمات النمو لها الأفضلية عن الطرق السابقة وذلك للحصول على ثمار ذات ترطيب جيد ومواصفات استهلاكية جيدة وفترة تسويق متوسطة .

### بد تمييز الرطب:

يقصد بها تجفيف ثمار الأصناف الجافة وهي في مرحلة الرطب تتميز بارتفاع نسبة الرطوبة وبالتالي فهي سريعة التلف ، بينما ثمار التمر تتميز بقابليتها للتخزين ويتم ذلك عن طريق التجفيف أو إزالة الرطوبة ويتم بوضع ثمار الرطب على صواني في طبقات خفيفة ثم يوجه عليها تيار هواء متجدد على درجة حرارة (٤٥ - 32° م) ورطوبة نسبية وتستمر العملية حتى تصل نسبة الرطوبة في الثمار إلى حوالي ٦٪ .

### تخزين ثمار البلح :

تعتبر عملية تخزين ثمار البلح ضرورية حيث يمكن من خلالها تسويق الثمار حسب متطلبات الأسواق كما أن عملية التخزين تفيد في توفير ثمار البلح على فترة أطول من موسمها الطبيعي وهذا يحقق عائداً مجزياً .

إن استخدام طريقة التخزين المثلّي تحفظ للثمار خواصها الطبيعية (حيث يقل فقد الرطوبة والتغير في اللون) وخواصها الكيماوية (مثل زيادة نسبة السكر وقلّة الحموضة والمادة القابضة) بالإضافة إلى احتفاظ الثمرة بالقيمة الغذائية إلى أكبر قدر ممكن .

## زراعة الكمثري الإحتياجات المناخية :

تعتبر الظروف المناخية من أهم العوامل المؤثرة والمحددة لنجاح زراعة الكمثري فنجد أن قلة البرودة شتاء .

كما أن الأشجار أثناء فترة التزهير والعقد تتأثر بدرجة كبيرة بالظروف المناخية حيث ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح المحملة بالأتربة أو سقوط الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة تؤدي إلى انتشار الأمراض التي أهمها لفحة الأزهار واللفحة النارية مما يؤثر على نسبة العقد والمحصول .

### التربة المناسبة

أفضل الأراضي لزراعة الكمثري هي الأراضي الطينية إلى الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية والجيدة الصرف وتوجد أشجار الكمثري أيضا في الأراضي الطينية الثقيلة الجيدة الصرف ، ومع أن أشجار الكمثري يمكن زراعتها في أنواع عديدة من الأراضي إلا أنه يجب عدم زراعتها في الأراضي الرديئة الصرف والكمثري من أشجار الفاكهة التي توافق أشجارها التربة ذات التأثير الحمضي عن التربة ذات التأثير القلوي حيث تؤثر الأخيرة تأثيرا سيئا على نمو الأشجار وأنها تعوق امتصاص الكثير من العناصر الغذائية والتي أهمها الحديد والفوسفور .

كما تنجح زراعة الكمثري في الأراضي الصفراء والرملية الغير ملحية والتي لا تحتوي على نسبة عالية من الطفلة أو كربونات الكالسيوم أو الأراضي شديدة التماسك التي تحتوي على نسبة عالية من التربة الزلطية التي تكون طبقات صماء

أسفل أو في منطقة انتشار الجذور التي تمنع نفاذ الماء وتؤدي إلى ارتفاع مستوى الماء الأرضي في منطقة انتشار الجذور مما يسبب أضرار كبيرة للأشجار .

ويفضل ألا تزيد ملوحة التربة عن ١.٦ ملليموزأي في حدود ١٥ جزء في المليون حيث كلما زادت نسبة الملوحة يقل المحصول .

### **زراعة الأشجار في الأراضي المستديمة:** **أ- ميعاد الزراعة:**

تزرع الكمثري في الأراضي المستديمة في الشتاء خلال الفترة من يناير حتى منتصف شهر مارس وعندما تكون الشتلات في وقت السكون وتكون قد تساقطت أوراقها تماما .

وتنقل الشتلات عارية الجذور (ملشا) من المشتل، ويجب المحافظة على حيوية الشتلات وعدم جفافها في الفترة من وقت تقليعها من المشتل حتى زراعتها في الأرض المستديمة .

### **ب- مسافات الزراعة:**

تختلف مسافات الزراعة حسب نوع التربة والأصول المطعوم عليها وطرق الخدمة بالمزرعة، وتزرع أشجار الكمثري عادة على مسافة ٥×٥ متر أو ٤×٦ وذلك لتسهيل عمليات الخدمة ومقاومة الآفات ويحتاج الدنم إلى حوالي ٤٨- ١١٨ شتلة .

### **ج- إعداد الأرض للزراعة:**

يفضل زراعة مصدات الرياح في المناطق المكشوفة قبل زراعة البستان بوقت كاف .

يتم تخطيط الأرض على مسافات الزراعة المناسبة وتحديد أماكن الجور وعمل شبكة الري ويفضل في حالة الري بالتنقيط أن يتم تركيب ٢ خرطوم على جانبي الأشجار منذ بداية الزراعة ويركب عدد ٢ نقاط على كل جانب يتصرف ٤ لتر/ ساعة على مسافة ٥٠ سم بين النقاط والآخر وتزداد بالتدريج بعد ذلك حسب حالة وعمر الأشجار حتى تكون على امتداد طول الخط كله .

يفضل تشغيل الري قبل حفر الجور بحوالي ٢-٣ أيام ولمدة ٥-٨ ساعات يوميا لغسيل الأملاح التي يمكن أن توجد بالأرض ولتسهيل عملية الحفر .  
يتم حفر الجور بمقاسات ٥٠×٥٠×٥٠ سم على الأقل وفي الزراعة التي على مسافات ضيقة ٤ متر بين الشتلة والأخرى ويفضل عمل خنادق على طول خط الزراعة .

يتم إضافة ٢-٤ مقاطف سماد عضوي قديم متحلل أو كمبوست من المخلفات النباتية لضمان خلوه من بذور الحشائش أو المسببات المرضية .  
يضاف لكل جورة من ١-١.٥ كجم من مخلوط السوبر فوسفات وسلفات النشادر وسلفات البوتاسيوم والكبريت الزراعي بنسبة ٥:١:١:٢ .  
يقلب جيدا السماد العضوي مع الكيماوي مع ناتج حفر الجور خارج الجورة ثم يضاف إلى الجورة مع ترك الجزء العلوي من الجورة رمل ناتج الحفر ليتم زراعة الشتلة به .

يتم تشغيل مياه الري لمدة حوالي ١٠ ساعات قبل الزراعة وبذلك تكون الجور جاهزة للزراعة .

## الزراعة:

### ١- تجهيز الشتلة للزراعة:

أ- تقليم جذور الشتلات المكسورة أو الطويلة بواسطة مقص التقليم وذلك بإزالة الجزء الأخير من الجذور .

ب- يظهر المجموع الجذري بعد تقليمه بغمسه في محلول مطهر فطري مثل البنليت أو الريزولكس أو الفيتافاكس بمعدل ٣ جم/ لتر قبل الزراعة .

## الزراعة :

أ- تزرع الشتلات في الجور المعدة لذلك مع مراعاة الآتي :

أن تكون منطقة التطعيم في إتجاه معاكس للرياح حتى لا ينفصل الطعم عن الأصل بفعل الرياح .

ألا يتم دفن منطقة التطعيم وتكون على ارتفاع ١٠-٤ سم على الأقل من سطح الأرض أو نفس الارتفاع التي كانت عليه بالمشتل .

كبس التربة جيدا حول المجموع الجذري حتى لا يتم تهويته ويؤدي إلى جفاف الشتلة .

يتم قرط الشتلة على ارتفاع ٦٠-٧٠ سم من سطح التربة مع دهان مكان القص بعجينة بوردو أو الرش بأكسي كلور النحاس .

دهان جذع الشتلة أسفل منطقة التطعيم بعجينة بوردو .

ب- تروى الشتلات بعد الزراعة مباشرة لتوفير الرطوبة حول المجموع الجذري وملأ الفراغات الموجودة حتى لا تتعرض الشتلات للجفاف .

### **خدمة مزارع الكمثري**

**الري:**

يعتبر الري من أهم العمليات المؤثرة على إنتاج أشجار الكمثري .  
وتختلف الإحتياجات المائية للأشجار تبعاً لعمرها وموسم النمو ونوع التربة والظروف الجوية والمنطقة المنزرعة بها ونظام الري .

ففي نظام الري بالغمر بالمزارع المثمرة يراعى الآتي :  
تروى الأرض في بداية الموسم في خلال أواخر فبراير وأوائل مارس رية غزيرة لدفع البراعم الزهرية للتفتح .  
ترك الأرض بعد ذلك بدون ري حتى تمام العقد ولا يفضل الري أثناء فترة التزهير .

تروى الأرض بعد تمام العقد وطول فترة نمو الأشجار والثمار تبعاً لإحتياجاتها وحسب درجة الرطوبة بالتربة مع مراعاة عدم تعطيش الأشجار أثناء فترة نمو الثمار، وتحدد فترات الري حسب ظروف التربة والجو بكل مزرعة .

الاستمرار في الري بعد جمع المحصول مع زيادة فترات الري في خلال فصل الخريف وإيقاف الري في الشتاء لمساعدة الأشجار على الدخول في السكون حسب ظروف كل مزرعة .

أما في الأراضي الجديدة التي تروى بنظام الري بالتنقيط يراعى الآتي:  
يفضل ألا تزيد نسبة الملوحة عن ٦٠٠-٧٠٠ جزء في المليون حيث يقل  
المحصول بزيادة نسبة الملوحة .

عدم الإسراف في الري أو التعطيش أثناء فترة التزهير والعقد الحديث .  
توفير الإحتياجات المائية المناسبة أثناء مراحل نمو الشار .  
عدم إيقاف الري بعد جمع المحصول أو تقليل معدلات الري عن الحد اللازم  
للأشجار .

عدم إيقاف الري خلال أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير ولكن تعطى ريات  
صغيرة على فترات متباعدة للمحافظة على الجذور السطحية من الجفاف .  
إعطاء دفعة غزيرة من الري عند بداية الموسم في أواخر شهر فبراير حتى  
يكون الري أثناء فترة التزهير في حدود إحتياجات الأشجار .

دفع الجذور للعمق المناسب للتثبيت الجيد للأشجار بالتربة .  
تثبيت الخراطيم على البعد المناسب من جذع الأشجار وعدم تحريكها للداخل  
والخارج حتى لا يؤدي تحريكها إلى طرد الأملاح من الخارج إلى الداخل .  
في حالة زيادة ملوحة مياه الري تزداد معدلات الري بمعدل ٦٪ زيادة عن  
المعدلات العادية .

وفيا يلي معدلات استرشادية لإحتياجات أشجار الكمثري للإستدلال بها  
لوضع برنامج الري مع مراعاة عمر الأشجار وظروف كل مزرعة ونوع التربة ومياه  
الري بالتر للشجرة في اليوم .

### معدلات استرشادية لإحتياجات أشجار الكمثري

ب- التسميد:

يعتبر التسميد من أهم العوامل المؤثرة على حالة ومعدل نمو الأشجار  
وحالتها الصحية وكمية الحصول .وتحدد كفاءة الأشجار وطاقتها الإنتاجية على  
اختيار برنامج التسميد المناسب ومدى ملائمته للإحتياجات الفعلية للأشجار حيث  
أن التطرف في إضافة بعض العناصر السمادية يؤثر على امتصاص العناصر الأخرى  
بالإضافة إلى الفقد الكبير من الأسمدة المضافة في الأراضي الخفيفة ،ويلاحظ أن  
المبالغة في الأسمدة الآزوتية يؤدي إلى زيادة النمو الخضري مما يعرض الأشجار إلى  
احتمال شدة الإصابة بالأمراض البكتيرية مثل اللفحة النارية لضعف مقاومتها  
بسبب ظاهرة مائية الأنسجة التي تصاحب استمرار النمو الغزير، كما أن زيادة  
عنصر الآزوت عن حد الكفاية للأشجار يؤدي إلى تناقص معدل امتصاص الجذور  
النشطة لعنصر الكالسيوم وبالتالي يؤدي إلى تناقصه التدريجي بأنسجة الأشجار .

وتشتد حاجة ثمار الكمثري إلى عنصر الآزوت أثناء المراحل الأولى من تطور الثمار مما يستلزم تأجيل إضافة الآزوت أثناء مرحلة التزهير والعقد وحتى تصل الثمار إلى حجم مناسب .

ويؤثر على امتصاص الجذور للعناصر الغذائية عامل تضاد العناصر لبعضها عندما يزيد تركيز أحدهما عن حد الاتزان في محلول التربة نتيجة المبالغة في إضافته ، فزيادة تركيز الآزوت يؤثر على امتصاص البوتاسيوم كما أن زيادة البوتاسيوم تؤدي إلى ظهور أعراض بعض العناصر الأخرى التي أهمها عنصر الماغنسيوم .

وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن هناك علاقة معنوية بين حدوث الإصابة باللفحة النارية ومحتوى البوتاسيوم ونسبة الآزوت إلى البوتاسيوم في الأوراق والأفرع ومحتوى الأفرع من المنجنيز .

كما تشير إلى أن الحالة الغذائية للأشجار قد تؤثر على زيادة أو نقص مقاومة النبات للأمراض والحشرات .

### **ويراعى الآتي في التسميد في الأراضي القديمة:**

تضاف الدفعة الأولى من الأسمدة الآزوتية بعد العقد على ٢-٣ مرات ويفضل إضافة دفعات من نترات الكالسيوم .

يضاف السوبر فوسفات في خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر .

يبدأ في إضافة البوتاسيوم مع الري الأولى ثم بعد العقد ٢-٣ مرات .

يفضل إضافة عنصر البورون في التربة أو رشاً على النبات .

وفي حالة الأراضي الجديدة التي تروى بالتنقيط يراعى الآتي:

يفضل عدم إضافة الآزوت أثناء فترة التزهير والعقد أو تضاف بكميات صغيرة مع باقي العناصر الأخرى، حيث يمكن إضافة ١ / ٥ معدلات الآزوت أثناء فترتي التزهير والعقد في صورة نترات الكالسيوم بمعدل ١-٢ مرة في الأسبوع ويضاف ٧٠٪ في فترة ما بعد العقد حتى اكتمال نمو ونضج الثمار وتضاف باقي الكمية بعد جمع المحصول .

يضاف البوتاسيوم من بداية موسم النمو على أن يضاف ٣ / ٤ الكمية حتى جمع المحصول. ويضاف الباقي بعد جمع المحصول .

يضاف عنصر الفوسفور في صورة حامض فوسفوريك على دفعات أسبوعية أو مع الى الآزوت والبوتاسيوم ٢-٣ مرات يوميا .

يضاف عنصر المغنيسيوم بالتساوى مع دفعات الآزوت والبوتاسيوم .

تضاف العناصر الصغرى التي أهمها الحديد والزنك والمنجنيز في صورة مخلبية إما في شبكة الري أو رشاً على النبات ابتداء من بعد العقد ٢-٣ مرات حتى جمع المحصول ومرة بعد جمع المحصول ويضاف عنصر البورون إما في التربة أو رشاً على النبات ،ويراعى تركيز عنصر البورون في التربة ومياه الري في حالة الري على مياه الآبار .

تضاف الأسمدة العضوية خلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى شهر ديسمبر بمعدل ٢-٤ مقاطف للشجرة حسب عمر الأشجار على جانبي الأشجار

على أن تغير الاتجاهات سنويا مع إضافي السوبر فوسفات وسلفات البوتاسيوم وسلفات النشادر والكبريت الزراعي بمعدل ١ كجم من مخلوط هذه الأسمدة خلطا مع الأسمدة العضوية .

وتفيد الأسمدة العضوية الجيدة التجهيز في الأراضي الرملية في: زيادة محتوى التربة من العناصر الغذائية الصالحة للامتصاص سواء العناصر الكبرى أو الصغرى .

رفع قدرة الأرض الرملية على الاحتفاظ بالماء وزيادة تماسكها إلى حد ما .  
تقليل الفاقد من العناصر الغذائية بالرشح عند زيادة مياه الري .  
يؤدي إلى زيادة النشاط الحيوي بالتربة وتحلل المواد العضوية غير المتحللة .  
تحسين الخواص الطبيعية للتربة مع خفض رقم ال PH للتربة .

### ج- التقليم:

تعتبر عملية التقليم لأشجار الكمثري من أهم العمليات البستانية لتنظيم الإثمار وإنتاج محصول كبير وثماره جيدة الصفات وتحمل الثمار في مجاميع على دوابر موجودة على أفرع ناضجة عمرها سنتين أو أكثر ، وتستمر الدوابر في الإثمار مدة طويلة قد تصل إلى عشرة سنوات تفقد بعدها قدرتها على الإثمار وتجف لذلك فإن عمية التقليم تجري سنويا للأشجار تنحصر أهميتها في المحافظة على حيوية ونشاط هذه الدوابر وفي نفس الوقت تشجيع تكوين دوابر إثمار أخرى لتحل محل الدوابر

المثمرة القديمة كما يعمل التقليم السنوي على زيادة مسطح الإثمار تدريجيا بزيادة عمر الأشجار .

ويهدف التقليم في السنوات الثلاث الأولى إلى تكوين الهيكل العام للأشجار وتنسيق وتوزيع الفروع الأساسية على الساق الأصلي على ارتفاع مناسب وكذلك تربية الأفرع الثانوية في اتجاهات مختلفة بما يسمح بتخلل أشعة الشمس لجميع أجزاء الأشجار لتنضج النموات الحديثة وما تحمله من براعم ثمرية ويسمى هذا التقليم بتقليم التربية .

وتربى أشجار الكمثري بطريقة تربية الفرع الرئيسي الوسطى أو الطريقة الكاسية ويتم بعد زراعة الأشجار في المكان المستديم قرط الساق الرئيسي على ارتفاع يتراوح ما بين ٦٠ - ٧٠ سم من سطح الأرض وتزال جميع النموات النامية عليه وفي موسم التقليم الأول ينتخب من ٤ - ٥ أفرع رئيسية تقرط على مسافة ٣٠ - ٥٠ سم تبعا لقوة نموها وتكون موزعة بانتظام حول الساق الرئيسي عن بعضها بمسافة ٤ - ٥ سم وتزال النموات الأخرى ويلاحظ أن يكون بدء التفريع على ارتفاع ٤٠ - ٥٠ سم من سطح الأرض وفي الشتاء التالي أي في ديسمبر ويناير ينتخب من ٢ - ٣ أفرع جانبية ثانوية قوية على كل من الأفرع الرئيسية بحيث تكون موزعة توزيعا منتظما ومتباعدة عن بعضها بمسافة ٤ - ٣٠ سم وابتداء من موسم التقليم الثالث التي بدأ الإثمار يجري التقليم تبعا لقوة النمو الخضري علما بأنه كلما كان التقليم خفيفا كلما كانت الأشجار أسرع نحو النمو وإبكار في الإثمار .

وتبدأ الأشجار في الإثمار بعد ٤-٥ سنوات من زراعتها في البستان وذلك تبعا لخصوبة التربة والعناية بالعمليات الزراعية .

وتقتصر عملية التقليم في الأشجار المثمرة في إزالة وخف الأفرع المتوسطة السمك عمر سنة والأفرع المتشابكة والمتزاحمة والجافة والضعيفة والأفرع المائلة والنموات الغضة مع المحافظة على الارتفاع المرغوب للشجرة وجعل قمة الشجرة مفتوحا لكي يساعد على انتظام الحمل وتجديد الدوابر الثمرية للحصول على ثمار جيدة الصفات مع سهولة إجراء العمليات الزراعية .

ملاحظات هامة على تقليم أشجار الكمثري المثمرة:

عند إجراء التقليم لأشجار الكمثري المثمرة يجب التخلص من التراكيب الضارة والتفرحات البكتيرية التي يمكن أن تكون موجودة على الأفرع مع مراعاة الآتي :

يفضل أن يكون التقليم الموسمي متدرج أي تقليم محدود وعلى مراحل خلال شهري نوفمبر وديسمبر حيث أن التقليم الجائر يشجع نمو العديد من الأفرع الحديثة شديدة القابلية للإصابة ،بالإضافة إلى أن التقليم الدوري يعطى فرصة للتخلص من التفرحات الموجودة على الأفرع (مصدر الإصابة في الربيع) .

يحذر أن تزال السرطانات المتكونة أثناء سريان العصارة حيث أن إحداث أي جروح بها يؤدي إلى دخول البكتيريا إلى الشجرة الذي يمكن أن يؤدي إلى موتها بالكامل . ويراعى أن يتم التخلص من السرطانات فقط أثناء طور السكون .

إزالة جميع الأفرع الجافة والأفرع المصابة بالتقرحات البكتيرية حيث يتم القطع أسفل المنطقة الجافة بمسافة ٤-١٠ سم ويجب تطهير الأدوات المستخدمة في محلول هيبوكلوريد الصوديوم (كلوراكس) بمعدل ٠.٥٪ مع حرق نواتج التقليم .

ضرورة كشط التقرحات عندما لا يزيد قطر القرحة عن نصف محيط الفرع الأساسي أو الجذع، ويتم إزالة كل المناطق المقترحة حتى الوصول إلى القلف السليم ولمسافة ٢ سم من حافة القرحة ثم تغطى بعجينة بوردو أو أحد العجائن الموصى بها . تعتبر عملية التقليم الجيد وحرق نواتجه فوراً من أهم طرق القضاء على خنافس القلف على أن يتم الرش الجيد والمباشر على الأفرع الرئيسية والجذع مرتين الأولى في أواخر شهر نوفمبر والثانية بعد التقليم مباشرة وذلك بالمخلوط التالي :

سيدال ل ٥٠ EC / بمعدل ١٥٠ سم<sup>٣</sup> + ١٥٠ سم<sup>٣</sup> كيروسين + ١٥٠ سم<sup>٣</sup> صابون سائل لكل ١٠٠ لتر ماء .

#### د- الإزهار والعقد:

يجب أن ترش الأشجار المثمرة بعد عملية التقليم بأحد المواد الكاسرة للسكون في خلال النصف الثاني من شهر يناير حيث أن هذا الرش يعمل على التبكير في خروج البراعم الزهرية وانتظام خروجها وينصح لزيادة نسبة العقد في الكمثري الرش بحامض الجبريلك بتركيز ١٠-٥ جزء في المليون وذلك عندما تصل

نسبة الإزهار بالشجرة إلى حوالي ٣٠ ٪ وتكرر مرة أخرى عند نسبة  
تزهير ٧٠ ٪ وينصح بزراعة الملقحات وسط أشجار الكمثري ليكونت من صنف  
الكمثري الهود حيث يساعد التلقيح الخلطي على زيادة نسبة العقد وبالتالي زيادة  
المحصول .

### هـ- مقاومة الحشاش:

تقاوم الحشاش في مزارع الفاكهة التي تروى بنظام الري بالتنقيط إما بالعزيق  
أو النقاوة اليدوية للحشاش الحولية ، أما الحشاش المعمرة مثل النجيل والحلفا  
والسعد تقاوم بالرش بأحد المبيدات الجهازية مثل الهربازد أو الرواندأب أو اللانسر  
بتركيز ١ ٪ ويكرر الرش بعد ٧ أيام . ويمكن مقاومة الحشاش الحولية بأحد المبيدات  
التي تعمل بالملاسة مثل الجرامكسون في أطوار البادرة بمعدل ١ ٪.

### و- المحصول:

تختلف كمية المحصول تبعا للصنف وعمر الأشجار ودرجة كفاءة إجراء  
العمليات الزراعية المختلفة خصوصا التقليم السليم مع مقاومة الأمراض  
والحشرات عموما فإن أشجار الكمثري اللبكونت تعطى محصولا عاليا مربحا  
وتقدر متوسط محصول الشجرة فيما يتراوح بين ٥٠ - ٧٠ كجم وقد يصل إلى أكثر  
من ٥ كيلو في المزارع الممتازة وتنضج ثمار الكمثري خلال شهر أغسطس وتجمع  
الثمار عادة قبل مرحلة النضج التام سواء كانت للإستهلاك الطازج وللتنصنيع وذلك  
لأن ترك الثمار لتنضج على الأشجار يساعد على تدهورها سريعا ويقلل من

قدرتها للحفظ وعموما يتم جمع الكمثري عند عمر حوالي ١٣٥ يوم من الإزهار الكامل وتكون صلابتها في حدود ١١-١٢ رطل / بوصة .

## الإكثار:

### أ- إكثار الأصول:

يتم إكثار أصول الكمثري عن طريق البذور حيث تستورد بذور أصل الكمثري الكميونس سنويا من الخارج ويتم إجراء عملية التنضيد أي الكمر البارد في الثلاجة وذلك بنقع البذرة في محلول حامض الجبريليك بتركيز ١٢٥ جزء في المليون (نصف قرص في لتر ماء (لمدة ٢٤ ساعة ثم يتم تطهير البذرة بأحد المطهرات الفطرية مثل البنليت أو الفيتافاكس أو الريزولكس بمعدل ٣ جم / كيلو بذرة ثم توضع في بيئة رطبة مكونة من الرمل + البيت موس بنسبة ١:٢ وتخلط جيدا ثم توضع في صناديق أو أكياس بلاستيكية مثقبة وتوضع في الثلاجة على درجة ٥ درجة مئوية لمدة ٤٥-١٥ يوم، وبذلك تكون البذرة جاهزة للإنبات .

تزرع البذرة بعد إجراء عملية التنضيد لها في خلال شهر فبراير أو مارس في خطوط المشتل تحت نظام الري بالتنقيط ، ويفضل أن تزرع في أرض رملية خالية من الأملاح لم تزرع من قبل خالية من الحشائش وكذلك فطريات التربة التي تؤدي إلى سقوط نسبة كبيرة من البادرات في مراحل إنباتها الأولى .

ويفضل أن يتم ريهما بأحد المطهرات الفطرية السابقة خلال فترة إنباتها ٣-

٤ مرات كل 4-10 يوم .

ترك الأصول بالمشتل حتى تصل إلى السمك المناسب للتطعيم ويفضل أن يتم الانتخاب في أرض المشتل حيث يتم إزالة الأصول الغير متجانسة في النمو ولا ترك الأصول المتماثلة في النمو والشكل على مسافات ١٠-٤ سم .

### بد إكثار شتلات الكمثري:

يتم إكثار الشتلات عن طريق التطعيم بالعين في خلال الفترة من شهر يونيه حتى سبتمبر أو بالقلم القمي خلال شهري يناير وفبراير ولا يفضل التطعيم بالقلم . ويتم التطعيم على ارتفاع ٤-٥ سم من سطح الأرض .

مواصفات شتلة الكمثري:

- أن تكون ذات مجموع جذري قوى خالي من الإصابة بالامراض .
- أن تكون منطقة التطعيم بارتفاع ٤-٥ سم من سطح الأرض .
- أن يكون الطعم بسمك لا يقل عن ٠.٨-١ سم بطول لا يقل عن ٥-٦ سم .
- أن تكون ممثلة للصنف خالية من الامراض وأن تكون العيون من أمهات عالية المحصول غير مصابة بالأمراض .

## زراعة الموز (الطلح)



الموز من نباتات البيئة الاستوائية (الحارة الرطبة) وموطنه الأصلي الهند والملايو في جنوب شرق آسيا ، ويعتبر الموز من أقدم النباتات التي إستخدمها إنسان الغابة حيث استعمل أوراقه في أغراض الحياة البدائية كما تناول في غذائه الكورمات واللب الداخلي الغض لنباتات الموز البرية والتي كانت ثمارها جافة لا تصلح كغذاء بعكس أصناف الموز التجارية لم تكن تنتج ثمارا ذات لب غض المعروفة حاليا.

### المناخ المناسب:

تتطلب زراعة الموز الناجحة تربة خصبة خفيفة جيدة الصرف ولا تلائمه الأراضي القلوية ، ويمكن زراعة الموز بالأراضي الرملية مع الحرص على إضافة الأسمدة العضوية وإتباع نظم الري الحديثة واستخدام برامج التسميد الكاملة ولا تصلح الأراضي الثقيلة لزراعة الموز لسوء تهويتها وصرفها واعاققتها لنمو الجذور بالإضافة إلى تشققها عند تعرضها للجفاف مما يؤدي إلى تمزق الجذور ومن ناحية أخرى فإن زيادة الري في الأراضي الثقيلة يؤدي إلى تعفن الجذور ، تستبعد الأراضي المالحة من زراعة الموز لشدة حساسية الموز للملوحة ، ويجب قبل زراعة الموز فحص التربة للتأكد من خلوها من المستويات الحرجة من النياتودا خصوصا في بعض

الأصناف التي تشتد إصابتها بالنياتودا حيث تتخذ في مثل هذه الحالات إجراءات لتعقيم التربة قبل الزراعة .

### **ميعاد الزراعة:**

أحسن وقت لإقامة المزرعة المستديمة هو أواخر فبراير وطوال شهر مارس وذلك تبعاً للظروف الجوية للمنطقة ، وتبدأ عملية إعداد الأرض في نوفمبر وحتى أول يناير السابق للزراعة ويحذر من الزراعة الخريفية (أغسطس - سبتمبر) لسببين: الأول : حتى لا تتعرض النباتات بعد الغرس وقبل أن يقوى نموها لبرودة الشتاء واحتمالات الصقيع و الثاني : ليتم إزهار نباتات الغرس وتنمو ثمارها في ظروف جوية مناسبة ولكي تصل السوباتات لصلاحيتها للقطع في الموسم المفضل لتسويق الموز بأسعار مجزية (منتصف أكتوبر - آخر يناير) ويفضل غرس التقاوي بعد إعدادها وتعريضها للشمس مدة لا تزيد عن أسبوع .

### **الموارد المائية:**

ويجب توفر مصادر تضمن استمرار إمداد الموز بماء الري على مدار العام مع التأكد من خلوها من تركيزات وعناصر الملوحة الضارة لحساسية الموز الشديدة للملوحة سواء في التربة أو في ماء الري .

### **إعداد التقاوي**

١ - طولها بين ٥ - ٦ سم في الأصناف القصيرة، ولا تقل عن ١٥ سم في الأصناف الطويلة .

٢ - القلقاسة سليمة ممتلئة بالغذاء .

٣ - أن تكون الفسيلة مخروطية الشكل .

٤ - سليمة وخالية من الآفات خاصة النيماتودا أو الأمراض الفيروسية

ويصعب تميز الفسائل المصابة بالأمراض الفيروسية:

(أ) استخدام الفسائل : ويجب أن تتوفر بها الصفات التالية : التورد

والترقش) عند إستلام الفسائل لعدم وجود أوراق منفرجة ولذلك

يجب معاينة المشتل قبل التقلع والتعامل مع المشتال المضمونة .

(ب) استخدام البزور الصغيرة : وتكون عادة بطول ٥ سم ويتبع معها طريقة

الزراعة الضيقة (٢ × ٢ م) وتعتبر البزور أفضل وسيلة للزراعة حيث

أنها تعطي محصول كامل في العام التالي وتؤدي إلى انتظام حياة المزرعة

في السنوات المتتالية .

(ج) استخدام كورمات كبيرة الحجم : وتجهز من فسائل لم تعطى محصولها

حيث يزال البرعم الطرفي من الفسيلة وتزرع الكورمة في المكان

المستديم فتتمو البزور من الكورمة ويتنخب منها العدد المطلوب بكل

جورة .

### **غرس التقاوي:**

عندما يكتمل إعداد الأرض وتجهيزها للزراعة بالطريقة التي تم شرحها

تكون الأوتاد المميزة لمواقع الحوض أو الباكية وتراعى عقب ذلك أن تروى الأرض

حتى تستقر الجور قبل غرس التقاوي وعندما تصل الأرض إلى جفاف مناسب تعد

حفرة صغيرة مناسبة تكفي لإستيعاب قاعدة الفسيلة أو البز أو الكورمة وسط

الجورة السابق تجهيزها ، ويراعى أن تغرس الفسيلة رأسيا بحيث تكون الكورمة و جزء من الساق الكاذبة مدفونة تحت سطح التربة . وتتم الزراعة بتثبيت الثري الرطب حول الكورمة ثم تروى الأرض ريا خفيفا بعد بضعة أيام من الزراعة على أن تكرر عملية التثبيت مرة أخرى .

### **تقليع الشتلات بعد تربيتها :**

تقلع الشتلات بعد سنة من زراعتها بالمشتل بإستخدام الفأس الفرنسية ويجري إعدادها للغرس بالمكان المستديم فتزال أنصال أوراقها ما عدا الملفوف منها في وسط الحلقة وذلك لتقليل فقد الرطوبة بقدر الإمكان ، ويراعى عدم جرح كورمة النبات أثناء التقليع ولا يزال من الكورمة سوى الجزء المتعفن منها إذا وجد وقد تفصل منها البزور الكبيرة إن وجدت كما تنظف من بقايا الجذور المهشمة ، ثم تفرز وتصنف تبعا للحجم وتترك نحو ٤-٧ يوم في مكان ظليل جيد التهوية تتخلله أشعة الشمس فتفقد جزءا من مائيتها وتتخلص مما قد يكون بها من ديدان ثعبانية مما يوفر لها ظروفًا أفضل للنجاح عندما تزرع عقب ذلك بالأرض المستديمة ، وأفضل الشتلات المرباه ما كانت جيدة النمو كبيرة الحجم على ألا يكون العنقود الزهري بها قد بدأ نموه ويستدل على ذلك بوجود أوراق النباتات الداخلية ذات أنصال كاملة الالتفاف والخلفة الجيدة ما كان طولها من الكورمة حتى منطقة إنفراج أنصال الأوراق بين ٥ - ٦ سم في الموز الهندي، ٦ - ١٤ سم في الموز المغربي .

## الري:

١- **الري بالغمر**: تحتاج نباتات الموز إلى الدقة في ضبط الري وتوفير

الإحتياجات المائية المناسبة، وأفضل مستوى من الرطوبة الأرضية هو ما كان فوق ٧٠٪ من السعة المائية للتربة وبحيث يتم الري بمجرد أن تصل نسبة الرطوبة الأرضية عن ذلك وتجب العناية بعدم ركود الماء حول النباتات . ويفيد في تنظيم الري استخدام أجهزة قياس الرطوبة الأرضية المناسبة مثل التنشيوميتر على أن يكون القياس على أعماق مختلفة تحت التربة (٣٠، ١٥، ٩٠ سم) وتنظم عملية الري في المزارع الكبيرة وبصفة عامة يمكن القول بأن الموز يحتاج للري مرة كل ٥ - ٨ أيام صيفا وكل ٢ - ٣ أسابيع شتاء ويحتاج إلى ٣٥ - ٤٥ رية في السنة ، ويتوقف توقيت الري وكيفيته على خصائص التربة وعمقها وطبيعة المناخ بالمنطقة وفي نظام الري التقليدي. ويجب إحكام الري بعمل أحواض صغيرة تروى على الحامي حتى لا تتسبب زيادة الري إلى خنق المجموع الجذري .

٢- **الري بالتنقيط**: يفضل ري مزارع الموز الحديثة باستخدام أسلوب

الري بالتنقيط مما يسمح بإعطاء النبات إحتياجه الفعلي من الماء بالإضافة إلى ما يتيح هذا الأسلوب من إضافة الأسمدة مما يعرف بالري التسميدي، ويؤدي استخدام الري بالتنقيط إلى تقليل نمو الحشائش كما انه يزيد المحصول إذا ما أحسن استخدامه وإدارته والري بالتنقيط هو الطريقة الواجب إتباعها عند استخدام الشتلات الناتجة من زراعة

الأنسجة . وبصفة عامة يتبع في نظام الري بالتنقيط مد خطين من أنابيب الري على جانبي كل صف من صفوف الموز وتكون النقاطات موزعة على هذه الخطوط على أبعاد ٥٠ سم ومعدل تصريف النقاط الواحد ٤ لتر / ساعة ويتراوح عدد ساعات التشغيل اليومي بين ٦ ساعات، ١٢ ساعة في اليوم مما يوفر للنبات ما بين ٢٧ لتر / يوم، ٥٤ لتر / يوم تبعا للظروف المؤثرة على مدار فصول العام (المناخ - حجم النبات ومسطحه الورقي) ويتم حساب التصريف وعدد ساعات التشغيل بما يسمح بتوفير الرطوبة الأرضية حوالي ١٨ ٪ من السعة الحقلية ويفضل إتباع هذا النظام تحت إشراف فني مع تدريب القائمين على متابعته وعند استخدام الري بالتنقيط ينصح دائما بالغمر مرتين في السنة وذلك لغسيل الأملاح المترسبة على سطح التربة مما يؤدي إلى تنشيط نمو النباتات وارتفاع إنتاجيتها نظرا لحساسية الموز لارتفاع تركيز الأملاح بمنطقة الجذور الماصة .

### التسميد:

الموز من أكثر نباتات الفاكهة احتياجا للتسميد ويجب أجزاء تحليل التربة قبل رسم السياسة السمادية للمزرعة على أن يصاحب ذلك تحليل الأوراق لمعرفة مدى حاجة النباتات للتسميد وتعتبر التسميد منضبطا والنبات قويا صحيحا إذا ما احتوت المادة الجافة لهذه الورقة على ٢.٦ - ٢.٩ ٪ أزوت 0.5 - 0.29 (N2)

فوسفور ( $P_2O_5$ ) ، % 3.4 – 3.3 بوتاسيوم ( $K_2O$ ) وعموما يمكن الاسترشاد بالبرنامج التالي لتسميد دمن من الموز 1- : التسميد العضوي : ويضاف بمعدل ٤٠ م ٦٠ م ٣ للذمن خلال الشتاء وفي العام الأول يضاف أثناء إعداد الجور قبل الزراعة.

## ٢- التسميد المعدني الأرضي :

(أ) الأسمدة النتروجينية المعدنية : وتضاف بمعدل ٥٥٠ جم أزوت للنبات في السنة ومن المفضل توفيرها من سلفات النشادر وتوزع على دفعات نصف شهرية تمتد حتى شهر أكتوبر وتبدأ في السنة الأولى بعد الزراعة بشهر أما في السنوات التالية فتبدأ أول ابريل .

(ب) الأسمدة الفوسفاتية : وتضاف بمعدل ٤٥ وحدة خامس أكسيد الفوسفور . ( $P_2O_5$ ) وتوفر عادة من سوبر فوسفات الكالسيوم بما يعادل ١٥ جم / نبات تضاف خلال الشتاء ويمكن تقلبيها مع السماد البلدي الذي تتم إضافته في نفس التوقيت .

(ج) الأسمدة البوتاسية : وتضاف بمعدل ١٥ جم / ( $K_2O$ ) نبات / سنة ، حيث تقسم على دفعتين الأولى خلال شهر ابريل والثانية خلال شهر يوليو ويتم توفير البوتاسيوم من سماد سلفات البوتاسيوم ( $K_2SO_4$ ) .

٣- التسميد الورقي : يعطى السهاد الورقي من العناصر الصغرى من المركبات الجاهزة بمعدل ٣ رشات في شهر يوليو - أغسطس - سبتمبر . التسميد في نظام الري التسميدي : في الحالات التي يستخدم فيها الري بالتنقيط تراعى الملاحظات الآتية :

(أ) السهاد العضوي : يضاف لجورة الزراعة مخلوط مكون من ١ كجم سهاد بلدي + ١ كجم من سهاد فوسفات العادي + ١ / ٢ كجم من K<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>) ويضاف سهاد البودريت المعالج بالحرارة في ابريل ويونيه بالطريقة التي ستوضح فيما بعد . أما في السنوات التالية فينثر سهاد البودريت المعامل بالحرارة بمعدل ٣ / ٢ كجم للمساحة المبتلة حول النبات في فبراير، ابريل، يونيو كل عام من خلط السهاد بالتربة المبتلة لعمق ١٠ سم . ٣ .

(ب) تخفض المقننات السهادية السنوية المذكورة في نظام الغمر إلى النصف للعناصر الثلاثة ، ويضاف المقنن السنوي من الأزوت وفي صورة نترات نشادر على دفعات أسبوعية تحقن مع ماء الري ابتداء من الأسبوع الأول من ابريل في عام الزراعة وأواخر فبراير في الأعوام التالية وحتى الأسبوع الرابع من سبتمبر أو أكتوبر مع وقف التسميد طوال شهر يوليو .

(ج) عند استخدام حامض الفوسفوريك التجاري كمصدر لعنصر الفوسفور يضاف المقنن السنوي على دفعات أسبوعية متساوية مخلوطة

مع دفعات الأزوت على أن تنتهي دفعات الفوسفور في الأسبوع الرابع من يونيو (د) عند استخدام السوبر فوسفات العادية كمصدر للفوسفور وهو المفضل فيضاف يدويا للجورة في دفعتين متساوية ابتداء من العام الثاني في فبراير ومايو مع خلط السماد بالتربة المبتلة لعمق ٤ سم .

(هـ) يضاف المقنن السنوي من البوتاسيوم حقنا مع ماء الري في دفعات متساوية ومساوية لعدد دفعات التسميد الأزوتي على أن تحقن بالتبادل معها في أيام مختلفة مع وقف التسميد طوال شهر يوليو . ويضاف للتسميد البوتاسي عند الحاجة مصدر للمغنسيوم ( $Mg\ So_4$ ) ويتراوح المقنن السنوي من كبريتات المغنسيوم بين ١٧٠ ، ٢٩٠ كيلو جرام / دنم / سنة وذلك كل عامين اعتبارا من العام الثاني . (و) لا يزيد التركيز النهائي لمحاليل الأسمدة عن ١٢٥ جزء في المليون سواء من مصدر واحد أو من مصادر مختلفة ويجب ألا يزيد مدة إضافية المحاليل السمادية عن طريق المنقطات عن ٨ ساعات يوميا تبدأ في الصباح المبكر وتتجنب فترة القيلولة .

### الإنضاج :

تقطع السباط عند اكتمال نمو الثمار وقبل أن تبدأ بها تغيرات النضج للأسباب السابق توضيحها ويجري إنضاج الثمار بعدة طرق :

١ - تعليق السوباتات في خطافات بحيث تكون مدلاة في مكان مظلل دافئ  
وتتبع هذه الطريقة في معظم البلاد الاستوائية .

٢ - بالحرارة المتولدة من مواقد الفحم البلدي يوضع الموز في غرفة خاصة  
بالإنضاج وتبها الثمار قبل إدخالها غرف الإنضاج وذلك بوضعها مدة ٢  
- ٦ أيام بعد الجمع في مكان جيد التهوية مظلل لتفقد جزء من رطوبتها  
وتجس الثمار باليد قرب الأعناق للتعرف على درجة ليونتها قبل إيقاف  
عملية التسوية ، وعندما تلين الثمار تنقل إلى غرفة التلوين وهي غرفة  
فسحة جيدة التهوية ذات أرفف توضع عليها السباط في وضع رأسي  
أو قد تعلق في خطافات تتدلى من سقف الحجرة ، وتستمر الثمار في  
غرفة التلوين ٢ : ٦ أيام ليصفر لونها وتصبح صالحة للإستهلاك  
الطازج ويستدل على ذلك بظهور بقع بنية صغيرة على جلد الثمار وهو  
دليل لتحول النشا بلب الثمرة إلى سكريات ذائبة ، وقد تلف السباط  
أثناء التلوين بورق الجرائد .

٣- يجري الإنضاج بطرق تجارية تستخدم فيها وسائل للتحكم في الحرارة  
والرطوبة والتهوية وتعمل بالكهرباء وتراوح درجة الحرارة المناسبة  
لذلك بين ٥ - ١٧ درجة م وتكون الرطوبة النسبية بين ٩٠ - ٩٥ ٪ في  
المرحلة الأولى للتسوية ثم تنخفض إلى ١٨ - ٨٥ ٪ خلال مرحلة

التلويين . ويساعد على الإنضاج بعض الغازات التي تنتج عن نشاط تنفس الثمار داخل غرف التسوية - وأبرزها تأثير غاز الأثيلين .

٤ - المعاملة بالغازات وتستخدم حاليا في أسواق الجملة ، وفي هذه الطريقة توضع الثمار في حجرات بها تحكم ذاتي في درجة الحرارة (١٧ درجة م صيفا - ١٨ درجة م شتاء) ويمكن إغلاقها بإحكام لمنع تسرب الغازات منها . تشحن السبائط بهذه الغرف ثم تغلق بإحكام ويوصل إليها غاز الاستيلين أو الاثيلين من إسطوانات الغاز المسال الموضوعة خارج الغرفة وذلك عن طريق فتحات خاصة وبحيث يصل تركيز الغاز إلى درجة خاصة فتنضج الثمار خلال ٢ - ٣ أيام تصبح بعدها صالحة للاستهلاك ، ويكون النضج أسرع وأكثر انتظاما عن الطرق الحرارية السابقة ، ولكن يعاب عليها سهولة انفصال الأصابع من الكفوف بمجرد الاهتزاز بالإضافة إلى سرعة إسوداد الثمار وتغير طعمها عن المألوف ، وتظهر هذه العيوب عادة نتيجة لعدم الدقة في توقيت المعاملة أو لزيادة تركيز الغاز مما يستدعي خبرة خاصة لإجراء الإنضاج بهذه الطريقة .

٥ - المعاملة بالهرمونات : يتم إنضاج الموز بالرش أو بغمر عنق السوباطة في محلول مائي لبعض الهرمونات ، ويجب الحذر في استخدام الهرمونات ولا تستخدم إلا بعد التأكد من عدم إضرارها بالإنسان ويستخدم حاليا

الايثريل بتركيز ٥٠ جزء في المليون في الشتاء، ١٢٥ جزء في المليون صيفا  
مع تنظيم الحرارة والرطوبة.

### تخزين الثمار:

- يمكن إطالة فترة تسويق الموز بعد إنضاجه بحفظه على درجة حرارة ١١ - ١٢ درجة م لمدة ١ - ٢ أسبوع ، أما قبل الإنضاج فيمكن تخزينه لمدة ٤ - ٦ أسابيع
- على درجة حرارة ٥ - ٤ درجة م على أن تكون الرطوبة النسبية بالمخازن المبردة ٨٥ - ٩٠ %.

### طرق إكثار الموز:

لا تستخدم طريقة الإكثار البذري في الموز إلا في حالة برامج التربية واستنباط الأصناف الجديدة ولا تعطى أصناف الموز الموجودة في مصر بذوراً ولذلك فوسيلة الإكثار الخضري هي الوسيلة الوحيدة لإكثار هذه الأصناف.

وفيا يلي الطرق المختلفة التي يتم فيها إكثار الموز خضرياً :

### أولاً : الطريقة التقليدية للإكثار:

وفيها يتم إكثار الموز بإحدى الوسائل الآتية :

#### ١- البزوز (الفكوك):

وهي الخلفات الصغيرة قبل تفتح أوراقها وهي مخروطية الشكل وعادة ما

تكون بطول يتراوح ما بين ٢٠ - ٣٠ سم .

#### ٢- الخلفات:

وهي المرحلة التي تصل إليها البزوز عندما تتقدم في النمو ويظهر عليها أوراق

خضراء وتصنف هذه الخلفات تبعاً لدرجة نموها وتطورها إلى :

#### أ- الخلفة السيفية :

وهي الخلفة الصغيرة في أول مراحل نموها حيث تكون أوراقها سيفية

الشكل ويتراوح طولها من ٣٠ - ٥٠ سم وهي أنسب وسائل الإكثار في المشتل .

#### ب- الخلفة المائية :

وهي الخلفة السطحية ذات أوراق عريضة وهذه الخلفات تكون ذات قلقاسة

صغيرة الحجم ونموها الخضري كبير ولا ينصح باستخدام مثل هذه الخلفات في

الإكثار نظراً لعدم نجاحها بالمشتل .

### جـ الخلفة البالغة :

وهي الخلفة التي اكتمل نموها الخضري وتحتوى على عدد من الأوراق المتفتحة وأوشكت على الإزهار ويختلف طولها حسب الصنف .

وعموماً باستخدام الخلفات كوسيلة للإكثار في المشتل يجب قرطها لارتفاع ١٠ سم من قمة الكورمة ويجب التخلص من البرعم الطرفي لإتاحة الفرصة لخروج أكبر عدد من البراعم الجانبية حتى يمكن الحصول على أكبر عدد من الشتلات .

### ٣- الكورمات:

وهي الساق الحقيقية لنبات الموز ويوجد عليها براعم جانبية ويفضل زراعة الكورمات لنباتات لم تزهر بعد وتزرع هذه الكورمات بالمشتل بعد قطع الساق الكاذبة على ارتفاع 10 سم من قمة الكورمة وتقشر بعض قواعد الأوراق لإظهار البراعم الموجودة ، كما لا بد من التخلص من البرعم الطرفي للكورمة حتى يمكن أن يعطى فرصة للبراعم الجانبية للنمو ، ويجب تنظيف الكورمة من الجذور القديمة قبل الزراعة ، ويمكن تقسيم هذه الكورمات إلى قطع صغيرة تحتوى كل واحدة منها على برعم على ألا يقل طول الكورمة عن ١٠ سم في كل من الجوانب المحيطة بالبرعم ثم تطهيرها بإحدى المطهرات الفطرية وزراعتها مع الاحتراس من زيادة الري منعاً من تعفنها .

### ثانياً : الطريقة الحديثة للإكثار:

وهي إكثار الموز خضرياً باستخدام تكتيك زراعة الأنسجة النباتية وهي تتلخص في استخدام القمم النامية للنباتات وتقسيمها إلى أجزاء عديدة وكل جزء ينمى في بيئات غذائية معينة وفي أنابيب معقمة لإنتاج نباتات صغيرة يتم أقلمتها قبل

نقلها للتربة والهدف من طريقة إكثار الموز خضرياً بتكنيك زراعة الأنسجة هو إنتاج شتلات خالية من الأمراض الفيروسية مع تجانس النباتات في النمو ومواعيد الإزهار والإثمار كما تتميز هذه الطريقة بالحصول على أعداد كبيرة من النباتات في أقل حيز من المكان وأقل وقت وبأقل عدد من البراعم .

### **شروط الفسائل الجيد :**

يجب أن تتوفر بعض الشروط في الشتلات الناتجة من المشتل والصالحة للنقل للمكان المستديم وهذه الشروط هي :

ألا يقل طول الفسيلة ابتداء من قمة الكورمة إلى منطقة تفرع الأوراق عن ٧٠-١٠٠ سم في حالة الأصناف قصيرة الساق الكاذبة مثل الهندي والبسري ، أما الأصناف طويلة الساق الكاذبة مثل المغربي والجراندان فيجب ألا يقل طول الساق الكاذبة عن ١٥ سم ولا تزيد عن ٣٧ سم .

أن تكون الساق الكاذبة مخروطية الشكل يستدق محيطها حتى قمته .

يجب أن تكون القلقاسة كبيرة الحجم ممتلئة بالمواد الغذائية .

يجب أن تكون النباتات خالية من الإصابة الفيروسية وخالية من الإصابة

بالنيماتودا .

## إنشاء وخدمة البستان المستديم :

بعد التأكد من توفر جميع مقومات نجاح مزرعة الموز من حيث الظروف البيئية من مناخ وتربة ومياه الري الصالحة والخالية من الأملاح ومدى توفر الشتلات المناسبة والتمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج .  
وتتم عملية إنشاء وخدمة المزرعة كما يلي :

### أولاً : تجهيز الأرض للزراعة:

بعد اختيار الأرض المناسبة للزراعة يتم حرث الأرض جيداً مع إضافة متر مكعب جير مطفي للدنم لتطهير الأرض من الديدان الثعبانية وللمساعدة على تحليل المواد الغذائية ثم يعاد حرثها عميقاً حتى عمق ٥٠ سم تحت التربة عدة مرات مع تسويتها تسوية جيدة ثم تتم الزراعة بإحدى الطريقتين الآتيتين :

#### أ- طريقة الجور:

يتم تعيين أماكن الجور ثم تحفر الجور بأبعاد متر × متر وبعمق حوالي ٧٠ سم وتترك مدة كافية قبل الزراعة لتشميسها وتطهيرها ثم تردم الحفر بالتراب المخلوط جيداً بالسماد البلدي أو السبلة بمعدل ٨ مقاطف ويضاف نصف كجم كبريت زراعي ثم تحدد أماكن النباتات في وسط الجور وتقسّم الأرض إلى أحواض ثم تروى رياً خفيفاً حتى تهبط الجور ويستوى سطح الأرض ثم تترك حتى تجف جفافاً مناسباً وتكون جاهزة لزراعة الشتلات .

## بـ طريقة الخنادق:

تتم بحفر الخنادق بعرض 1.6 متر وعمق ٧٠ سم وتترك معرضة للشمس وقبل الزراعة يتم ردم الخنادق بالطبقة العليا من تراب الخندق مع مخلوط من السماد البلدي أو السبلة بمعدل ٦ م / ٣ دNM مضاف إليها سماد السوبر فوسفات بمعدل ١٢٥ كجم للدنم ٦٠ + كجم كبريت زراعي للدنم على أن تخلط هذه الكمية مع بعضها جيداً ثم تروى الأرض رياً غزيراً ثم تترك لتجف الجفاف المناسب ثم يتم تحديد أماكن الجور في وسط الخندق

## ثانيا : مسافات الزراعة:

ويتم تحديد أماكن الجور حسب مسافات الزراعة كالآتي :

### أ: الزراعات الواسعة :

بالنسبة التي تروى غمراً وتزرع بشتلات تقليدية على أبعاد ٣.٥ × 3.5 متر بالنسبة للأصناف القصيرة مثل الهندي والبسراي وعلى أبعاد ٤ × ٤ متر بالنسبة للأصناف الطويلة مثل المغربي والوليامز والجيراندانان مع تربية ثلاث نباتات بجوار الأم كل عام .

بالنسبة للأراضي الرملية والتي تروى بنظام الري بالتنقيط فغالباً ماتزرع بشتلات ناتج زراعة الأنسجة مع زراعة نبات واحد في الجورة ويحتاج الدنم إلى ٤٠٠ نبات في السنة الأولى على أن يربى ثلاث نباتات بجوار الأم كل عام .

### بد الزروعات الضيقة:

بالنسبة للأراضي التي تروى غمراً يتم زراعتها على أبعاد  $2 \times 2$  متر بالنسبة للأصناف القصيرة وعلى أبعاد  $2.5 \times 2.5$  متر بالنسبة للأصناف الطويلة مع تربية نبات واحد بجوار الأم كل عام .

بالنسبة للأراضي الرملية والتي تروى بنظام بالتنقيط فيتم زراعتها بإحدى هذه الطرق :

زراعة على أبعاد  $3 \times 3.5$  م مع زراعة نباتين في الجورة الواحدة بحيث يبعد النبات عن الآخر حوالي ٥٠ سم وبذلك يحتاج الدنم إلى ٥٠ نبات في السنة الأولى على أن يربى نبات واحد بجوار الأم كل عام .

الزراعة على أبعاد  $4 \times 2.5$  متر مع زراعة نباتين في الجورة الواحدة بحيث يبعد النبات عن الآخر حوالي ٥٠ سم على أن يربى نبات واحد بجوار الأم كل عام  
الزراعة على أبعاد  $3 \times 2.5$  متر مع زراعة نبات واحد في الجورة الواحدة على أن يربى نباتين بجوار الأم كل عام .

### ثالثا : كيفية زراعة الشتلات:

وبعد تجهيز الأرض يتم زراعة الشتلات بالأماكن المحددة لها حسب نوع الشتلة كالآتي :

#### ١- بالنسبة للشتلات التقليدية :

تحضر الشتلات بعد تركها بضعة أيام بعد تقليعها وقبل زراعتها لتلتئم جروح القلقاسة ثم تزال منها جميع البزوز والجذور التالفة والأجزاء المتعفنة من القلقاسة ثم تزرع بعمق حوالي ٦ سم بحيث تكون القلقاسة وجزء بسيط من الساق الكاذبة حوالي ١٠ سم مدفوناً تحت سطح الأرض ثم يردم حولها وتثبت التربة جيداً بالضغط عليها بالأرجل ثم تروى النباتات رياً خفيفاً .

## ٢- بالنسبة للشتلات ناتج زراعة الأنسجة يتبع فيها الآتي :

يتم حفر حفرة بالجورة أو الخندق مساوياً لحجم الكيس البلاستيك .  
يتم إزالة قاعدة الكيس البلاستيك بمطواة حادة على أن يسند قاعدة الكيس باليد .  
يتم وضع الكيس الموجود به النبات بعد إزالة قاعدته في الحفرة المعدة لذلك ويتم ردم الحفرة من جميع الجوانب على الكيس البلاستيك .  
تمسك حواف الكيس البلاستيك ويرفع إلى أعلى وبذلك يتم التخلص من الكيس بدون تلف المجموع الجذري أو سقوط خلطة الكيس .

## الميعاد المناسب للزراعة:

ختلف ميعاد الزراعة المناسب في مصر تبعاً لنوع الشتلة المستخدمة في الزراعة كالآتي :

أ- بالنسبة للشتلات التقليدية : زراعتها في الأرض المستديمة بداية من منتصف شهر فبراير حتى منتصف شهر أبريل تبعاً للظروف الجوية للمنطقة .

ب - بالنسبة للشتلات ناتج زراعة الأنسجة والنامية في أكياس بلاستيك  
فتزرع في ميعادين كالآتي :

#### ١- الميعاد الأول :

ما يطلق عليه عروة الربيع حيث يتم زراعة الشتلات خلال شهري مارس  
وأبريل وتزهر هذه النباتات من منتصف شهر أغسطس حتى نهاية أكتوبر في نفس  
العام ويتم جمع الثمار بداية من شهر يناير حتى نهاية شهر مايو ، هذا مع استخدام  
نظم الري الحديثة وإتباع برنامج تسميدي مناسب.

#### ٢- الميعاد الثاني :

ما يطلق عليه العروة الخريفية وتزرع الشتلات خلال شهري يوليو وأغسطس  
وتزهر هذه النباتات خلال شهري يوليو وأغسطس من العام التالي ويتم جمع  
المحصول بداية من شهر نوفمبر حتى نهاية مارس هذا مع إتباع نظم الري الحديثة  
وبرنامج تسميد مناسب .

#### التسميد :

يتوقف نجاح زراعة الموز على توفير الإحتياجات الغذائية الضرورية للنبات  
طول فترة حياته ونظراً لنموه وتزهيره في فترة قصيرة نسبياً فهو يثمر بعد عام واحد  
في المناطق الإستوائية وحوالي عام ونصف في المناطق تحت الإستوائية ، كما هو الحال  
في مصر لذلك فإحتياجاته من العناصر الغذائية المختلفة عالية لكي ينمو جيداً  
ويعطى إثماراً عاليا وذو جودة ممتازة .

ونبات الموز يحتاج لعناصر النروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والكبريت وكلها من العناصر الكبرى ، كما يحتاج إلى بعض العناصر الصغرى مثل الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون وكذلك الموليبدنم . وعموماً عند وضع أي برنامج تسميدي لمزرعة الموز يجب الاسترشاد بتحليل الأوراق حيث تأخذ عينات من منتصف فصل الورقة الثالثة من قمة النبات عند تزهيره وتقدر فيها تركيز العنصر .

### أولاً : تسميد الموز في الأراضي الطينية التي تروى غمراً:

يوصى بتسميد الموز في الأراضي الطينية الصفراء بأن يكون في السنة الأولى للزراعة للجورة الواحدة التي بها خلفه واحدة بمعدل ٢ كجم سلفات نشادر تضاف على دفعات من أول مايو حتى نهاية أكتوبر ويحتاج الدنم إلى ١٥٠ كجم سلفات نشادر أو ما يعادله من الأسمدة الآزوتية الأخرى ، أما في السنة الثانية وما يليها فيكون التسميد للجورة الواحدة التي بها ثلاث خلفات بمعدل ٨ مقاطف سماد بلدي تضاف شتاءً ديسمبر - يناير مخلوطة بواحد كجم سوبر فوسفات وكما يضاف للجورة ٤ كجم سلفات نشادر تضاف على دفعات بدءاً من أول أبريل حتى نهاية أكتوبر + واحد كجم سلفات بوتاسيوم تضاف على دفعتين الأولى في شهر أبريل والثانية في شهر يوليو أي أن الدنم يحتاج ٣٧ كجم سلفات نشادر ١٨ + كجم سوبر فوسفات ١٨ + كجم سلفات بوتاسيوم في السنة .

**ثانيا : تسميد الموز في الأراضي الرملية التي تروى بنظام الري بالتنقيط :**

يجب أن يتم تسميد الموز في الأراضي الرملية طبقاً لنظام الري بالتنقيط لزيادة معدل الاستفادة من الأسمدة المضافة والتي تزيد معدلاتها نظراً لافتقار مثل هذه الأراضي للعناصر المعدنية الضرورية لنمو وإثمار الموز .

وعموماً يحتاج ذنم الموز للأراضي الرملية التي تروى بنظام الري بالتنقيط إلى ٣٧ كجم نترات نشادر وحوالي ١١٥٠ كجم سلفات بوتاسيوم في السنة أي حوالي ٤٠٠ وحدة آزوت وإلى حوالي ٥٠ وحدة بوتاسيوم بو ٢٠ وهذه الكميات قد تختلف بالزيادة أو النقصان حسب نوع التربة وحالة النباتات فإذا كانت التربة جيدة أي درجة احتفاظها بالماء والعناصر عالية وحالة النباتات جيدة فتقل هذه المعدلات والعكس صحيح .

ويتم تسميد الموز في السنة الأولى للزراعة بعد أربعة أيام من الزراعة بمعدل ٢.٥ كجم سماد نترات نشادر ٢.٥ + كجم سلفات بوتاسيوم للذنم يومياً عن طريق شبكة الري ثم تزداد كمية السماد حتى تصل أقصاها في شهر أغسطس حوالي ٥ كجم ثم تبدأ كمية السماد اليومية في الانخفاض تدريجياً حتى تقف في آخر شهر نوفمبر .

جدول رقم (٢) × : الإحتياجات السادية لذنم الموز في الأراضي الرملية التي تروى بالتنقيط .

الإحتياجات السادية لدنم الموز في الأراضي الرملية يراعى إضافة سباد  
نترات النشادر وسلفات البوتاسيوم خمسة أيام في الأسبوع  
أما بالنسبة للأسمدة العضوية فلها أهميتها في الأراضي الرملية حيث يجب أن  
يضاف للتربة خلال الشتاء بمعدل لا يقل عن ١٠ متر مكعب للدنم من السماد  
البلدي الخالي من مسببات الأمراض ، وقد يفضل عليه سباد القمامة الناعم أو سباد  
البودريت نظرا لخلوهما من بذور الحشائش والنياتودا .

**التريية والإنتخاب:**



### **الإنتخاب هو تربية وإنتخاب الخلفات :**

إختيار العدد المناسب من الخلفات الصغيرة بجوار الأم تترك لتعطى محصول  
العام التالي وإزالة ماعداها من الخلفات والهدف منها هو إتاحة أفضل الظروف  
الملائمة لنمو الخلفات والتحكم في المواعيد المناسبة للإزهار وجمع المحصول ، وتحت  
الظروف المصرية فإن التزهير خلال يوليو وأغسطس مناسب تماما لإعطاء

محصول خلال شهري ديسمبر ويناير وعليه تجري عملية التربية والانتخاب تبعا لخطوات معينة للحصول على هذا الميعاد .

### **خطوات التربية والانتخاب:**

#### **١- بالنسبة للسنة الأولى تتم عملية التربية تبعا لنوع الشتلة المنزرعة كالآتي**

أ- في حالة الزراعة بشتلات تقليدية : يبدأ ظهور البزوز الصغيرة حول الأم بعد حوالي شهرين من الزراعة حيث تترك هذه البزوز حتى شهر يوليو وخلال هذا الشهر يتم التربية والانتخاب حيث ينتخب ثلاث خلفات حول الأم في حالة الزراعات الواسعة أو خلفه واحدة حول الأم في حالة الزراعات الضيقة .

ب- في حالة الزراعة بشتلات ناتج زراعة الأنسجة : يبدأ ظهور البزوز الصغيرة حول الأم بعد حوالي شهر من الزراعة وتتوالى ظهور الخلفات حتى نهاية شهر يونيو حيث يتم إزالة جميع هذه البزوز التي ظهرت قبل التاريخ ثم تظهر بعد ذلك بزوز خلال شهر يوليو حيث تترك هذه البزوز ويتم تربيتها والانتخاب منها خلال شهر أغسطس ويتم إنتخاب من ٣-١ خلفات حسب مسافة الزراعة المتبعة .

#### **٢- بالنسبة للسنة الثانية وما بعدها:**

تضم كل جورة ٣-٢ نباتات كبيرة خلفه أولى والتي قد سبق إنتخابها من العام السابق في حالة الزراعات الواسعة ونبات واحد لكل جورة في حالة الزراعات الضيقة وبداية من شهر مارس تبدأ هذه النباتات في إخراج بزوز كثيرة حولها بغير نظام لذلك تزال جميع البزوز التي تظهر حتى نهاية شهر إبريل على أن

ترك أي بزوز تخرج حول الأم بعد ذلك بحيث تجري التربية وإنتخاب هذه البزوز خلال شهر يونيو بالنسبة للأراضب الطينية التي تروى غمرا أما بالنسبة للأراضى الرملية التي تروى بنظام التنقيط فيتم إزالة أي بزوز تظهر قبل نهاية مايو على أن تترك أي بزوز تخرج حول الأم بعد ذلك بحيث تجري التربية وانتخاب الخلفات خلال شهر يوليو وذلك بالنسبة لمناطق الوجه البحري أما بالنسبة للمناطق الحارة فيتم تأخير تربيتها شهرا حيث أن هذه الخلفات تعطى إزهارا مناسبا خلال شهري يونيو وأغسطس من العام التالي ويمكن جمع محصولهما خلال شهري ديسمبر ويناير وعموما يجب مراعاة الآتي عند تربية وإنتخاب الخلفات :

يجب أن تكون البزوز المنتخبة موزعة توزيعا منتظما حول الأمهات ونامية على مسافات متساوية من بعضها بقدر الإمكان والقريبة من الأم والغير ملتصقة بها تزال جميع البزوز التي تظهر في وسط الجورة في السنة الثانية وما يليها .  
عدم إنتخاب البزوز التي تخرج من الكورمات القديمة للنباتات التي سبق إثمارها والتي تعرف بالخلفات المائية وهي نباتات ذات أوراق عريضة .

في حالة الزراعة في العروة الخريفية والتي تزرع بشتلات ناتج زراعة الأنسجة يتم التربية والإنتخاب من البزوز التي تظهر حول الأم مباشرة مع الإهتمام بالتسميد الآزوتي للحصول على نمو خضري قوى قبل دخول النباتات فترة الشتاء .

يجب ملاحظة سرعة نمو النباتات أثناء التربة فإذا وجد أن النمو قوى جداً وهذا يحدث في الأراضي عالية الخصوبة مع المغالة في التسميد والذي يؤدي إلى التبكير في التزهير عن الموعد المناسب ففي هذه الحالة يجب زيادة عدد النباتات المربة في الجور مع عدم المغالة في التسميد أما إذا وجد أن نمو النباتات ضعيف بالتالي سيتأخر إزهارها إلى الشتاء فتتأثر الأزهار والثمار بالبرد مما يؤدي لتلفها لذلك يجب الإسراع من تزهير مثل النباتات في الوقت المناسب ويتم ذلك بتقليل عدد النباتات المربة في الجور مع العناية بالتسميد والري .

### **خدمة الأرض بعد الزراعة: العزيق**

الغرض منها هو إزالة الحشائش المختلفة التي تنافس النباتات غذائها كما أنها مصدر من مصادر الحشرات وخاصة حشرة المن الناقلة لمرض تورق القمة كما أنها تكون مصدر من مصادر الإصابة بالنيماتودا وعموماً تنقسم الحشائش المنتشرة بمزارع الموز إلى حشائش حولية عريضة الأوراق مثل حشيشة الرجل و إلى حشائش معمرة مثل حشائش الحلفا والنجيل .

ونظراً لجذور الموز السطحية جداً حيث يوجد ٤٠٪ من الجذور الشعرية الماصة في طبقة الـ ٥٪ الأولى من سطح التربة وبالتالي فإن عمليات العزيق المستمرة بواسطة العمال أو العزاقات الميكانيكية أثناء موسم النمو وقبل إضافة الأسمدة الكيماوية تؤدي إلى تمزق نسبة كبيرة من الجذور الشعرية الماصة لذا ينصح بعزقة واحدة للتخلص من الحشائش وتقليب الأسمدة العضوية خلال شهري نوفمبر

وديسمبر ويمكن أن تستمر إلى شهر يناير العزقة الشتوية ، ثم بعد شهر أو شهرين تظهر الحشائش مرة أخرى ، وفي هذه الحالة تقاوم الحشائش الحولية بإزالتها باليد أو الفأس أما الحشائش المعمرة فتقاوم باستخدام المبيدات الكيماوية المتخصصة لإبادة الحشائش للتخلص منها دون حدوث أي ضرر على المجموع الخضري أو الجذري للنبات على أن يكون الرش باحتراس مع عدم وصول الرش إلى الخلفات الصغيرة على أن يكرر الرش بعد شهرين أو ثلاثة حسب كثافة الحشائش التي تظهر بعد ذلك .

### **القلقسة :**

وهي عملية إزالة قلقاسات الأمهات القديمة وردم مكانها بالتراب حتى لا تعيق من نمو جذور الخلفات الجديدة وحتى لا ينمو خلفات صغيرة ضعيفة غير مرغوب فيها وحتى لا تتعفن وتصبح مصدر عدوى لأعفان الجذور ، وتتم هذه العملية بعد مرور ٤ - ٣ سنوات من عمر المزرعة وتجري خلال شهري فبراير ومارس .

### **التوريق :**

هو إزالة الأوراق الجافة من على النباتات وذلك للأغراض الآتية :

أ - نظافة المزرعة ويتم بإزالة الأوراق الجافة من النباتات بعد مرور فصل الشتاء والانتهاء من جمع المحصول ويتم غالباً في شهر مارس .

ب - كشف الخلفات المربعة ويتم في شهر يوليو بعد تربية وانتخاب الخلفات وذلك لتعريض الخلفات للشمس والضوء حتى تنمو بصورة جيدة وغالباً ما تتم للأوراق المكسورة أو المتدلية فوق الخلفات .

### **قطع الكوز الزهري:**

هو إزالة الأزهار المذكرة والموجودة بالعنقود الزهري وتتم هذه العملية في إحدى المراحل الآتية :

#### **أ - المرحلة الأولى:**

يتم فيها إزالة الثلث السفلى من البرعم الزهري بعد تمام ظهور وتفتح أول كف .

#### **ب - المرحلة الثانية:**

يتم فيها إزالة النصف السفلى من البرعم الزهري بعد تمام ظهور وتفتح الكف الخامس .

المرحلة الثانية لقطع الكوز الزهري

#### **ج - المرحلة الثالثة:**

يتم فيها إزالة البرعم الزهري بالكامل والمحتوى على الأزهار المذكرة بعد تمام ظهور وتفتح جميع الكفوف مع ترك جزء من الحامل الزهري بطول لا يقل عن ٤ سم من آخر كف ويدهن بإحدى المطهرات الفطرية وعموماً تؤدي عملية قطع

الكوز الزهري إلى زيادة وزن السباطة بحوالي ٥ - ١٠٪ كما تبكر من اكتمال نموها بحوالي ١-٢ أسبوع .

### **التكيس:**

هي عملية تغطية السباطات بأكياس البولي إثيلين الزرقاء بغرض توفير الجو المناسب من الحرارة والرطوبة للسباطة خلال أشهر الشتاء من نوفمبر حتى يناير مما يؤدي إلى زيادة سرعة اكتمال نمو السباطة كما تزيد من وزن السباطة بالإضافة إلى المحافظة عليها من الأضرار الميكانيكية أثناء النمو وجمع المحصول ، وتتم هذه العملية بداية من أوائل شهر نوفمبر وتستمر حتى شهر يناير ويراعى في الكيس المستخدم أن يكون بعرض ٥٠ - ٧٠ سم وبطول ٦٠-٧٠ سم وسمك الكيس ٧٠ ميكرون حيث تربط هذه الأكياس من أعلى السباطة عند منطقة العنق وتترك مفتوحة من أسفل كما يمكن تخريم الأكياس بثقوب قطرها ١ سم والمسافة بين الثقب والآخر ٦ سم وذلك لتوفير التهوية اللازمة لنمو السباطة .

### **حماية الخلفات الصغيرة خلال الشتاء :**

تتم بترك النباتات التي قطعت سباطاتها خلال فصل الشتاء للعمل على حماية الخلفات الصغيرة المرباة للموسم القادم علاوة على انتقال بعض العناصر الغذائية للكورمة الموجودة أسفل سطح التربة ، ويتم البدء في قطع هذه النباتات على ارتفاع ٦ سم من سطح الأرض عند دفء الجو في شهر مارس

## المحصول:

يعتبر محصول الأمهات للشتلات التقليدية منخفض بالنسبة لتكلفة إنشاء المزرعة حيث يتراوح محصول الدنم بين ١-٢ طن ويزداد تدريجياً في السنوات التالية حتى يصل إلى ٢-٤ طن طبقاً لنظام الري وعمليات الخدمة المتبعة بالمزرعة .

## علامات إكتمال نمو الثمار:

تقطع ثمار الموز وهي خضراء ولا تترك حتى تنضج على النبات حيث أن الثمار التي تنضج على النبات تفقد كثير من الصفات الأكلية وصفات الجودة وتكون أقل تحملاً للتداول من الثمار التي تقطع وتنضج صناعياً، كما أن الثمار التي تقطع قبل اكتمال نموها تفشل في النضج وتصبح خسارة في كمية المحصول .

وعموماً فإن أهم علامات اكتمال نمو الثمار تتضح في الآتي:

عدد الأيام من التزهير ويختلف تبعاً للنوع والصنف وتاريخ خروج الشمرخ فمثلاً النباتات التي تزهر في شهر يوليو يكتمل نمو سباطاتها بعد ٦٠-١٠٠ ويستخدم في المزارع الكبيرة الآن شرائط ملونة لتمييز تزهير كل أسبوعين بلون مختلف لسهولة عملية الفحص دون رفع أكياس البلاستيك .

تقارب الكفوف واندماج السباطة حتى تأخذ الشكل المميز لها .

استدارة الأصابع وهي من أهم العوامل المحددة للقطع ويوجد عدة درجات

للاستدارة هي :

أ- أقل من ٤ / ٣ استدارة إمتلاء وهذا لا ينضج في غرف الإنضاج ولا تكون

الثمار قد وصلت إلى درجة اكتمال النمو .

ب - ٣ / ٤ إستدارة وهي أقل درجات القطع والتي يمكن عندها إنضاج الثمار بنجاح وبتجانس في الكمية المنضجة .

ج - ٣ / ٤ - ممتلى نوعاً وهذه الدرجة من الإستدارة تصلح للدول المصدرة .

د - ممتلى نوعاً وتصلح هذه الدرجة للأسواق القريبة والأسواق المحلية .

هـ - ممتلى تماماً ولا تصلح هذه الدرجة من القطع إلا للأسواق المحلية .

وفي مصر يقتصر التداول بين المنتجين وتجار الجملة على الثمار الممتلئة نوعاً أو

الثمار الممتلئة تماماً وذلك لإقبال المستهلك على الثمار الممتلئة .

عملية القطع والتحميل والنقل وتخزين وإنضاج ثمار الموز

### تخزين ثمار الموز:

غالباً ما تخزن الثمار الخضراء على درجة ١٤ - 13° م حتى لا تصاب بأضرار البرودة ، ودرجة رطوبة نسبية ٩٠ - ٨٥٪ وذلك لمدة ٤ - ٣ أسابيع مع إزالة الثمار الناضجة والتي بدأت في النضج ، بينما تخزن الثمار الناضجة على درجة ٤ م ورطوبة ٨٥٪ وذلك لمدة أسبوع على الأكثر .

### إنضاج ثمار الموز:

تنضج ثمار الموز في غرف خاصة بالإنضاج ، ويتحكم في عملية الإنضاج

العوامل الآتية:

درجة اكتمال النمو :

فكلما زادت الإستدارة كلما أسرع عملية النضج .

درجة الحرارة :

وأفضل درجة حرارة للإنضاج الثمار تتراوح بين  $5^{\circ} - 18^{\circ}$  م.

درجة الرطوبة :

وأفضل درجة رطوبة هي ٩٠٪ رطوبة نسبية.

نوع وتركيز غاز الإنضاج :

وعموماً يستخدم غاز الإيثيلين أو الإيثيلين بتركيز ١٥ جزء / مليون .

مدة التعرض للغاز :

وغالباً يتم التعرض لمدة ١-٢ يوم حسب درجة اكتمال النمو .


التهوية :

حيث يراعى التهوية بعد ١-٢ يوم مع تعرض الثمار للغاز وعامة تنضج الثمار

بعد ٣-٧ أيام حسب درجة اكتمال النمو وحسب الموسم صيفاً أو شتاءً وتركيز

الغاز المستخدم .

## زراعة العنب



### التربة المناسبة:

يجود العنب كغيره من أنواع الفاكهة بالأراضي الطمية والخصبة العميقة . ويمكن للعنب أن ينمو في أنواع التربة المختلفة من طينية ثقيلة إلى رملية بها نسبة مرتفعة من الزلط ، ويتحمل العنب بل يجود في الأراضي الكلسية التي ترتفع فيها نسبة الكالسيوم، ومن ناحية أخرى فإن كروم العنب تتحمل ملوحة التربة وماء الري بدرجة متوسطة وهناك دلائل على أن بعض أصناف العنب تتحمل ملوحة يصل تركيزها إلى ١٢٥٠ جزء في المليون .

### إعداد الأرض للزراعة :

طرق الزراعة : من المعتاد زراعة محصول بقولي كالبرسيم في السنة السابقة للزراعة وقد يقلب لتحسين التربة ثم تحرث التربة وتنعم وتسوى قبل تجهيز الجور ويكون الحرث بعمق ٥ - ٦ سم.

تخطيط المزرعة : يعتمد التخطيط في جميع الحالات على الغرس في صفوف على أبعاد منتظمة مع ترك مسافات كافية لدوران آلات الحرث والرش والعزيق في نهايات الصفوف ، ويتوقف طول الصف على قوام التربة والميول المتاحة بها ، ففي الأراضي الخفيفة تكون الصفوف قصيرة حوالي ( ٦ م ) مع ميول مناسبة تسمح بتماثل توزيع الماء بالتساوي بين الصفوف ، أما الأراضي الثقيلة فتكون الصفوف أطول مع ميول أعلى لتناسب انخفاض قدرة التربة وبطئها في شرب الماء .

### **تتحكم العوامل الآتية في تحديد خطوط غرس الكرمات :**

١ - التعرض لأشعة الشمس : يفضل عادة اتجاه الخطوط من الشمال إلى الجنوب في المناطق المعتدلة حتى تتعرض الثمار للشمس أكبر فترة ممكنة . أما في المناطق التي تشتد فيها الحرارة صيفا يجب أن يكون اتجاه الخطوط من الغرب إلى الشرق حتى تتظلل الثمار بعد الظهر في الوقت الذي تشتد فيه الحرارة للوقاية من لفحة الشمس .

٢ - اتجاه الرياح : يجب أن تكون خطوط الغرس في اتجاه موازي للجهة التي تهب منها الرياح بقدر الامكان حتى تمر الرياح بين صفوف الكرمات . ٣ - يؤخذ في الاعتبار شبكة الري وإنحدار التربة بما يناسب سهولة وكفاءة الري .

### **مسافات الغرس :**

تختلف أبعاد غرس الشتلات تبعا للعوامل الآتية :

١ - خصوبة التربة .

2 - نوع الدعامات .

٣ - قوة نمو الكرّمات .

٤ - طريقة الري .

٥ - الأصناف .

٦ - طريقة التربية .

ويلاحظ أن العوامل المذكورة متداخلة التأثير وأهمها طريقة التربية والتي

تتوقف بدورها على الأصناف وعموما تتلخص أبعاد الغرس في الآتي :

**أولا :** الطريقة الرأسيّة الرضويّة (القائمة) : وتكون المسافة ٢ متر بين الصفوف

أما بين الكرّمة والأخرى داخل الصف فتكون ١ / ٢ و ١ - ٣ متر في

التربة الرملية، ٢ - ٣ متر في التربة الخصبة .

**ثانيا :** طريقة التربية على أسلاك بنظمها وأشكالها المختلفة : تكون المسافة بين

الصفوف ٢ - ٣ متر بينما تكون ١ / ٢ و ١ - ٣ متر بين الكرّمة والأخرى

داخل الصف تبعا لخصوبة التربة .

**ثالثا :** طريقة التربية على التكايب : إذا تم الغرس بالنظام المربع تكون

الأبعاد ٣.٥ × ٣.٥ متر أما إذا كان الغرس من صف واحد فقط فتكون

المسافة ٧ متر .

وبصفة عامة تضيق المسافات في المناطق التي تشتد فيها الحرارة لإتاحة

الفرصة لزيادة التظليل والحد من أضرار ارتفاع الحرارة ، حفر الجور وغرس

الشتلات : تجهز الجور في مواقع الغرس بحيث تكون بأبعاد مناسبة (٤٠ × ٤٠ × ٥٠ سم) ، وقد يتم التجهيز ميكانيكا في صورة خنادق على طول صف الغرس وبالعمق والعرض المطلوبين وعند غرس الشتلات يراعى أن يكون المجموع الجذري في الاتجاه المضاد لمواقع إقامة السنادات بجانب الشتلات فيما بعد دون الإضرار بالمجموع الجذري . ويفضل دق السنادات وقت الزراعة وإلا فتدق في بداية موسم النمو حتى يتاح تدعيم النمو الجديد واستقامة الغرس إقامة بواكي حول صفوف الكرمات والمبادرة بالري داخل البواكي .

### خدمة ما بعد الزراعة :

تعاني كروم العنب من الحشائش سواء المعمرة أو الحولية ويستخدم في مكافحة الحشائش كثير من الطرق الميكانيكية واليدوية أو التغطية بأساليبها المختلفة وكذلك مبيدات الحشائش والتي لاقي استخدامها توسعا كبيرا في الآونة الأخيرة ، وبصفة عامة يجب ألا تستخدم مبيدات الحشائش في الكروم حديثة الغرس ولمدة السنوات الثلاثة التالية على الأقل ، وكقاعدة عامة يراعى عند استخدام العزيق ألا يكون عميقا وألا يتجاوز ١٠ سم من سطح التربة لعدم الإضرار بجذور الكرمات ، ويعتبر العزيق فعالا في إزالة الحشائش الحولية ، أما المعمرة فتحتاج إلى تكرار العزيق مع نقاوة الحشائش وحرقتها . ومن الوسائل الناجحة زراعة محاصيل للغطاء الأخضر خاصة البقوليات خصوصا في الكروم حديثة الإنشاء وحيث يمكن أيضا استخدام محاصيل الخضر مثل الطماطم والفلفل والقرعيات، وعند استخدام

مبيدات الحشائش يراعى الحذر من ملامسة المبيد لأوراق الكرمان ، ويفيد الجرامكسون مع الحشائش الحولية عريضة الأوراق ويأثله في ذلك الجيابريم والجياباكس . ويستخدم مبيد اللانسر (الروندآب) في مكافحة الحشائش النجيلية ويفضل في ذلك مبيد البسطة على الرغم من انخفاض الأخير في درجة أو شدة الإبادة لسلامة استخدامه بالنسبة للكرمان ، ومن المفضل في كثير من الحالات التخلص من الحشائش باستخدام المبيدات التي تضاف شتاء للتربة قبل ظهور الحشائش والاعتماد على ذلك وتجنب العزيق في الربيع والصيف حتى لا تنقطع الجذور النامية قرب سطح التربة .

### الري:

تعتمد الكروم في أراضي الوادي غالبا على نظام الري بالغمر بإتباع طريقة الأحواض أو البواكي أو الخطوط سواء العادية أو العريضة مع مراعاة مزايا وعيوب كل طريقة والظروف الملائمة لاستخدامها ، وبصفة عامة فإن السائد في نظام الغمر إعطاء الكروم ٧ ريات في المتوسط بمعدل ١٠٠ م<sup>٣</sup> في كل رية للذمم ، ويتوقف عدد الريات وكمية ماء الري في كل رية تبعا للمناخ وخصائص التربة والأصناف المنزرعة وعمر الكرمان ، ومن الواجب أن يراعى في تنظيم الري أن تتوفر الرطوبة في مجال انتشار الجذور في مستوى لا يقل عن 70 ٪ من السعة الحقلية ولا يرتفع إلى السعة الحقلية سواء في الكروم حديثة الغرس أو تلك المثمرة وذلك طوال موسم النشاط والنمو . ويبدأ الري خلال شهر فبراير بعد التقليم وخدمة التربة ويمتد حتى تبدأ الحبات في الطراوة (الليوننة) فيخفف الري وتطال فتراته

للإسراع في نضج الثمار والحد من نمو الأفرخ الغير مرغوب في هذه المرحلة وبعد قطف المحصول تصبح إحتياجات الكرم من المياه قليلة جدا وقد يمنع الري عن الأصناف المتأخرة ، أما الأصناف المبكرة والمتوسطة فتروي الأشجار مرة أو أكثر بعد قطف المحصول ويكون الري بعد القطف خفيفا مع إطالة فتراته وأخذ الظروف الجوية في الاعتبار ، ويمنع الري بعد ذلك وخلال الشتاء على أن يستأنف مع بداية موسم النمو التالي ، أما في التربة الرملية والأراضي المستصلحة فيسود الري بالتنقيط وينظم ري الكروم بحيث تظل الرطوبة في حدود السعة الحقلية ولا تقل عن ٧٠ ٪ منها على مدار الموسم ويلاحظ أن زيادة الرطوبة الأرضية عن السعة الحقلية تضر بالكرمات ويساعد على انتشار الأعفان ، أما نقصها فيؤدي إلى عطش النباتات وتعرضها لأضرار الذبول بالإضافة إلى انتقال الأملاح من خارج المنطقة المبتلة إلى داخلها حيث تنتشر الجذور الماصة للكرمات وما يترتب على ذلك من ضرر وفي جميع الحالات (من حيث المناخ والتربة وعمر النبات ونظام الري والصنف ومراحل النشاط خلال الموسم . . . الخ) يفضل دائما أن ينظم الري باستعمال الأجهزة الحساسة (التنشوميت) لقياس الرطوبة الأرضية وتحديد التوقيت المناسب للري وكميته طبقا لحاجة الكرمات .

### **التسميد :**

يعتبر التسميد من أكثر عمليات الخدمة حساسية في كروم العنب ، ويهتم بصفة خاصة بضبط برامج التسميد الأزوتي حيث يترتب على الإفراط في إضافة الأسمدة الأزوتية وزيادة الأزوت بالتربة إنتاج نمو خضري كثيف وتأخر نضج

القصبات وكذلك تأخر نضج الثمار مع زيادة حساسية الكرمات للأمراض الفطرية والتعرض لأضرار برودة الشتاء ، ومن ناحية أخرى فإن الإقلال والتقصير في التسميد الأزوتي ومعالجة نقص الأزوت يؤدي إلى انخفاض خصوبة العيون وضعف النمو الخضري بالإضافة إلى صغر حجم العناقيد ونقص المحصول ، وعموما تختلف الاحتياجات السمادية خصوصا من الأزوت بين الأصناف البذرية واللابذرية حيث تقل في الأولى عن الثانية ويمكن الاسترشاد بالبرنامج التالي في رسم السياسة السمادية لكروم العنب :

**أولا : التسميد العضوي :** لا داعي لإضافة السماد البلدي لتراب الجور عند

الغرس لعدم الإضرار بالمجموع الجذري حيث يستبدل ذلك بنثر السماد العضوي على سطح التربة قبل الحرثة الأخيرة عند تجهيز الأرض بمعدل ٤ متر مكعب للدم وقد يستبدل ذلك بقلب بقايا المحصول البقولي السابق أثناء تجهيز الأرض للزراعة (سماد أخضر) ويراعى عند قلب السماد الأخضر إضافة ٥ - ١٠ كجم سماد أزوتي لكل طن من وزن السماد الأخضر لتشجيع تحلل البقايا . أما في العام الثاني وما يليه فيجري التسميد العضوي لكروم العنب بمعدلات تتراوح بين ٥ - ٣٧ م<sup>٢</sup> للدم من السماد البلدي أو ما يعادله من الأسمدة العضوية الأخرى ، وتختلف معدلات التسميد العضوي في النظام المذكور تبعا لعمر الكرم ودرجة خصوبة التربة حيث يزيد المعدل في

التربة الرملية الفقيرة عن التربة الخصبة ، وفي جميع الحالات يخلط السباد البلدي قبل إضافته بسباد السوبر فوسفات العادية بمعدل ٥ كجم لكل متر مكعب سباد بلدي ثم ينثر المخلوط حول الكرمات ويعزق إلى عمق ١٠ - ١٢ سم ويتم التسميد العضوي خلال شهر يناير عقب إجراء عملية التقليم الشتوي السنوي ، وفي الحالات التي لا يتوفر فيها السباد العضوي يكتفي بإضافته عند توفره مرة كل سنتين ،

### **ثانيا : التسميد المعدني الأرضي**

(أ) الأسمدة النتروجينية المعدنية : يتدرج المقنن السنوي للكرمة الواحدة من الأزوت خلال سنوات التربية حيث يكون ٥ - ١٠ - ٢٠ - ٣٠ جم في سنوات الغرس (الأولى - الثانية - الثالثة - الرابعة) على التوالي وذلك في التربة الطمية الصفراء (الخصبة) بينما تكون ١٠ - ١٥ - ٣٠ - ٦٠ جم لنفس السنوات في التربة الرملية الفقيرة ، أما في السنة الخامسة وما يليها فيصبح المقنن الأزوتي للكرمة في الأراضي الطمية الصفراء ٤٠ جم وفي التربة الرملية ٧٠ جم للأصناف عديمة البذور، ٥٠ جم للأصناف البذرية ويوزع المقنن الأزوتي في السنوات الأربع الأولى من عمر الكرم على ٢ إلى ٣ أو ٤ دفعات متساوية من أواخر مارس حتى منتصف الصيف أما في المثمرة فيضاف السباد الأزوتي على دفعتين الأولى وتمثل  $\frac{3}{2}$  المقنن السنوي وتعطى بعدما تتفتح البراعم وقبل ظهور العناقيد أي في النصف الأول من مارس في الأصناف المبكرة

وفي النصف الأول من إبريل في الأصناف المتأخرة . ويضاف الثلث الباقي من المقنن بعد عقد الثمار أي بعد شهرين من الدفعة الأولى ، وقد يضاف المقنن السنوي دفعة واحدة قبل ظهور العناقيد في جميع الأصناف .

(ب) الأسمدة الفوسفاتية : يكتفي في سنة الغرس بما يخلط من سوبر فوسفات الكالسيوم مع السماد البلدي عند تجهيزه وإضافته للتربة الطمية الصفراء . أما في السنتين الثانية والثالثة فتحتاج الكرمة إلى ٥ وحدات خامس أكسيد الفوسفور (P2 O5) بما يعادل ٦ جم من سوبر فوسفات الكالسيوم تضاف على دفعتين متساويتين الأولى في أوائل فبراير والثانية في مايو ويضاعف المقنن السنوي من الفوسفات للكرمة من السنة الرابعة وما بعدها فيصبح ١٠ وحدات فو ٢٥ في دفعة واحدة أواخر يناير بعد التقليم الشتوي ، وفي أغلب الحالات يقتصر على التسميد الفوسفاتي بالمقنن المذكور على مرة واحدة كل أربع سنوات ، ولا يختلف الأمر في التربة الرملية الفقيرة عن ذلك إلا في مضاعفة المقنن خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الكرمة .

(ج) الأسمدة البوتاسية : تحتاج الكرمة في التربة الطمية الصفراء إلى التسميد البوتاسي بمعدل ٥ وحدات أكسير بوتاسيوم (K2 O) كمقنن سنوي في السنتين الأولى والثانية وتزيد الإحتياجات البوتاسية إلى

الضعف لتصبح ١٠ وحدات ( $K_2O$ ) كمقنن سنوي في السنتين الثالثة والرابعة . أما في السنة الخامسة وما بعدها فيستمر المقنن البوتاسي السنوي عند ٥ وحدة (٥ جم  $K_2O$ ) سواء للأصناف البذرية و اللابذرية أما إحتياجات التسميد البوتاسي في التربة الرملية الفقيرة فيكون المقنن السنوي للكرمة ١٠ وحدات (١٠ جم  $K_2O$ ) في سنة الغرس ثم ٤ ، ٥ ، ٤ وحدة في السنوات الثانية، الثالثة، الرابعة على التوالي ، وتستقر الإحتياجات البوتاسية في السنة الخامسة وما بعدها للكروم في التربة الرملية الفقيرة وتقدر بضعف الإحتياجات البوتاسية للكروم في التربة الطمية الصفراء ويوزع المقنن السنوي البوتاسي على دفعات متساوية بالتبادل مع المقنن الأزوتي وبفارق ريتين .

**ثالثا :** التسميد الورقي بالعناصر الصغرى : قد تعاني بعض الكروم من مظاهر أو أعراض نقص بعض أو معظم العناصر الصغرى خصوصا الزنك، المنجنيز - الحديد وتعالج مثل هذه الحالات بالرش بالأسمدة الورقية المناسبة ٢ - ٣ مرات خلال الموسم . وتكون الرشة الأولى خلال الفترة من ظهور الأوراق وقبل التزهير بثلاثة أسابيع والرشة الثانية بعد تمام العقد (شهر من الرشة الأولى) أما الرشة الثالثة فتكون بعد ٢ - ٣ أسابيع من الرشة الثانية إذا دعت الحاجة إليها .

التسميد في نظام الري التسميدي : في الحالات التي يستخدم فيها الري بالتنقيط تراعي الملاحظات العامة والخاصة بنظام الري التسميدي من حيث طريقة ومواعيد ومعدل التسميد العضوي وتخفيض المقننات السماكية من الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم التي سبق توضيحها في نظام الري بالغمر إلى النصف وذلك في حالة حقن الإحتياجات مع ماء الري مع الأخذ في الاعتبار التعليمات الخاصة بالتسميد الفوسفاتي الأرضي ويلاحظ أن ما يتبع في كروم العنب لا يختلف عما ذكر من توجيهات في المحاصيل الأخرى عند استخدام نظام الري التسميدي .

**التقليم والتربية:**

وبصفة عامة يجري التقليم الشتوي لسنوي لكروم العنب المثمرة في مصر خلال شهر طوبة (يناير) ، ويعتبر التقليم الشتوي للكرمات المثمرة من أهم العمليات البستانية المحددة لإنتاجية الكروم ولذلك فمن الواجب أن يجري بكفاءة عالية بواسطة عمال مدربين وأن يترك على الكرمة الواحدة العدد المناسب من العيون والذي يتم تقديره بمعادلات خاصة سبق الحديث عنها . ويفضل كثير من المنتجين إزالة القلف الجاف من جذع الكرمات أثناء الشتاء حيث تختفي فطريات البياض بأسفله ثم تدهن الأجزاء المنزوعة القلف بعجينة بوردو والتي يفضل أن تكون ذات قوام خفيف يقرب من محلول الرش ، ومن الأخطاء الشائعة إزالة أوراق العنب مبكرا في الموسم لزيادة الكلب عليها في الأسواق حيث تباع بأسعار مرتفعة وعلى الأخص أوراق العنب البناتي . ويؤدي التوريد المبكر بهذه الكيفية إلى ضعف الكرمات ونقص المحصول وإنخفاض جودته نتيجة للنقص الشديد في

الكربوهيدرات المجهزة للكرمة ، أما التقليم الصيفي فيجب أن يجري في أضيق الحدود حيث يقتصر أساسا على إزالة القمم النامية للأفراخ (التطويش) عندما يتعدى طولها متر لتوفير الفرصة والظروف المناسبة لتكوين فرخ ناضج متوسط السمك ، وهناك حالات يشتمل فيها التقليم الصيفي على إزالة بعض الأفراخ المتداخلة من أجل السماح لضوء الشمس أن يتخلل قلب الكرمة للمساعدة على تكوين العناقيد .

### **التكاثر:**

1- التكاثر بالعقل والترا قيد : يتكاثر العنب بالعقلة بسهولة - ويمكن إكثار العنب بأنواع مختلفة من العقل والترا قيد ، وفي المشاتل يتكاثر العنب بالعقل الخشبية العادية التي تزرع على خطوط المشتل مباشرة خلال شهر فبراير ، ويمكن استخدام عقل نصف غضة أو غضة تحت الضباب طوال العام أما في مناطق الكثبان الرملية فتستخدم عقل طويلة يساوي طولها العمق بين مستوى زراعة الكرمة والجزء الرطب في قاع الكثيب وتغرس العقلة في الجورة العميقة ثم يردم حولها بحيث لا يظهر منها سوى ٣ - ٤ براعم فوق سطح الأرض وبهذا يتكون المجموع الجذري على الجزء العميق من الفرع حيث الركوبة أما الجزء الظاهر فوق التربة فيكون المجموع الخضرى . وتستخدم الترا قيد العادية لترقيع مكان الكرّمات الغائبة .

٢ - إكثار العنب بالتطعيم : هناك حالات من آفات التربة تستدعي استخدام أصول مقاومة لهذه الآفات ومثال ذلك حشرة الفلوكسيرا التي تصيب جذور العنب الأوربي في كثير من البلدان ويتحتم إكثار العنب بالتطعيم على أصول مقاومة لهذه الحشرة ومن ناحية أخرى استخدمت أصول لتطعيم أصناف العنب عليها لزراعتها في المناطق الموبوءة بالنيماتودا .  
إنشاء الكرم :

قبل البدء في إنشاء الكرم يجب تحديد الطريقة التي سترى بها الكرمات ويحدد ذلك الأصناف ودرجة خصوبة بواعمها القاعدية ، فإذا كان الصنف المختار عقيم البراعم القاعدية كالبناتي وبز العنزة فيجب أن تكون الطريقة المختارة من طرق التربية على أسلاك مثل التربية القصبية أي الطرق التي تكون وحدات الإثمار فيها قصبات أما إذا كانت البراعم القاعدية للصنف المرغوب زراعته فلا داعي لقصر مجال الاختيار على طرق التربية القصبية فقط بل من الممكن المفاضلة بين جميع الطرق بما فيها الطرق التي تعتمد على الدوابر (الطراحات) وهي طرق التربية الرأسية وكذلك طرق التربية الكردونية، وعند الشروع في التجهيز لإقامة الكرم تحدد أنواع الدعامات في البستان حيث أنها تقام عادة في العام الثاني بعد غرس الشتلات وبالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام والتبكير بإقامة مصدات الرياح لأن الرياح تؤذي العناقيد وتشوه الحبات مما يقلل من قيمة المحصول خصوصا في أغراض الاستهلاك الطازج .

## إعداد التقاوي:

1- المرحلة الأولى : تبدأ عقب الإخصاب وتستغرق من ٢ - ٤ أسبوع وفيها يبدأ نمو الثمرة في الحجم نتيجة للانقسام السريع في خلايا جدر المبيض بعد تساقط الأجزاء الثانوية من الزهرة .

٢ - المرحلة الثانية : وتتميز بحدوث زيادة ملحوظة يمكن إدراكها ومتابعتها في حجم الثمار وتستمر الزيادة السريعة في حجم الثمار لمدة ٤ - ٦ أسابيع ثم تبطئ بعد ذلك تقريبا بعد ٢ - ٤ أسابيع أخرى .

٣ - المرحلة الثالثة : وتبدأ هذه المرحلة مع بلوغ الثمار حجمها وشكلها المميز للصنف وتستمر لمدة ٤ - ٦ أسابيع تصبح في نهايتها صالحة للأكل . ولا يحدث أثناء هذه المرحلة زيادة في حجم الثمار عادة وإنما يتم خلالها بعض التغيرات الكيميائية الرئيسية التي تجعل الثمار صالحة للاستهلاك .

## التزهير والعقد:

أزهار العنب الأوربي خنثى وتحمل في نورات تعطى بعد العقد عناقيد العنب المعروفة وتقسم الأصناف تبعا لحالة الأسدية في الأزهار إلى :

(أ) أصناف أزهارها تحتوي على أسدية قائمة وهي تعطي حبوب لقاح حية لها القدرة على الإخصاب .

(ب) أصناف أزهارها تحتوي على أسدية منحنية وحبوب اللقاح فيها غير قادرة على الإخصاب والمبيض في زهرة العنب علوي ويتكون من مسكنين ويوجد بكل مسكن بويضتان عند التزهير وتفتح الأزهار

ينفصل التويج تحت ضغط الأسدية ويسقط على هيئة قلنسوة ، ويتم العقد نتيجة لتلقيح وإخصاب المبيض وتكوين البذور داخل الحبات ، وهناك أصناف عديمة البذور تم انتخابها وبذلك أصبح لدينا العديد من الحالات لعقد الثمار في العنب تتمثل في الآتي :

**أولا :** صنف كورنث الأسود : وفيه يقف تتطور البويضات عند فترة الإزهار ويحدث عقد بكري تنشيطي للمبيض بواسطة التلقيح أو بتخليق الأذرع أو القصبات أو باستعمال منظمات النمو ، وهذا التنشيط هام لكي تتم نسبة عقد جيدة في هذا الصنف .

**ثانيا :** صنف العنب البناتي : يتم العقد بعد التلقيح والإخصاب الذي يعقبه مباشرة توقف الجنين عن النمو ولا يتم تكوين البذور بقصرتها المعروفة ولتصبح أثرية لا يشعر بها المستهلك عند الأكل ، ويسمى العقد في هذه الحالة بالعقد البكري الكاذب .

**ثالثا :** العنب البذري : معظم الأصناف بذرية الثمار ومنها بذرة مسكات الإسكندرية وتتوفر بكل ثمرة احتمالات وجود ما بين ١ - ٤ بذور عند تمام النضج .

**العناقيد :** ينشأ العنقود الثمري من النورة الزهرية وله عدة أشكال الشائع منها الشكل الهرمي أي يكون متسع من أعلى وضيق من أسفل ، ويتكون العنقود

الشمري من محور أو شمراخ رئيسي يتفرغ إلى عدة فروع ثانوية يخرج منها قريعات صغيرة (عناق الثمرة) وكل فريع يتصل به حبة واحدة من حبات العنب .

الثمار : الثمرة عنبه - تتكون من كرتلتين ويختلف عدد البذور داخل الثمرة باختلاف الأصناف فقد يصل عددها إلى أربعة بذور أو قد لا توجد بها بذور إطلاقاً ، وجلد الثمرة قد يكون سميك أو رقيق ، طري أو جامد، ملون بألوان مختلفة حسب الصنف ، ويعزي اللون أما لوجود الصبغات في الجلد في الخلايا الخارجية فقط وفي هذه الحالة يكون اللحم غير ملون أو توجد الصبغات في الطبقات الداخلية للجلد والملاصقة للحم ويكون اللحم ملون نسبياً .

### جمع العناقيد:

تصلح العناقيد للجمع عندما تتوفر علامات إكتمال النمو التالية :

- ١ . تغير لون عنق العنقود من أصفر إلى البني الفاتح وجفافه بعض الشيء .
- ٢ . تغير لون عنق العنقود فألأصناف الخضراء تزداد إصفراراً والأصناف الحمراء والسوداء تدكن وتزداد لمعانا .
- ٣ . سهولة انفصال الحبات عن حامل العنقود .
- ٤ . مذاق بعض حبات طرف العنقود .
- ٥ . انفصال البذور عن اللب .
- ٦ . تحول لون قصره البذرة إلى اللون البني .

وتجمع العناقيد بإحتراس بواسطة مقص خاص ، ويتم قص عنق العنقود  
قرب إتصاله بالفرع ثم يتم إزالة كل أجزاء العنقود المجروحة والتالفة والمصابة  
وعادة ما يتم تعبئة العنب في الحقل بعد الجمع مباشرة في عبوات من الكرتون سعة ٥  
: ٥ كيلو أو عبوات المستهلك سعة كيلو جرام واحد .

## زراعة المانجو (المانجا)



تعتبر المانجو ملكة ثمار الفواكة المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية ، وثمره  
المانجو ذات قيمة غذائية عالية فهي غنية بالعناصر الغذائية وهي تحتوى على فيتامين  
أ ، ج والبروتينات ، الدهون ، أحماض ، والستريك والكاروتين .

### التربة المناسبة:

تنجح زراعة المانجو على مدى واسع من أنواع التربة فأنسب الأراضي  
لزراعتها الصفراء الخفيفة أو الطميية العميقة جيدة الصرف ذات مستوى ماء أرضي  
لا يقل عن ١.٥ م معتدلة الحموضة أو ذات رقم pH متعادل وكذلك الأراضي  
الرملية الخفيفة الفقيرة الخصوبة (صفات المحصول في الأراضي الرملية تكون

أفضل) والأراضي البركانية والأراضي التي ترتفع بها نسبة الجير وذات مستوى الماء الأرضي المرتفع لحد ما وتنجح في مدى واسع من درجة pH التربة من الأراضي الحامضية (4.5 - 7) pH إلى الأراضي القاعدية (5.8 - 7) pH كذلك تنجح في الأراضي التي بها حصى دقيق (حصوية) والذي يعمل على زيادة التهوية في التربة ومثل هذه الأراضي لا تحتفظ بمياه الري .

ولذلك يجب توسيع جورة الزراعة وتعميقها لتصل إلى  $1 \times 1 \times 1$  م مع إضافة السماد العضوي والطيني وذلك لتقليل فقد الماء ، أما الأراضي الطينية الثقيلة فتعتبر غير ملائمة لزراعة المانجو نظراً لاحتفاظها بكميات كبيرة من الرطوبة ودقة حبيباتها وشدة التصاقها ببعض مما يعيق أو يقلل من انتشار الجذور كذلك تشقق التربة عند الجفاف مما يؤدي إلى تقطيع الجذور مما يؤثر على نمو الأشجار خاصة في سنوات عمرها الأولى .

أما الأراضي الملحية والطفيلية فلا تصلح لزراعة المانجو إلا عن طريق إزالة تراب الجورة تماماً والتي تكون بأبعاد  $1 \times 1 \times 1$  م وملؤها بتراب جديد نظيف مع خلطه بالأسمدة العضوية المتحللة وإجراء الخدمة السنوية لإضافة السماد العضوي عن طريق خندق حول الشجرة مع محيط المسقط الرأسي للأفرع بعرض ٤٠ سم وبعمق ٥٠ - ٦٠ سم وبذلك يتم تغيير جزء من التربة سنوياً يتمشى مع نمو الشجرة ونفس أسلوب الخدمة يتبع في حالة الأراضي الحصوية والأراضي الرملية الناعمة ويجب ألا تتعدى نسبة الملوحة في محلول التربة أكثر من ١٥ جزء في المليون

حتى تعطى إنتاج تجاري جيد وقد تنجح زراعة المانجو في أراضي تزيد نسبة الأملاح بها عن هذا الحد (خاصة في الأشجار البذرية) ولكنها لا تعطى محصول تجاري وتدهور إنتاجية الأشجار بتقدمها في العمر .

### **مستوى الماء الأرضي:**

ويجب ألا يقل مستوى الماء الأرضي عن ١.٥ م وعدم وجود طبقات صماء قريبة من سطح التربة حيث تعمل هذه الطبقات على إعاقة نمو وانتشار الجذور وتراكم مياه الري الزائدة حتى تصل إلى مستوى الجذور فيؤدي إلى إصابتها بالعفن وموتها في النهاية وموت النباتات وكذلك تؤدي إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه المحيطة بالجذور .

وفي حالة تواجد هذه الطبقة الصماء يجب تفتيتها ويمكن علاجها في الأراضي التي تم زراعتها فعلاً باستخدام محراث تحت التربة على أن تحرث الأرض مرتين متعامدين ويكرر سنوياً حتى تمام التأكد من تكسيرها مما يزيد من تهوية التربة والمساعدة على صرف المياه المتراكمة وبالتالي تحسين نمو وانتشار الجذور وفي جميع الأحوال يجب عند إنشاء المزارع إنشاء مصارف فرعية ورئيسية حتى لا تحدث مشاكل بسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضي .

### **الظروف المناخية:**

تزرع المانجو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية خط عرض ٦ ، ٣٥ شمالاً وجنوباً وفي المناطق الدافئة إلى الشبه الاستوائية مثل مصر والمناطق المثل

لإنتاج المانجو هي المناطق التي يكون فيها المناخ بارد أو جاف أو بارد وجاف قبل التزهير (وقت التحول والتكشف الزهري للبرعم) ومتبوعاً بوفرة رطوبة التربة ودرجة حرارة متوسطة الدفء (٣٠ - ٣٥ م) - ووجد أن انخفاض درجة الحرارة في المناطق شبه الاستوائية (١٢ م) خلال فترة التزهير عادة ما تحد أو تقلل الإنتاج عن طريق تقليل نمو اللقاح ودرجة حرارة بداية النمو في المانجو ٩٥ ف (٣٥ م) والثابت الحراري للمانجو ١٥ وحدة حرارية ، كما أن سقوط الأمطار أثناء إزهار الأشجار يعوق عملية التلقيح بواسطة الحشرات التي لا تنشط أثناء المطر والرياح الشديدة كما أن المطر يزيل حبوب اللقاح من مياسم الأزهار فلا تتم عملية الإخصاب ويقل المحصول فضلاً عن ذلك فإن الأمراض الفطرية وبخاصة مرض البياض الدقيقي يكثر ظهوره بعد المطر ويسبب أضراراً كبيرة .

### درجة الحرارة:

تعد الحرارة أحد المتغيرات ذات التأثير الواضح على كفاءة عملية البناء الضوئي بالنبات - فهناك تداخل جوهري بين درجة حرارة الهواء والتربة وصافي عملية البناء الضوئي - فقد لوحظ أنه عندما تثبت درجة حرارة التربة عند ٦ م إزداد ناتج عملية البناء الضوئي وكذلك كفاءة الثغور على الإمتصاص وعندما إنخفضت درجة حرارة التربة إلى ١٢ م نقص ناتج عملية التخليق الضوئي وإنخفضت كفاءة الثغور على الإمتصاص عند نفس درجة حرارة النهار والليل .

وعندما تتعرض الأشجار لإنخفاض في درجة الحرارة أو لدرجات الصقيع (أقل من ١٠°م) يكون نتيجة ذلك تثبيط عملية البناء الضوئي وعمليات الأيض المختلفة وتصفّر الأوراق عقب موجة الصقيع هذه (أكسدة ضوئية للكلوروفيل) وذلك لأن إنخفاض درجات الحرارة عن 10°م يقلل من التشبع الضوئي الخاص بعملية البناء الضوئي .

### الرطوبة الجوية والأمطار:

تنمو أشجار المانجو نمواً جيداً عند توفر الرطوبة الجوية والأرضية ، وتوفر الرطوبة الجوية يمنع أو يقلل احتراق الأوراق نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ويمنع حدوث عدم التوازن المائي للأشجار إلا أن زيادة الرطوبة الجوية لفترة طويلة خاصة أثناء التزهير يؤدي إلى تلف الأزهار وإصابتها بالأمراض المختلفة وخاصة مرض البياض الدقيقي كذلك فإن سقوط الأمطار خلال فترة التزهير يعمل على غسيل حبوب اللقاح علاوة على قلة نشاط الحشرات الملقحة مما ينعكس أثره على قلة كمية المحصول ولذلك يلزم لشجرة المانجو جو حار تسوده فترة الجفاف خصوصاً أثناء تكشف البراعم الزهرية وأثناء التزهير ونضج الثمار للحصول على نمو وإثمار جيد .

### الرياح:

تؤثر الرياح تأثيراً سيئاً على أشجار المانجو وهذا الضرر إما أن يكون ميكانيكي يتمثل في كسر الفروع الثانوية الرئيسية أو اقتلاع الأشجار من جذورها

وتساقط الأزهار والثمار وتشوه الثمار نتيجة اصطدامها بالأفرع أو ضرر فسيولوجي خاصة إذا كانت الرياح جافة ومحملة بالرمال حيث تسبب جفاف فسيولوجي للأشجار نظراً لتقطيع الجذور وعدم قدرتها على امتصاص المياه بالإضافة إلى زيادة عملية التنح عن الامتصاص ويزداد الضرر الفسيولوجي إذا كانت التربة غير مروية .

وتظهر هذه الأضرار في صورة ذبول وجفاف النموات الحديثة وتساقط الثمار الصغيرة وتشوه الثمار بفعل حبيبات الرمال المحملة بها الرياح وجفاف حواف الأوراق وتلونها باللون البرونزي .

لذا ينصح بالاهتمام بزراعة مصدات الرياح حول المزرعة قبل الزراعة لتوفير الحماية من أضرار الرياح .

### الضوء:



تأثير اختلاف كمية الضوء على الأشجار

معروف أهمية الضوء بالنسبة للأشجار حيث أنه أساس إتمام عملية التمثيل أو البناء الضوئي والتي يكون ناتجها تكوين المواد الغذائية التي تحتاجها الأشجار

للنمو وللمحصول وبذلك يكون للضوء تأثير مباشر على النمو والمحصول للأشجار - وعلى قدر كمية الضوء الساقطة والتي تتلقاها الأوراق يكون الناتج النهائي من عملية البناء - وكمية الضوء عبارة عن محصلة تشمل مسافات الزراعة - كثافة قمة الشجرة - طريقة التربة - حيث وجد أن شجرة المانجو (الأوراق) تحتاج إلى ٥٤٪ من ضوء الشمس حتى يمكنها القيام بعملية البناء الضوئي .

وأوراق المانجو تختلف كفاءتها حسب العمر فالورقة عمرها من ٤ - ٥ سنوات تبدأ في النشاط بمجرد تلونها باللون الأخضر المميز للصنف (بعد شهرين تقريبا) ثم يزداد النشاط حتى يصل إلى قمته ثم يقل النشاط أو يتضاءل بتقدم عمر الورقة في السن .

وحيث أن النمو الخضري يحدث في دورات مما يؤدي إلى وجود مجموع خضري للشجرة يحمل أوراق متباينة الأعمار مع وجود الغالبية العظمى من الأوراق التي تعدى عمرها العام الواحد - ومع وجود كثافة للنمو في قمة الشجرة ذات أوراق داخلية (الأكبر عمرا) تتلقى مستويات منخفضة من الضوء نتيجة تظليل الأوراق على بعضها ، فقد وجد أن نسبة الأوراق المظللة أعلى كثيرا من المعرضة للضوء وهذا يجعل أقصى معدل للتخليق الضوئي خلال الصيف في الأوراق المعرضة يصل إلى ١٥٪ مقارنة بالأوراق الكاملة التعريض ولذلك أصبح ضروريا إختيار نظام تقليم يسمح بتلقي الأوراق للضوء بنسبة تزيد عن ١٥٪ لأن

ذلك سيرفع كفاءة المجموع الخضري (الأوراق) على القيام بعملية البناء الضوئي والذي سينعكس أثره في زيادة المحصول .

فقد وجد أن الأفرع الغير معرضة لضوء الشمس والمظللة يندر تكوين أزهار عليها وبالتالي عدم قدرتها على حمل ثمار كذلك يقل معدل نمو الأوراق النامية في الظل عن النامية في ضوء الشمس - وقلة الإضاءة تؤدي إلى ضعف تكوين الأشجار وإتجاهها للنمو إلى أعلى مع عدم تكوين نمو خضري جيد وعند سيادة الظل تتكون الأفرع الباحثة عن الضوء العارية من الأوراق والتي يندر أن تثمر ويؤدي ذلك إلى إرتفاع الرطوبة النسبية حول الأشجار وبالتالي إنتشار الأمراض الفطرية والأشنة ومن ذلك يتضح أهمية زراعة الأشجار على مسافات غرس منتظمة تسمح بتعرض الأشجار لإضاءة مناسبة ونظرا لما ذكر من أهمية الضوء يراعى في عملية التربية والتقليم فتح قلب الشجرة وتعريض الأفرع لإضاءة كافية تسمح بإثمار جيد وتلوين للثمار مما يزيد من القيمة التسويقية للثمار حيث أن تعريض الثمار للضوء يؤدي إلى تكوين صبغة الأنثوسيانين (المسئولة عن اللون الأحمر) التي تتكون عند تعرض الأنسجة للضوء .

إلا أن تعرض الثمار لأشعة الشمس المباشرة الشديدة خاصة عند ارتفاع درجة الحرارة في الصيف قد يؤدي إلى لسعة الشمس التي تظهر في صورة بقع بنية كبيرة منخفضة وتؤدي في النهاية إلى تساقط الثمار أو انخفاض قيمتها التسويقية خاصة تلك المعرضة للجهة القبليّة من الشجرة وتعرض الأشجار للحرارة المرتفعة

مع جفاف الجو وخاصة في أشهر الصيف مما يؤدي إلى إصابة سوق الأشجار وفروعها الرئيسية المعرضة لها بتشقق في القلف بسبب ضعفها وللأشجار بوجه عام ويظهر أثر الحرارة الشديدة في فروع الأشجار فتجف بعض الأوراق وتموت بعض البراعم الطرفية منها .

### **الجفاف والعطش:**

تعتبر المانجو من الفواكه التي تتحمل أشجارها الجفاف ويمكن أن تحيا بدون أمطار أو مياه ري لمدة ثمانية أشهر أو أكثر إلا أن نقص الرطوبة الأرضية خلال مرحلة الإثمار يحدث تأثيرات شديدة على بقاء الثمار في المراحل الأولى من تطورها فيؤدي إلى تساقطها وتعتبر فترة ٤ - ٦ أسابيع التي تعقب عقد الثمار فترة حرجة من تطور الثمرة حيث يحدث خلالها الإنقسام الخلوي بسرعة كما يتم فيها تطور جدار الخلية فيحدث فيها زيادة في حجم الثمرة وتجدد الملاحظة أن أي نقص ولو طفيف في الحالة المائية للشجرة خلال تلك الفترة قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات عكسية على نمو الثمرة وبقائها على الشجرة .

أما بالنسبة لمستوى الماء الأرضي فإن شجرة المانجو من أكثر الأشجار التي يمكن أن تنمو في الأراضي الغير عميقة والغير منفذة للماء أو القريبة من مستوى الماء الأرضي .

وقد تتأذى الأشجار الصغيرة بعض الشيء في السنين الأولى من زراعتها في مثل تلك الأراضي في حين لا تتأذى الأشجار الكبيرة وأنسب ما يكون مستوى الماء

الأرضي على عمق 2 - 1.5 متر من سطح التربة - وإتضح أن جذور المانجو تنمو في مستوى الماء الأرضي العالي وأن الأشجار لا تتأذى بذلك خصوصاً إذا كانت تلك الأراضي مسامية حسنة التهوية أما إذا زادت الرطوبة عن الحد المناسب أو كان مستوى الماء الأرضي مرتفعاً والأرض خالية من المصارف غير مهواه فإن نسبة كبيرة من الجذور الماصة تموت فتضعف الأشجار ويقل المحصول تبعاً لذلك أو ينعدم .

ووجد أن أشجار المانجو تتحمل غمرها بالمياه مدة طويلة لمدة شهرين ثم تستعيد حيويتها .

### **إنشاء بستان المانجو :**

يتوقف نجاح إنشاء بستان المانجو على عدة عوامل أهمها:

- صلاحية التربة للزراعة وخلوها من الأملاح الضارة .

- صلاحية المياه لري أشجار المانجو .

- توافر نظام الصرف .

تحرث الأرض مرتين في الأراضي الرملية وثلاث في الأراضي الثقيلة بحيث يكون الحرث عميقاً ومتعامداً ليساعد على سهولة نمو الجذور وتعمقها في التربة ، كذلك التأكد من عدم وجود طبقة صماء تحت التربة وتزحف الأرض وتسوى إذا كانت ستروى بالغمر أو تترك بطبيعتها دون تسوية في حالة الري بالتنقيط بعد ذلك يتم تقسيم الأرض إلى مساحات صغيرة كل منها ٤ - ٥ دنم حتى يسهل إجراء عمليات الخدمة والعمليات الزراعية الأخرى - كما يتم عمل طرق بين هذه

المساحات ويفضل ألا يقل عرض الطريق عن ٤ متر وألا يزيد البعد بين الطرق المتوازية عن ٦ متر لكي تزرع مصدات الرياح على حافتها وخاصة في الجهة الغربية والبحرية ويراعى أن تكون الطرق متعامدة وتشق المصارف حول كل قطعة بجوار الطرق الرئيسية وبطول صفوف مصدات الرياح مع مراعاة ألا يقل عمق المصرف عند نقطة بدايته عن ٦٠ سم ويمكن الاستعاضة عن المصارف المكشوفة بالمصارف المغطاة وذلك لتلافي الفقد في مساحة الأرض .

ويغرس حول كل قسم مصدات في المناطق شديدة الرياح بحيث يكون بينه وبين الخط الأول ٢ متر ويكون البعد بين الأشجار متر بالتبادل (رجل غراب) وذلك لوقاية أشجار المانجو من العوامل الجوية الضارة مثل الرياح الشديدة والبرد والصقيع شتاءً والحرارة الساخنة صيفاً مما يضر النباتات ولاسيما الصغيرة منها ويراعى أن تتم الزراعة قبل زراعة أشجار المانجو بفترة كافية ٦ شهور إلى سنة وإذا كانت الأرض بها نسبة جير عالية وبها ملوحة متوسطة يزرع السرو والتوكسوديم ويمكن زراعة الكايا أو الماهوجنى (ذات عائد اقتصادى مرتفع جداً).

### **مسافات الزراعة:**

بعد حرث الأرض التي سيتم زراعتها بأشجار المانجو حرثاً جيداً ترحف حتى يتم تسوية سطحها لضمان انتظام عملية الري ، ثم يتم بعد ذلك تعيين المسافة بين الأشجار وتختلف المسافة بين الأشجار تبعاً لعدد من العوامل هي :

١ - فإذا كانت رملية أو صفراء خفيفة تزرع الأشجار على مسافات أقل عما إذا كانت الأشجار المنزرعة في أرض صفراء غنية في مواردها الغذائية لأن الأشجار في الحالة الثانية تكون أكثر نمواً وأكبر حجماً.

٢ - الصنف : هناك بعض أصناف المانجو أشجارها ذات حجم كبير مثل أشجار الصنف بايري وزبدة وهذه تزرع على مسافات أبعد عن الأشجار الأقل في قوة نموها .

٣ - طريقة الإكثار : ما إذا كانت الأشجار المزروعة بذرية أو مطعومة فالأشجار البذرية أقوى في النمو وذات حجم أكبر من الأشجار المطعومة ، وعلى ذلك ففي الحالة البذرية تزرع الأشجار على مسافة أكبر من الأشجار المطعومة .

٤ - طريقة الري : ففي حالة الري بالغمر تزرع الأشجار على مسافات أكبر من الري بالتنقيط وذلك لكبر حجم الأشجار الأولى وصغرها في الثانية .

### **مسافات الزراعة:**

أما باقي الأراضي التي تروى بنظام الري بالتنقيط فيمكن أن تقل مسافات الزراعة بمقدار متر عن المسافة السابقة ، وقد وجد أن الزراعة الكثيفة على مسافة غرس  $5 \times 5$  م بالطريقة المربعة في الأراضي الرملية تحت نظام الري بالتنقيط أعطى نتائج جيدة مع إتباع أسلوب التربية والتقليم المناسب للمحافظة على حجم الشجرة بما يتناسب مع مسافة الزراعة - الشجرة بهذه الطريقة تعطى إثمار في جميع الاتجاهات ويصلها الضوء من جميع الاتجاهات .

وحديثاً يتم اتباع نظام الزراعة الكثيفة وبالطريقة المستطيلة حيث وجد أن الأشجار بهذه الطريقة تكون أقل تزامناً عن الطريقة المربعة والتي تؤدي إلى تلاحم النباتات وملء المسافة بين النباتات وبالتالي نقص الضوء وقلة التهوية وفي هذه الطريقة تقل المسافة بين الأشجار وتزداد بين الخطوط فيمكن أن تزرع الأشجار على مسافات  $3 \times 5$  أو  $4 \times 5$  أو  $3 \times 6$  أو  $4 \times 6$  م وقد تقل عن ذلك .

حيث تصبح الأشجار في صورة سياج ويراعى فيها ما يلي :

أن يكون اتجاه الخطوط من الشمال للجنوب حيث يسمح باقتسام كل من الجهتين الشرقية والغربية في وقت سطوع الشمس بينما في اتجاه من الشرق إلى الغرب ستركز الإضاءة معظم اليوم على الجهة الشمالية .

أن يكون اتجاه الصفوف من الشرق للغرب (المسافة واسعة) .

تربى الأشجار بالطريقة الهرمية حيث يؤدي ذلك إلى تحلل الضوء إلى جميع أجزاء الشجرة بينما اتساع حجم الأشجار مع كثافة قممها يؤدي إلى وجود قلب فارغ من الأوراق نظراً لعدم تعرض قلب الشجرة للضوء الذي يؤدي إلى حدوث موت للأفرع .

تربى الأشجار بحيث لا يزيد ارتفاعها عن ٥ ٪ من المسافة بين الأشجار وزيادة ارتفاع الشجرة عن هذه النسبة يؤدي إلى تظليل الجزء القاعدي للشجرة المجاورة .

ضبط المسافة بين الأشجار مع التربية (عن طريق التقليم) مع تكوين مجموع خضري جيد يحمل ثمار جيدة التلوين جيدة الصفات ويسهل من إجراء عمليات الخدمة والحصاد وتقليل الفاقد من الثمار وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج ، مع مراعاة عدم ترك الأشجار لتشغل المسافة بينها وبين بعضها لأن ذلك يؤدي إلى تقليل المحصول بنسبة ٤٠ ٪ على اعتبار أن (نظام السياج) ذلك يحرم الشجرة من الحمل في اتجاهين ويصبح حملها في ٣ اتجاهات فقط .

### **الملوحة:**

يؤدي إجهاد الملوحة زيادتها على أشجار المانجو إلى وجود أعراض تتمثل الأعراض الطفيفة لسمية الكلوريد في إحتراق قمة الورقة وإلتفاف حوافها - إلا أنه عند زيادة السمية يتوقف النمو وتسقط الأوراق وتموت الشجرة وفي حالة تعرض الأشجار لمستويات مرتفعة من الصوديوم تظهر على الأوراق مساحات أو بقع ميتة .

### **مواعيد الزراعة:**

أنسب ميعاد لزراعة البستان هو مارس وأبريل أي عند فصل النمو ويحسن التبكير عن في المناطق المعتدلة كما يمكن الزراعة خلال شهر سبتمبر مع توفير الحماية الكافية للشتلات من برودة الشتاء .

### **حفر الجور:**

يتم تعيين مواقع حفر الجور وتحفر بأبعاد ١ × ١ × ١ م في الأراضي الرملية أو الثقيلة أو في حالة وجود مشاكل في التربة ويتطلب ذلك تغيير تربة الجورة وترك

الجور بعد الحفر معرضة للشمس من (٢ - ٤ أسابيع) ثم يخلط التراب الناتج من الطبقة السطحية خلطاً جيداً بالسماذ البلدي القديم المتحلل حوالي ٤ - ٦ مقاطف أو السماذ العضوي المعامل أو جزء من الطمي وذلك لتغيير قوام التربة الرملية المفككة + ١ كجم سلفات نشادر + ١/٢ كجم سلفات بوتاسيوم + ١ ك كبريت زراعي + ١ - ٢ ك سوبر فوسفات ثم يعاد التراب المخلوط إلى الجورة مرة ثانية مع ترك مسافة ٣٠ سم العلوية بدون ردم وتروى الجورة مرة أو مرتين قبل الزراعة ثم تروى بعد جفافها جفافاً مناسباً .

### **خدمة بستان المانجو:**

#### **تربية الأشجار:**

بعد زراعة الشتلات في المكان المستديم توالى بعمليات الري والتسميد بالمقننات السماذية والمائية والتي تعمل على تشجيع النمو ويجب مراعاة أهمية تربية شجرة المانجو وهي في مرحلة الشتلة الصغيرة حيث يسهل تشكيلها وبالتالي يتم الحصول على شجرة ذات مواصفات جيدة تعطى إثراً جيداً كمّاً ونوعاً ويجب عند تربية الشجرة مراعاة مايلي :

عدم ارتفاع بداية التفريع عن ٥٠ - ٦٠ سم وإذا زاد ارتفاع الساق الرئيسي بدون تفريع عن هذه المسافة فيتم تطويع الساق الرئيسي على هذه المسافة أو إزالة الجزء الزائد ويتم ذلك فوق عقدة مباشرة أو تحتها ، مما يشجع خروج نموات أسفل منطقة التطويع أو القطع .

يتم اختيار ٢ - ٣ أفرع قوية موزعة بقدر الإمكان على طول الساق وهذا يكون في حالة إجراء القطع أسفل العقد مباشرة أما إذا كان القطع فوق العقد مباشرة فتخرج الأفرع من أسفل العقد مباشرة ثم يزال الزائد من الأفرع .

تترك هذه الأفرع (الرئيسية) للنمو فإذا حدث لها تفرع على مسافة ٤٠ - ٦٠ سم تترك على حالها مع إزالة جميع النموات التي تكون موجودة على الفروع من الداخل وذلك لفتح قلب الشجرة وعدم وجود نموات تقفل قلب الشجرة وتمنع دخول الضوء ، أما إذا لم تتفرع هذه الأفرع الرئيسية واستمرت في النمو لمسافة أكبر من ذلك فيعمل على إجبارها على التفرع وذلك بإجراء التطويز أو قطع الجزء الزائد مما يؤدي إلى حدوث التفرع وخروج نموات جديدة يزال منها الموجود داخل الشجرة ثم تترك الشجرة تنمو طبيعياً بعد ذلك إلا إذا حدث نمو شارد أو غير طبيعي يؤدي إلى إعاقه وصول ضوء الشمس أو يمنع حركة الهواء فيتم إزالته ، ويجب مراعاة الرش بأوكسى كلورو النحاس عقب أي تقليم وذلك لتطهير الجروح الناتجة من إجراء التقليم وذلك بتركيز ٤٠٠ جم / ٦ لتر ماء .

### **العزيق:**

يجب الاهتمام بإجراء عملية العزيق حيث تؤدي إلى تهوية التربة والتخلص من كثير من مسببات المرضية ويجب مراعاة عدم تثبيت عمق العزيق حتى لا تتكون طبقة مندمجة غير منفذة (صماء).

يجب العناية بإجراء عملية العزيق جيداً حيث أن الأشجار تكون صغيرة والأرض مكشوفة وتروى على فترات متقاربة ولذلك يجب أن يكون العزيق سطحياً حتى لا تتعرض الشعيرات الجذرية للتقطع لأن الجذور لم تتعمق في التربة بعد .

ويجب التركيز على إزالة الحشائش وخاصة النجيليات حيث تمتد إلى أسفل التربة وتنافس جذور الأشجار والغذاء والماء علاوة على إعاقتها في الانتشار- وإذا كانت منطقة الجذور لا يظلها حجر الشجرة وخاصة في المناطق الصحراوية فلا بأس من ترك بعض الحشائش ذات الأوراق العريضة وذلك لتقليل التأثير الحراري للشمس على جذور الأشجار وذلك حتى تظل أفرع الأشجار منطقة انتشار الجذور وقد وجد أن تغطية منطقة أسفل الشجرة بقش الأرض يعطى نتائج جيدة في حفظ الرطوبة والتقليل أو منع نمو الحشائش

مقاومة الحشائش باستخدام المبيدات:

ويمكن الاستعاضة عن إجراء العزيق وذلك باستخدام مبيدات الحشائش وذلك على حسب نوع الحشائش السائدة في البستان على النحو التالي :

أ- في حالة الحشائش الحولية السائدة يستعمل الجرامكسون بمعدل ١ لتر /

٥٠ لتر ماء وذلك من ٢ - ٣ مرات بفواصل شهرين بين الرش والآخرى

أو يستعمل الباستا بمعدل ٤ لتر / ٥٠ لتر ماء لكل دنم بفواصل ١ - ٢

شهر بين الرش والآخرى .

ب - في حالة الحشائش المعمرة (نجيل - سعد - حلفا - حجنة - عليق) يتم رش البقع الموبوءة بهذه الحشائش فقط بالراوند أب أو لانسر بمعدل ٥ سم<sup>٣</sup> مييد + ١٠ جم سلفات نشادر + ٠.٥ سم<sup>٣</sup> زيت طعام لكل لتر ماء وذلك ١ - ٢ مرة أما في حالة إذا كانت الأرض كلها موبوءة بالحشائش المعمرة السابق ذكرها يرش البستان بالراوند أب أو اللانسر بمعدل ٤ لتر مييد + ٢ كجم سلفات نشادر + ٦ سم<sup>٣</sup> زيت طعام لكل ٥٠ لتر ماء / دنم .

### التسميد:

تقل الإحتياجات السمادية لأشجار المانجو بدرجة ملموسة عن إحتياجات أشجار الفاكهة الأخرى ، والمبالغة في الإضافات السمادية للأشجار صغيرة السن تؤدي إلى تأخر وصولها إلى عمر الإنتاج الاقتصادي الذي يميز الصنف ولقد لوحظ أن الإسراف أو المبالغة في الإضافات السمادية وبخاصة الأزوت للأشجار البالغة يؤدي إلى اتجاه الأشجار إلى إعطاء نمو خضري كثيف على حساب المحصول . وكما أن الإسراف في التسميد الأزوتي يدفع أشجار المانجو للنمو الخضري فإنه يمكن دفع الأشجار لإعطاء محصول منتظم عن طريق اتباع برنامج تسميدي مناسب ويجب أن نفهم العلاقة بين النمو الخضري والزهري في المانجو حتى يمكن أن نضع برنامج التسميد المناسب للأشجار ، وهناك اعتقاد سائد بأن إيقاف النمو

الخضري مبكراً في الخريف نتيجة عدم التسميد أو العطش أو انخفاض درجة الحرارة يشجع على تكوين تزهير جيد في الموسم التالي .

وتستجيب أشجار المانجو في العديد من مناطق زراعتها للتسميد ويظهر ذلك في شكل زيادة معدل النمو الخضري ويكون ذلك بصفة خاصة بالنسبة لعنصر الآزوت ، أما بالنسبة لتأثير التسميد على المحصول فإن هناك عوامل أخرى تتداخل مع التسميد في تأثيرها على زيادة المحصول مثل عوامل المناخ والتي يكون لها تأثير كبير على الأزهار والإثمار في أشجار المانجو مما يجعل من الصعب فصل تأثير التسميد عن بقية العوامل الأخرى .

### النتروجين:

يعتبر من أكثر العناصر تأثيراً على النمو والمحصول في أشجار المانجو وهو يستخدم بكميات كبيرة بواسطة الأشجار وهو أيضاً الأكثر فقداً من التربة بفعل الغسيل مع ماء الصرف ، وقد وجد أن النسبة العالية للمركبات الكربوهيدراتية إلى المكونات الآزوتية (C/NRatio) في وقت تكشف البراعم الزهرية وغيرها ترتبط ارتباطاً وثيقاً لظروف الإثمار في أشجار المانجو . كما وجد أن الكشف ونمو الأفرع الجديدة يعتمدان أساساً على ظروف توفر النتروجين والمدد الرطوبي وذلك لدخول الآزوت في تكوين الأحماض الأمينية والتي لها دور بتكشف البراعم الزهرية - كما أن تبادل الحمل يتأثر بالحالة الغذائية للشجرة وخاصة عنصر الآزوت وتقدر الإحتياجات من الآزوت للشجرة في السنة من 1.5 - 0.5 كجم .

ووجد أن الإفراط في الآزوت له تأثير سيئ على مواصفات الثمار حيث يزيد من التحلل الداخلي للثمار وضعف في تكوين الثمار - كما أنه يؤدي إلى زيادة ملحوظة في النمو الخضري وتأخير نضج الأفرع ووصولها إلى مرحلة الإثمار ومن مصادر النتروجين اليوريا - نترات البوتاسيوم - نترات الكالسيوم - سلفات النشادر ونوع الأسمدة المضافة تتحدد على أساس نوع التربة وسعتها التبادلية وعموماً أملاح النشادر تزيد من حموضة التربة أما أملاح النترات تعمل على الاتجاه نحو القاعدية .

وتتعدد المصادر السمادية لعنصر النتروجين وتختلف عن بعضها في درجة الذوبان في الماء - وعلى ذلك يمكن بصفة عامة تقسيم المصادر السمادية إلى مجموعتين كما يلي :

أسمدة سهلة الذوبان في الماء وتلائم لإضافة النتروجين خلال مياه الري .

أسمدة صعبة الذوبان في الماء ولا تلائم الإضافة خلال مياه الري .

أسمدة سهلة الذوبان في الماء :

حامض النتريك ١٥ ٪ ( ٪ ن = ١٣.٣ ) .

اليوريا ( ٪ ن = ٤٦.٠ ) .

نترات النشادر ( ٪ ن = ٣٣.٠ ) .

نترات الكالسيوم ( ٪ ن = ١٧.١ ) .

نترات البوتاسيوم ( ٪ ن = ١٣.٧ ) .

سلفات النشادر النقي (% ن = ٥.٦).

أسمدة صعبة الذوبان في الماء :

سلفات النشادر (% ن = ٥.٢).

نترات الجير المصري (% ن = ٤.٥).

نترات النشادر الجيرية (% ن = ٣١.٠).

وفيما يلي بعض العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام هذه

المصادر السمادية :

عادة لا يتسبب عن حقن الأسمدة النتروجينية في تيار مياه الري أية مشاكل .  
وتتميز الصور النتراتية واليوريا بسهولة حركتها في التربة مع حركة المياه وبالتالي  
يجب مراعاة أنها قابلة للفقد بسهولة بالغسيل عند زيادة معدلات الري . أما الصورة  
الأمونيومية مثل سلفات النشادر فهي أقل قابلية للحركة في التربة نتيجة لتحويلها  
إلى الصورة المتبادلة وقد تفقد بالتطاير في الأراضي الغنية بالجير (بكربونات  
الكالسيوم) أو ذات رقم الحموضة المرتفع أو عند انخفاض مستوى الرطوبة بالتربة  
، ويمكن التقليل من تطاير الأمونيا عند إضافتها مع الأسمدة العضوية وعدم  
إضافتها تحت نظم الري بالغمر خاصة في الأراضي الخفيفة القوام بالمقارنة بإضافتها  
تحت نظم الري الحديثة .

يستخدم حامض النيتريك كمصدر للتسميد النتروجيني بالإضافة إلى تأثيره

على خفض درجة حموضة مياه الري رقم pH مما يساعد على تقليل فرصة ترسيب

الأملح في شبكة الري وبالتالي منع انسداد فتحات الري سواء في نظام الري بالتنقيط أو الرش - كذلك فإن الري بمياه محمضة يؤدي إلى خفض مؤقت في درجة حموضة محلول التربة مما يؤدي إلى زيادة درجة تيسر العناصر الغذائية في بيئة النبات .

تعتبر أسمدة اليوريا ونترات النشادر من أكثر مصادر التسميد النتروجيني استخداماً للإضافة من خلال مياه الري لما تتميز به هذه المركبات من درجة ذوبان عالية .

لا يفضل استخدام أسمدة سلفات النشادر أو نترات الجير المصري أو نترات النشادر الجيري للإضافة خلال مياه الري لبطئ أو صعوبة ذوبانها في الماء نتيجة احتواء هذه الأسمدة على قدر غير قليل من الشوائب صعبة الذوبان في الماء مثل الجير والأترية ، أما سلفات النشادر النقية أو ما يطلق عليها المستورد فيمكن إضافته من خلال مياه الري ، وعموماً فإنه يفضل استخدام سلفات النشادر للإضافة إلى التربة مع الأسمدة العضوية خلال الخدمة الشتوية أو أثناء عمليات التجهيز للزراعات الجديدة حيث تساعد على الإسراع من تحلل الأسمدة العضوية .

### **الفوسفور:**

يستخدم بسهولة بكميات أقل من النتروجين والبوتاسيوم ، والفوسفور لا يفقد من التربة بسهولة وكمية الفوسفور تقدر بربع كمية النتروجين ويضاف مرة أو اثنين في العام ويفضل إضافته مع السماد العضوي ومن أعراض نقص الفوسفور يكون إنتشار اللون الأخضر على الأوراق الجديدة بطئ ولذلك نجد الورقة مبرقشة الألوان وذات بريق ولمعان منخفض والأوراق المسنة يتغير لونها إلى اللون البرونزي

ويقل حجم الأوراق عن حجمها الطبيعي وقد يحدث لها تساقط أما على المحصول فيؤدي نقصه إلى إنخفاض المحصول وزيادة التساقط وإرتفاع الحموضة في الثمار بدرجة كبيرة وزيادة سمك القشرة وغالبا مايكون مركز الثمرة لين أو عصيري أما على الجذور وخاصة في الأشجار الصغيرة يؤدي إلى بطئ وإنتشار الجذور .

أما زيادة إضافة الفوسفور يؤدي إلى زيادة تراكمه في التربة بكميات كبيرة مما يؤدي إلى خفض عنصر الزنك والنحاس المتاحة للنبات ويظهر ذلك بصفة خاصة في الأراضي الرملية الخفيفة ويضاف الفوسفور مع التسميد العضوي والكبريت لتسهيل الامتصاص ويعتبر سهاد السوبر فوسفات .

(الأحادي - الثنائي - الثلاثي) الأكثر شيوعاً كمصدر للفوسفور ، يوصى بإضافة الفوسفور كحامض فوسفوريك فيما عدا الأراضي الحامضية التي يقل فيها pH عن ٦ .

### الأسمدة الفوسفاتية :

هناك العديد من مصادر الأسمدة الفوسفاتية التي يمكن استخدام البعض منها للإضافة من خلال مياه الري وتحدد مدى صلاحية أي من هذه المصادر للإضافة من خلال مياه الري على حسب درجة وسهولة الذوبان في الماء . وتنقسم الأسمدة الفوسفاتية إلى أسمدة سهلة الذوبان في الماء مثل حمض الفوسفوريك ٥ ٪ والذي يحتوى على ٥٧.٩ فو ٢ - وأسمدة صعبة الذوبان في الماء مثل سوبر

فوسفات عادى (فـ٢٤ ٪) وسوبر فوسفات مركز ٤٥.٥ ٪ وتربل فوسفات -  
٣٧ ٪ فـ٢٤ .

وفيا يلي بعض العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام هذه  
المصادر السمادية :

بصفة عامة يجب الاحتياط عن إضافة الأسمدة الفوسفاتية من خلال مياه  
الري - فيؤدي إلى تركيز الكالسيوم والمغنسيوم مع ارتفاع رقم الحموضة pH في  
ماء الري إلى ترسيب الفوسفات في صورة فوسفات ثلاثي الكالسيوم أو فوسفات  
المغنسيوم مما يؤدي إلى مشاكل الانسداد .

يستخدم حامض الفوسفوريك للإضافة من خلال مياه الري كمصدر  
للتسميد الفوسفاتي اللازم لنمو النبات حيث يتميز بأنه في صورة سائلة أيضاً بتأثيره  
الإيجابي على خفض درجة حموضة محلول الري وبالتالي محلول التربة ولو لأوقات  
محدودة وهذا الانخفاض في درجة حموضة pH يساعد على عدم ترسيب الفوسفات  
نتيجة لوجود الكالسيوم والمغنسيوم في ماء الري كذلك يؤدي الانخفاض في رقم  
الحموضة إلى سهولة حركة الفوسفات في التربة بالمقارنة بمصادر الفوسفات  
الأخرى .

لا تصلح أسمدة سوبر الفوسفات العادي وسوبر الفوسفات المركز وتربل  
الفوسفات للإضافة خلال مياه الري نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من المواد

صعبة الذوبان في الماء مثل الجبس (كبريتات الكالسيوم) وفوسفات ثلاثي الكالسيوم .

ويفضل استخدام سماد سوبر الفوسفات العادي للإضافة إلى التربة مباشرة خلال عملية التجهيز للزراعات الجديدة أو خلال عمليات الخدمة الشتوية خاصة في ويرجع ذلك إلى إمكانية الاستفادة من محتوى هذا السماد من الجبس في تحسين الخواص الطبيعية لمثل هذه الأراضي ويفضل استخدام سوبر الفوسفات المركز وتربل الفوسفات لنفس الخواص في الأراضي الصحراوية حديثة الاستصلاح وذلك لارتفاع نسبة الفوسفات بكل منهما وبالتالي توفير تكاليف النقل لوحدة الفوسفات وفي جميع الحالات يفضل إضافة هذه الأسمدة الفوسفاتية مع السماد العضوي .

يفضل إضافة ٦ ٪ من إحتياجات النباتات من الأسمدة الفوسفاتية إلى التربة مباشرة في صورة سوبر الفوسفات العادي خلال عملية التجهيز للزراعات الجديدة أو عمليات الخدمة الشتوية لأشجار الفاكهة .

ويفضل إضافة ١٨ ٪ من إحتياجات النباتات من الأسمدة الفوسفاتية إلى التربة مباشرة في صورة سوبر فوسفات مركز أو تربل فوسفات خلال عمليات التجهيز للزراعات الجديدة أو خلال عمليات الخدمة الشتوية لأشجار الفاكهة في الأراضي الصحراوية حديثة الاستصلاح .

وهذه الأسمدة رخيصة نسبياً ولكن صعبة الذوبان في الماء وبهذه الطريقة يمكن تخفيض كمية الأسمدة الفوسفاتية خلال شبكة الري وكذلك تقليل فرصة حدوث مشاكل الانسداد وذلك يؤدي إلى كفاءة استخدام الأسمدة .

### **البوتاسيوم:**

من أكثر العناصر تأثيراً في النمو ومحصول أشجار المانجو بعد النتروجين ، ترجع أهمية البوتاسيوم في قيامه بدور هام في تفاعلات إنزيم التنفس وفي تصنيع المواد السكرية والنشوية والسليلوزية والعمل على انتقال السكريات ويساعد على عملية امتصاص الجذور للماء والمواد المغذية كما يساعد على الاستفادة من المركبات الآزوتية والفوسفاتية الجاهزة للامتصاص من التربة ويعمل على تحسين نوعية الثمار بصورة عامة ويستخدم البوتاسيوم بمعدلات ١-٦ و١٠ قدر النتروجين ومن الأسمدة الشائعة الاستخدام هي سلفات البوتاسيوم ونترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم المغنيسيوم ويحدث فقد ملموس للبوتاسيوم من التربة عن طريق الغسيل وعموماً يضاف البوتاسيوم بكميات تساوى تلك المضافة من النتروجين والإسراف في التسميد البوتاسي قد يؤدي إلى نقص امتصاص الكالسيوم والمغنسيوم - ويجب تجنب استعمال كلوريد البوتاسيوم عند وجود نسبة من الكلور في التربة أو مياه الري ونسبة البوتاسيوم المسموح بها في ماء الري تتراوح بين ٥ - ٤٠ في المليون والأراضي التي تفتقر للبوتاسيوم التربة الرملية والتربة الكالسية وأنواع الأسمدة البوتاسية هي :

نترات البوتاسيوم (بو ٤٦.٦١٪ وهي سهلة الذوبان في الماء .

وكبريتا البوتاسيوم ٤٨٪ وهي صعبة الذوبان في الماء .

### العناصر الصغرى:

تحتاج إليها الأشجار بكميات قليلة جداً وأعراض نقص هذه العناصر على أشجار المانجو نادرة الظهور في الأراضي الحامضية حيث أن هذه الأراضي تحتوى على كميات كافية من عناصر الحديد ، المنجنيز ، النحاس ، البورون ، الكوبالت ، الموليبدنيوم والكبريت بينما الأراضي الرملية والقلوية تفتقر كثيراً لهذه العناصر ويجب إضافتها للأشجار عن طريق الرش وعادة تكون رشة واحدة أو رشتين سنوياً كافية لإعطاء نمو جيد تحت معظم الظروف وترش هذه العناصر (زنك ، منجنيز) في صورة سلفات هذه العناصر بمعدل ٣ جم / لتر ماء أو في الصورة المخلبة بمعدل ١ جم / لتر ماء وأعراض نقص الزنك تظهر بوضوح على النموات الحديثة وتظهر في صورة الأوراق الصغيرة والمتجمعة وتكون أكثر صلابة من الأوراق العادية وحدوث انحناء في نصل الورقة ويلتوى العرق الوسطى إلى أعلى أو إلى أسفل مسبباً انحناء الجزء القمى في نفس الاتجاه والعروق تظهر أكثر وضوح ويرجع السبب في انحناء الأوراق وعدم نموها طبيعياً إلى عدم انتظام في معدل النمو بين نصل الورقة على أي جانب من العرق الوسطى . كما تتميز الفروع والأغصان الحديثة بقصر سلمياتها وتكون الأوراق رقيقة مستدقة وتتجه الأوراق

لتميل بزاوية قائمة على الأفرع كما تميل هذه الأفرع إلى الذبول ثم الجفاف لتسبب موت الأطراف في الأفرع الحديثة .

### **أسمدة العناصر الصغرى:**

هناك العديد من مصادر التسميد بالعناصر الصغرى التي يمكن استخدام البعض منها للإضافة من خلال مياه الري على حسب درجة وسهولة الذوبان في الماء .

### **أسمدة سهلة الذوبان في الماء :**

حديد مخلبي FeEDTA والنسبة المئوية للعنصر ١٠ .

حديد مخلبي FeEDDHA والنسبة المئوية للعنصر ٦ .

زنك مخلبي ZenDT والنسبة المئوية للعنصر ١٣.٥ .

منجنيز مخلبي MnEDTA والنسبة المئوية للعنصر ٢ .

نحاس مخلبي CUEDTA والنسبة المئوية للعنصر ٣ .

أسمدة صعبة الذوبان في الماء :

سلفات حديدوز ٧ ماء والنسبة المئوية للعنصر ٥.٠ .

سلفات زنك ١ ماء والنسبة المئوية للعنصر ٣٦.٠ .

سلفات منجنيز ٤ ماء والنسبة المئوية للعنصر ٢٤.٠ .

سلفات نحاس ٥ ماء والنسبة المئوية للعنصر ٦.٠ .

بوراكس ١٠ ماء والنسبة المئوية للعنصر ١١.٠ .

وقد لوحظ استجابة النباتات للتسميد بالعناصر الغذائية الصغرى خاصة الحديد والزنك أو النحاس من خلال مياه الري وكذلك البورون في حالة النباتات التي تروى بمياه الترعى ،

## **إكثار المانجو**

تكاثر المانجو بطريقتين : التكاثر الجنسي - التكاثر الخضري .

### **(أولاً) التكاثر الجنسي (الإكثار بالبذرة):**

تكاثر المانجو سواء كانت بذور عديدة الأجنة وذلك لإنتاج أصناف تشابه آبائها في الصفات أو للحصول على نباتات تصلح أصولاً للتطعيم عليها من أصناف جديدة معلومة الصفات .

وتنقسم أصناف المانجو من حيث عدد الأجنة بالبذور إلى قسمين :

#### **أ- أصناف ذات بذور وحيدة الجنين :**

هي التي تحتوى على جنين واحد نتيجة للإخصاب الناتج عن التلقيح الذاتي من نفس الشجرة أو الإخصاب الناتج عن التلقيح الخلطي من أشجار أخرى سواء من نفس الصنف أو أصناف أخرى فإذا زرعت مثل تلك البذرة نتج عنها نبات واحد فقط يكون مشابهاً في صفاته لأصله تماماً في حالة الإخصاب الذاتي ومختلفاً كثيراً وقليلاً عنه في حالة الإخصاب الخلطي وكثيراً ما يكون مخالفاً لأصله في الصفات وقل ما يتفوق عليه وعلى ذلك فإن هذه الأصناف لا يجوز إكثارها إلا بالطرق الخضرية ومن أهم الأصناف .

(بيري ، مبروك ، دبشة ، لانجرا ، فجري كلان ، كيت ، كنت ، جيلور).

## بـ أصناف ذات بذور عديدة الأجنة :

البذور عديدة الأجنة هي التي تحتوي على الجنين الأصلي الناتج عن الإخصاب (جنين جنسي) وليس دائماً يكون موجوداً وعلى بضعة أجنة موزعة على الفلقتين ناشئة خضرياً من خلايا نسيج النيوسيلة وهي تكون مشابهة لأمها تماماً وفي الغالب تكون البذور العديدة الأجنة رقيقة القشرة سهلة التقشير بعكس البذور الوحيدة وبذلك يسهل التمييز بينهما - ويلاحظ أن البذور العديدة الأجنة عليها بضعة خطوط غائرة منحنية على سطحي الفلقتين تقسمها إلى بضعة أقسام بكل قسم برعم على هيئة نقطة دقيقة مخضرة ويختلف حجم تلك البراعم فمنها ما يكون كبير نسبياً ومنها ما يكون صغير جداً على حالة أثرية وعلى كل حال يكون الجنين الخضري أقل حجماً من الجنين الجنسي وفي البذور وحيدة الجنين نجد أن الفلقات غير مقسمة بينما العديدة الأجنة نجد الفلقات مقسمة إلى عدة أقسام بخطوط غائرة واضحة وتكون بجهتي الفلقات ، وإذا زرعت بذرة الصنف عديدة الأجنة نتج عنها أكثر من نبات واحد وقد يتراوح عددها ما بين ٢ - ١١ نبات أحدهما جنسي ناتج من عملية الإخصاب الناتج من التلقيح الخلطي فيعطى أشجاراً مخالفة للآم في صفاتها الوراثية ولإنتاج أشجار بذرية نيوسيلة يتم زراعة البذور العديدة الأجنة وبعد الإنبات يتم استبعاد النبات المخالف لمجموعة النباتات الناتجة سواء كان أضعفها أو أقواها (الجنسي) الناتج عن الجنين وليس دائماً يكون موجود . وأما باقي النباتات تكون متجانسة ناشئة عن نسيج النيوسيلة فإذا زرعت أعطت نباتات

مشابهة للأم ومطابقة للصنف وتكون قوية النمو وغزيرة المحصول إلا أنها تتأخر في موعد الإثمار عن الأشجار المطعومة كما هو معروف عن الأشجار البذرية وتحمل أشجارها بعض الثمار الصغيرة الحجم والمتأخرة النضج وهذه الثمار تتكون بكرياً وتكون النواة فيها رقيقة، ومن أهم الأصناف العديدة الأجنة ما يلي :

هندي سنارة ، قلب الثور ، كوبانية ، زبدة ، تيمور ، عويس ، مسك ، هندي خاصة ، جولك ، صديق .

### زراعة البذور:

يراعى في بذور المانجو أن تكون مأخوذة من ثمار ناضجة حية تعطى نسبة إنبات تصل إلى ٩٠٪. بينما البذور المستخرجة من الثمار الخضراء منخفضة فيها نسبة الإنبات كثيراً وعدم استخدام بذور ناتجة من مصانع استخدمت الطريقة الساخنة في استخراج اللب لأن درجة الحرارة المرتفعة تؤدي إلى موت الجنين وبالتالي نسبة الإنبات = صفر ، ويلاحظ أيضاً أن بذور المانجو تفقد رطوبتها بسهولة مما يسبب ضمور الفلقات وبالتالي تفقد حيويتها بسرعة ، لذلك ينصح بزراعة بذور المانجو بمجرد استخراجها من الثمار حيث تنخفض حيوية الجنين بترك البذور بعد استخراجها من الثمار ، ويمكن أن تحتفظ البذور بحيويتها لمدة لا تزيد عن عشرة أيام إلا أنه يمكن حفظ البذور لمدة تطول عن شهر وذلك بحفظها في مسحوق نباتي مندي . ويمكن معرفة البذور التي فقدت حيويتها عن طريق مسك البذرة ورجها فإذا سمع صوت حركة الفلقتين داخل غلاف البذرة دل ذلك على أن

الفلقات بدأت تضرر وهي لا تملأ فراغ الغلاف المتخشب وبالتالي لا تصلح مثل هذه البذور للزراعة وتحتاج بذور المانجو لإنباتها إلى جو حار ، لذلك فكلما كان ميعاد زراعة البذور مبكراً في يوليو وأغسطس كانت نسبة إنبات البذور أكبر أما إذا تأخرنا عن زراعة البذور عن شهر أغسطس فإن ذلك يعوق عملية الإنبات حيث تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض وهذا يقلل من إنبات البذرة ، بالإضافة إلى أن البادرات الناتجة تتعرض لانخفاض درجة الحرارة مما يسبب موت عدداً منها على العكس من البادرات التي تنتج في شهر أغسطس فهي تأخذ فترة لتنمو فيها قبل تعرضها لانخفاض درجة الحرارة في الشتاء ، وتأخذ بذرة المانجو حوالي ٤ يوماً لإنباتها إلا أنه يمكن الإسراع في إنبات البذور وذلك بتقشيرها وإزالة الغلاف الخشبي وهناك عدة فوائد لإزالة الغلاف الخشبي للبذرة قبل زراعتها هي :

تسرع من إنبات البذرة حيث يمكن أن تنبت البذور بعد حوالي ثمانية أيام بدلاً من 4 يوماً في البذور غير المزال غلافها الخشبي .

إزالة الغلاف الخشبي يجعل البادرة تنمو معتدلة ولا تتشوه السويقة الجنينية نتيجة لاصطدامها بالغلاف الخشبي .

التحقق من كون الفلقات سليمة أو مصابة أو ضامرة وبذلك نضمن الحصول على نباتات قوية .

وتعتبر أفضل طريقة لزراعة بذور المانجو لإنتاج أصول التطعيم عليها (أو لإنتاج شتلات نيوسيلية من المانجو) هي الزراعة في مرقد البذرة ثم نقلها لأكياس حتى يتم تطعيمها ويتبع في ذلك الخطوات التالية :

### (ثانياً) التكاثـر الخـضري:

تعطى طرق الإكثار الخضري نباتات مطابقة للصفة المراد إكثاره وعموماً يعتبر الإكثار الخضري الوسيلة الوحيدة لإنتاج نباتات من الأصناف الوحيدة الجين مع المحافظة على صفاتها المميزة علاوة على أن النباتات المكثرة خضرياً تزهر في العام الثالث أو الرابع بينما المكثرة عن طريق البذرة تحتاج من ٨ - ١٠ سنوات حتى تزهر .

#### طرق الإكثار الخضري:

- التطعيم بالصلق .
- التطعيم اللساني .
- التطعيم السرجي .
- التطعيم الجذري .
- التطعيم بالشق .
- التطعيم بالعين .
- التطعيم السوطي .
- التطعيم الجانبي .

التطعيم القلبي الطرقي .

البرعمة:

البرعمة الدرعية .

البرعمة القشرية .

الترقيد:

الترقيد الأرضي .

الترقيد الهوائي .

العقلة:

المانجو صعبة الإكثار بالعقلة .

### **(ثالثا) الإكثار عن طريق زراعة الأنسجة:**

وهو مازال في مراحله الأولى بالرغم من أنه حقق نجاحاً محدوداً وسوف يقتصر على شرح أهم الطرق المستخدمة تجارياً في مصر .

### **التقليم :**

كثير من المزارعين ينظر إلى تقليم أشجار المانجو بأنه عملية غير ضرورية ويترك الأشجار لحالها سواء الحديثة الزراعة أو المثمرة وتكون النتيجة بعد سنوات قليلة أو كثيرة تدهور المزرعة بالكامل وانخفاض إنتاجها كثيراً وليعلم المزارع أن التقليم عملية ضرورية جداً وفي سطور نوضح أهداف إجراء التقليم :

## إزالة التشوهات الخضرية والزهرية .

تنظيم حمل الأشجار بالتغلب على ظاهرة تبادل الحمل أو كسر حدثها .  
تركيز إنتاج الثمار الجيد على الجزء الخارجي من محيط الشجرة وبعمق واحد  
متر للدخل .

زيادة المحصول عن طريق إيجاد التوازن في نمو الشجرة حيث يزداد المحصول  
بزيادة عدد النموات الحديثة على الشجرة .  
إنتاج أفرع حمل قصيرة تكون أكثر مقاومة للرياح وبذلك يقل التساقط ويزداد  
المحصول .

فتح قلب الشجرة وتوصيل الضوء والهواء إلى كافة أجزاء الشجرة عن طريق  
إزالة الأفرع المتشابكة والغير مرغوب فيها والغير منتجة للثمار  
تجديد شباب الأشجار المسنة وضعيفة الإنتاج .  
تقليل وجود الخشب الغير منتج وهذا يؤدي إلى زيادة التهوية في الأشجار .  
إنتاج ثمار ذات مواصفات جودة عالية .  
تسهيل عملية جمع الثمار وخفض تكاليفها .  
الحصول على الحجم الأمثل للأشجار وتسهيل عمليات الخدمة .

في العادة لا يتم تقليم أشجار المانجو ويقتصر ذلك على إزالة الأفرع الجافة  
والميتة والمتشابكة والمتداخلة بدرجة تعيق وصول الضوء إلى قلب الشجرة وعند  
خروج عدد كبير من الأفرع عند نفس النقطة (المستوى) وتزاحم بعضها البعض

فهذه يمكن تقليمها وإزالتها أيضا والمفضل عموما هو تربية الأشجار الصغيرة بطريقة تضمن التوزيع الجيد للأفرع الرئيسية بدلا من الإكثار من التقليم .

### **تقليم الأشجار المثمرة:**

يتم التقليم عادة في الوقت الذي يكون فيه تأثيره أقل ضررا على الأشجار ويتم ذلك في بداية نشاط ونمو الأشجار أو تكوين نموات جديدة .

وتجري عملية التقليم بعد جمع الثمار مباشرة ويتم كالآتي :

تجري إزالة الشواخيز الزهرية المشوهة وكذلك التشوهات الخضرية وتجري عملية الإزالة بجزء من النسيج السليم أسفل الجزء المشوه بمسافة ٢٠ - ٣٠ سم . إزالة الأفرع المصابة والجافة والميتة وتكون الإزالة كلية إذا كان الفرع كله ميت أو جاف وإذا كانت أجزاء من الأفرع وخاصة الأجزاء الطرفية فيتم تقليم الجزء المصاب مع جزء من النسيج السليم و يراعى أن يكون القطع فوق عقد مباشرة .

تزال الأفرع المتزاحمة والمتراكبة على بعضها لفتح قلب الشجرة وإذا كان هناك فرع رئيسي مسئول عن قفل قلب الشجرة يزال هذا الفرع من عند إتصاله بالجذع ولا يجري له تقصير لأن إجراء التقصير يؤدي إلى خروج نموات تؤدي إلى قفل قلب الشجرة وتصبح أسوأ مما كانت .

يراعى عدم إزالة أفرع محيط من الشجرة الخارجي لأن ذلك يؤدي إلى تقليل حجم الشجرة وتقليل مسطح الإثمار .

الأفرع الشاردة عن هيكل الشجرة يجري لها عملية تقصير أو إزالة حسب وضع الفرع .

المسافة بين الأشجار يجب أن تسمح بسقوط ضوء الشمس فيها وتخللها حركة الهواء لذلك يجب إجراء تقصير للأفرع التي تشغل هذه المسافة بحيث تكون المسافة بين الأشجار خالية تماماً مما يسمح بحركة الهواء وسقوط ضوء الشمس .

في حالة الأشجار المرتفعة في الحدائق القديمة تجري عملية تقليم لتقليل إرتفاع الأشجار حتى يتسنى إجراء عمليات الخدمة وجمع الثمار بكفاءة عالية ويجب أن يكون إرتفاع الشجرة ٦ - ٨ أمتار ويقدر أقصى إرتفاع للشجرة بحوالي ٥ ٪ من المسافة بين الأشجار وفتح قلب الشجرة في نفس الوقت بإزالة الأفرع الداخلية وليست للخارجية مع مراعاة المحافظة على حجم الشجرة بإجراء تقليم سنوي وإجراء تقصير الإرتفاع إلى ١٠ - ١٢ متر كما يجري في بعض الحدائق فهو خطأ لأن الأشجار سوف تعطى نموات أسفل منطقة القطع مما يؤدي إلى قفل الشجرة في هذه المنطقة وعدم وصول الضوء مما يؤدي إلى موت وجفاف الأفرع التي تحمل محصول، كذلك فإن هذه الأفرع تعاود النمو إلى أعلى وبذلك فإنه في خلال سنوات قليلة ترجع الأشجار لنفس الإرتفاع وبذلك تعود مشكلة الإرتفاع .

في حالة الأشجار البذرية المرتفعة والمتزاحمة يجري لها تجديد شباب كما سبق أو يتم تغيير صنف هذه الأشجار بأصناف مرغوبة ويتم ذلك على فترة ٣ إلى ٤ سنوات بحيث لا يتعرض المزارع لإنخفاض كبير في الدخل.

وفي حالة الأشجار التي تعاني من قلة محصولها نتيجة قلة التزهير وذلك لقلة  
الأفرع الموجودة أو لعدم وجود حجر للشجرة يجري لها عملية تطويع للأفرع سواء  
الثانوية أو الأفرع عمر سنة وسنتين وذلك بإزالة منطقة البرعم الطرقي مع جزء من  
الفرع مما يشجع خروج نموات أسفل القطع وبذلك تزداد عدد الأفرع التي تحمل  
محصول بعد ذلك .

يزداد إصابة جذع شجرة المانجو بالتشقق نتيجة عوامل كثيرة مثل إرتفاع  
الحرارة - الرطوبة في منطقة الجذع ولذلك يراعى عدم تعري جذع الشجرة بعدم  
إزالة الأفرع السفلية وإن كانت وصلت إلى مستوى سطح التربة يفضل رفعها بعمل  
تشعيبات خشبية وبذلك نضمن عدم تعرض الجذع للحرارة المنعكسة من التربة مع  
السماح بحركة الهواء وعدم رفع الرطوبة في هذه المنطقة .

في حالة إصابة جذع الشجرة بالتشقق بدرجة متقدمة ووصل التشقق إلى  
إنفصال منطقة القلف عن الخشب يجري الآتي :

إزالة منطقة القلف (اللحاء) المفصولة بواسطة آلة حادة وتكون الإزالة لمنطقة  
القلف المفصول فقط ثم تنظف المنطقة المزال قلفها ثم تدهن بعجينة بوردو والتي  
تتكون من الآتي : ١ كجم كبريتات نحاس + ٢ كجم جير حي + ١٠ - ٤ لتر ماء +  
مادة لاصقة .

عموما بعد إجراء عملية التقليم يجب تطهير مكان الجروح وذلك بدهان  
مكان قطع الفروع السميكة بعجينة بوردو وترش الشجرة كلية بمحلول إكسي

كلورو النحاس أو بوليرام بمعدل ٤٠٠ جم / ٦ لتر ماء أو مان كوبر أو إنتر كول  
كومبي بمعدل ١٨ جم / ٦ لتر ماء مع إضافة مادة ناشرة مثل ترايتون (ب) أو  
سوبر فيلم بمعدل ٥٠ سم لكل ٦ لتر ماء .

مع مراعاة غسيل الشجرة بالمحلول بحيث يشمل المجموع الخضري وخشب  
الأفرع الرئيسية والثانوية - علاوة على ذلك فإن إكسي كلورو النحاس يقتل نسبة  
كبيرة من جراثيم العفن الداخلى لثمار المانجو وكذلك لفحة الأزهار والذي يكمن في  
البراعم وآباط الأوراق وكذلك الأشنة .

### **التزهير المبكر:**

يزال التزهير المبكر حتى أواخر يناير وتكون الإزالة عن طريق قصف  
الشماريخ الزهرية ويجب إزالتها فوراً وعدم الإنتظار حتى يكبر الشمارخ بل يمكن  
إزالة البرعم بمجرد تباعد الأوراق الحرشيفية المحيطة بالبرعم وظهور سنبل  
الشمارخ ، وكلما تم القصف والشمارخ صغير كانت الفرصة أكبر لخروج شمارخ  
أو شماريخ أسفل منه وفي الموعد المناسب ويراعى عدم قص الشمارخ بجزء من  
الفرع لأن ذلك يقلل أو يمنع من خروج شماريخ جديدة . ويراعى إحكام الري  
وعدم الإسراف لأنه من العوامل المساعدة على التزهير المبكر .

### **التقليم الصيفي:**

يجري التقليم الصيفي اعتباراً من شهر مايو بإزالة الشماريخ الزهرية المشوهة  
وكذلك التشوهات الخضرية ويراعى أن يكون القطع أسفل الجزء المشوه بمسافة ٤

٦ - سم وبذلك يتم توفير المواد الغذائية التي تستهلكها هذه الأجزاء المشوهة وتنبيه البراعم الموجودة لإخراج نموات خضرية أسفل القطع في نفس الموسم القادم وبذلك يمكن الحد من ظاهرة تبادل الحمل وكذلك حماية الشجرة من كثير من الآفات والأمراض التي تتخذ الشماريخ المشوهة مرتع خصب لتكاثرها وإنتشارها .

## الري:

الري يعتبر من أهم عمليات الخدمة ذات التأثير الواضح على مدى نجاح زراعة المانجو لما له من تأثير كبير على نمو الأشجار وعلى كمية المحصول الناتج وصفات الثمار ، وهناك عدد كبير من العوامل التي تحدد المقدار اللازم للأشجار من الماء مثل الجو العادي (أساسي) ونوع التربة وعمر الأشجار وحجمها والمسافة بين الأشجار وحالة النشاط الفسيولوجي للأشجار .

### ١- تأثير درجة الحرارة والمنطقة:

نجد أن كمية الماء اللازمة للدم تزداد بزيادة درجة الحرارة مما يتطلب الري على فترات متقاربة لتعويض ما يفقد من ماء نتيجة النتح من الأوراق وكذلك التبخير من سطح التربة ولذلك فإن الأشجار المنزرعة في المناطق الجنوبية الحارة تستهلك كمية من مياه الري أكبر بكثير عن تلك المنزرعة في المناطق الشمالية أو الساحلية وذلك لكي تعطى أحسن محصول .

## ٢- تأثير اختلاف أشهر السنة:

تختلف الفترة بين الريات وكمية الماء المستخدمة في الري في المنطقة الواحدة باختلاف أشهر السنة فيزداد الإحتياج للري في الأشهر التي ترتفع فيها درجات الحرارة مثل أشهر الصيف وبالتالي يلزم الري على فترات متقاربة لتعويض ما يفقد من ماء ، بينما تقل كمية الماء المستخدمة وتتباعد الفترة بين الريات في الأشهر التي تنخفض فيها درجات الحرارة ولذلك تزداد كمية الماء في الأشهر الحارة (يونيو ، يوليو ، أغسطس) عنه في الأشهر الأقل حرارة (أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر).

## ٣- اختلاف مقدرة الأرض على الإحتفاظ بالماء:

تختلف كمية الماء التي تعطى للأشجار باختلاف مقدرة الأرض على الإحتفاظ بالماء ولذلك فإن نوع التربة يحدد طول الفترات بين الريات المتتابعة ، كما يحدد كمية الماء اللازم إضافتها في كل رية حيث أن كمية الماء المتساوية تبلل أعماقاً مختلفة من التربة حسب نوعها ، فالأراضي الطينية مقدرتها على الإحتفاظ بالماء يمكنها أن تبلل أعماقاً أقل من التربة الطينية عن التربة الرملية التي لا تحتفظ أو لا تمسك جزئيات الماء بقوة وبالتالي تتسرب لعمق أكبر في التربة .

## ٤- عمر الأشجار وحجمها:

تختلف الإحتياجات المائية لأشجار المانجو باختلاف عمر الأشجار وبالتالي حجمها وذلك من الأشجار الصغيرة العمر حتى تصل إلى البلوغ وثبات الحجم وعندئذ لا يصبح لزيادة العمر تأثير على الإحتياجات المائية للأشجار.

## ٥- درجة تعمق الجذور في التربة:

تختلف كمية الماء التي تضاف للأشجار باختلاف درجة تعمق الجذور في التربة ، فكلما كانت جذور الأشجار متعمقة في التربة كلما زادت فرصتها في الحصول على الماء من أعماق مختلفة من التربة .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإسراف في ماء الري أو زيادته عن اللازم يكون له تأثيراً عكسياً على كمية المحصول وجودته ، لذلك يجب أن يضع المزارع هذه النقطة في اعتباره عند ري أشجار المانجو ، كما أن قلة ماء الري عن اللازم تقلل نمو الأشجار وكفاءة الأوراق في تمثيل الغذاء مما يؤثر بالتالي على المحصول .

## ٦- حالة النشاط الفسيولوجي للأشجار:

وخاصة في الأشجار الكبيرة المثمرة والتي يمكن تقسيم مراحل النشاط فيها

كما يلي :

**H-** بعد جمع المحصول وحتى بدء انتفاخ البراعم الزهرية :

يراعى في هذه الفترة إطالة فترات الري وقد يمنع الري نهائياً في الأراضي الصفراء الثقيلة ولا ينصح بالري إلا في حالات الضرورة (مثل تجنب أضرار الصقيع) لأن الإسراف في الري خلال تلك الفترة يؤدي إلى تشجيع التزهير المبكر غير المرغوب فيه حيث أنه يظهر أثناء الشتاء وتكون درجة الحرارة غير ملائمة لنمو الأنبوبة اللقاحية (إنخفاض درجة الحرارة إلى ١٥ ف) يؤدي إلى توقف نمو الأنبوبة

اللقاحية وكذلك لضعف نشاط الحشرات الملقحة خلال تلك الفترة بالإضافة إلى تعرض تلك الأزهار للصقيع في الشتاء أو غسيل حبوب اللقاح بفعل المطر .

### **بـ فترة التزهير والعقد :**

عند انتفاخ البراعم الزهرية تعطى الأشجار رية غزيرة لتشجيع خروج الأزهار ويراعى خلال فترة التزهير والعقد احكام الري بحيث لا تعطش الأشجار مما يؤدي إلى جفاف وتساقط الأزهار والعقد وكذلك عدم المغالاه في الري مما يؤثر تأثيراً سيئاً على تنفس جذور الأشجار ، وما يتبع من تأثير ضار على الأزهار والعقد.

### **جـ فترة نمو الثمار حتى اكتمال النمو :**

خلال هذه الفترة يراعى العناية بالري وتقصير الفترة ما بين الريات نظراً لحاجة الثمار للمياه لنموها وكذلك لإرتفاع درجة الحرارة والعطش في تلك الفترة يؤدي إلى زيادة تساقط الثمار ، ويستمر ذلك حتى تصل الثمار إلى مرحلة اكتمال النمو إلى حجمها النهائي تقريباً .

### **دـ فترة نضج الثمار :**

يراعى في هذه الفترة إطالة الفترة ما بين الريات والتحكم في كمية المياه التي تعطى للأشجار وذلك لدفع الثمار للنضج ، والمغالاه للري في تلك الفترة قد يؤدي إلى تشقق الثمار ، كما أن تقليل المياه يساعد الثمار على سرعة تلوينها .

## زراعة الجوافة المناخ المناسب:

تنمو الجوافة تحت ظروف مناخية متباينة بالمناطق الاستوائية وتحت الاستوائية ويتأثر إنتاجها بارتفاع الرطوبة الجوية حيث تتعرض ثمار الأشجار النامية في المناطق الغزيرة الأمطار للتشقق ويكون المحصول قليلا وذلك لما تسببه الأمطار من إعاقة لعملية التلقيح وبالتالي انخفاض كمية المحصول الناتجة ، والجوافة (شأنها في ذلك شأن النباتات الاستوائية) لا تتحمل درجات الحرارة المنخفضة فالأشجار عادة لا تتحمل درجات حرارة أقل من - ٣ م تحت الصفر بينما الشجيرات الصغيرة تقتلها هذه الدرجات حتى لو تعرضت لها ساعات قليلة في العراء دون حماية .

## الأرض المناسبة:

تجود الجوافة مثل أنواع الفواكه الأخرى في الأراضي الخصبة الجيدة الصرف علاوة على ذلك تنجح زراعتها في أنواع مختلفة من الأراضي فهي تنمو في أراضي طينية ثقيلة وكذلك في أراضي رملية صرفة كما أنها تنجح في أراضي قلووية وحامضية بدرجة لا تستطيع أغلب أنواع الفاكهة الأخرى تحملها . وتتحمل الجوافة ملوحة التربة كما يمكن زراعتها في الأراضي الغدقة حيث تحقق إنتاجا مربحا .

## خدمة ما بعد الزراعة:

تعطي أشجار الجوافة محصولا غزيرا ولذلك يجب الاعتناء بتسميدها حتى تستمر في الإنتاج الاقتصادي في السنوات التالية وعموما تحتاج الجوافة إلى الآزوت

بكمية أكبر مما تحتاجه أشجار الحمضيات خصوصا أثناء عقد ونمو الثمار ، ويمكن الاسترشاد بالبرنامج التالي في رسم السياسة السمادية لزراعة الجوافة :

### أولا : في نظام الري بالغمر :

١ - السهاد البلدي : يخلط السهاد البلدي قبل إضافة بسهاد السوبر فوسفات العادي بمعدل ٥ كجم سهاد فوسفاتي لكل ١ م<sup>٢</sup> سهاد بلدي ثم يضاف المخلوط بمعدل ٥ مكعب للدم خلال الشتاء ويخلط بالتربة جيدا لأكثر عمق .

٢ - التسميد المعدني : تختلف الاحتياجات السمادية السنوية من عناصر الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم تبعا لعمر الأشجار وعوامل التربة ونظام الخدمة والري وبصفة عامة تتزايد المقننات السمادية السنوية من هذه العناصر خلال السنوات الأولى بعد الغرس حتى تستمر مع بلوغ الأشجار السنة الخامسة من عمرها بالمكان المستديم ويمكن الاسترشاد بالبرنامج التالي لرسم السياسة السمادية المناسبة لظروف مزرعة الجوافة على أساس متطلبات الشجرة الواحدة مقدرة بالجرام .

في السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة وما بعدها ويراعى في رسم وتطبيق البرنامج التسميدي الأسس الآتية (أ) التسميد الأزوتي: تسمد الأشجار الأقل من أربع سنوات بتوزيع المقنن السنوي من الأزوت على أربعة دفعات متساوية في أبريل ، يونية ، أغسطس ، سبتمبر ، أما في العالم الرابع

وما يليه فقد يضاف دفعة واحدة قبل تفتح الأزهار أو قد يضاف على دفعتين متساويتين في مايو ، يوليو ، وقد يزداد المقتن السنوي في الأراضي المستصلحة وقد تنظم المواعيد بحيث تنتهي إضافة ٢-٣ المقتن السنوي من الأزوت قبل التزهير بحوالي شهر والثالث الباقي بعد عقد الثمار .

### **التسميد الفوسفاتي :**

يوزع المقتن السنوي على دفعتين متساويتين في يناير ، يونيه للأشجار الصغيرة أما في العام الرابع وما يليه فيضاف المقتن الفوسفاتي دفعة واحدة في الشتاء وذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

### **التسميد البوتاسي :**

يوزع المقتن البوتاسي السنوي بنفس نظام السماد الأزوتي في الأعمار المختلفة على أن تكون دفعاته متبادلة مع السماد الأزوتي وبفارق ريتين بين التسميد الأزوتي والبوتاسي .

### **ثانيا : في نظام الري بالتنقيط أو الرش .**

#### **(أ) السماد البلدي :**

يضاف بعد خلطه بالسوبر فوسفات العادية كما هو موضح في نظام إلى (بالغمر) على أن ينثر يدويا على المساحة المبتلة حول ساق الشجرة ويخلط بتربتها بمعدل ١ كجم لكل شجرة وذلك خلال شهر سبتمبر ، وإذا توفرت إمكانية الغمر

كل عدة سنوات فيضاف بالطريقة والمعدل المتبع في نظام الري بالغمر وذلك بواقع مرة كل ٢ - ٣ سنوات .

### **(ب) التسميد المعدني :**

تخفض المقننات السنوية المذكورة في نظام الري بالغمر إلى النصف للعناصر الثلاثة مع مراعاة الأسس المنوه عنها في الري التسميدي للموالح من حيث عدد دفعات حقن السماد في مياه الري ، فترات التسميد ومصادر العناصر السمادية الثلاثة والإضافات الواجبة من سماد كبريتات الماغنسيوم .

### **الري:**

#### **أولا : نظام الري بالغمر:**

تتوقف كمية مياه الري وعدد الريات على العوامل الجوية وحالة التربة وعمر النبات فالنباتات الصغيرة يجب أن تروي طوال العام أما الأشجار الكبيرة فقد لا تحتاج للري خلال الشتاء ثم تروي في بداية فصل النمو وتوالى بالري في الفترة ما بين عقد الثمار ونضجها حيث تقل عدد الريات بعد ذلك وبصفة عامة تحتاج أشجار الجوافة إلى حوالي ١٢ - ١٦ رية خلال العام .

#### **ثانيا : الري بالتنقيط :**

من حيث عدد ساعات التشغيل اليومي واختلافها بين شهور السنة وتبعاً لنوعية مياه الري وخصائص التربة ، وكذلك بالنسبة لعدد النقاطات واختلافها تبعاً لاختلاف عمر الأشجار، ويراعي استخدام أجهزة تقدير حاجة الأشجار للري في ضبط برنامج الري المناسب للحديقة .

## التقليم:

بالرغم من اختلاف وجهات النظر في درجة شدة التقليم التي يجب أن تلقاها نباتات الجوافة إلا أن السائد إلى الآن هو تقليم الأشجار الصغيرة بدرجة كبيرة وذلك للعمل على تكوين هيكل قوي للشجرة وبعد ذلك يقتصر التقليم على تقصير الأفرع الطويلة والتي إذا حملت ثمارا فإنها تصبح عرضة للكسر كذلك تزال السرطانات والأفرع القريبة من سطح التربة والأفرع الجافة والمصابة هذا ويفضل إجراء تقصير نموات العام السابق لطول ١٠ - ١٦ سم من أجل زيادة النموات الحديثة الجانبية والتي تحمل أزهارا وثمار تفوق في محصولها الأفرع الغير مقلمة .

## تجديد الأشجار المسنة :

عندما تهمل الأشجار الكبيرة السن يضعف نموها الخضري ويقل محصولها بالتالي ولعلاج هذه الحالة تقلم الأشجار تقليم حائر حتى يخرج عليها أفرع جديدة تحمل محصولا مناسباً في السنة التالية ويكون ذلك بإزالة الأفرع الرئيسية للشجرة على ارتفاع متر من سطح الأرض وبعد ذلك تترك الأشجار لتربي من جديد بإزالة الأفرع الخارجة من الجذع الأصلي والخارجة من نقطة واحدة وتترك الأفرع الباقية موزعة حول الشجرة توزيعاً منتظماً مع إزالة السرطانات التي تكثر في هذه الحالة من جراء القرط الشديد وتجري هذه العملية في شهر فبراير أو مارس حسب حالة الجو ثم تروي الأشجار المقروطة بعد أسبوعين لتشجيع خروج نموات حديثة عليها .

## الأمراض والآفات:

أهم الآفات التي تصيب الجوافة هي البق الدقيقي والحشرات القشرية والمن وذبابة الفاكهة والأكاروس ويتبع في مقاومتها ما أتبع مع محاصيل الفاكهة مستديمة الخضرة الأخرى والتي تصاب بهذه الحشرات وتعتبر ذبابة الفاكهة والبق الدقيقي من أهم الآفات التي تعاني منها زراعات الجوافة .

## المصادر والمراجع

- ١ - المدخل إلى علم الزراعة: أحمد السيد أبو زيد دار روائع الاولى ٢٠٠٣.
- ٢ - الزراعة المستدامة - عبد المعطي التلاوي - ٢٠٠٣ م.
- ٣ - موسوعة الزراعة في التاريخ - عادل الحجاج - ٢٠٠٥ م.
- ٤ - حشرات الفاكهة م الأشجار الجراحية - د. توفيق مصطفى د. نعيم شرف مكتبة الفلاح - ١٩٩٤ م.
- ٥ - خصوصية التربة والاسمدة - اس . ال تدليل - دبلو - ال نيلسون ترجمة - د. نزار يحيى - د. منذر المختار - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة البصرة ١٩٨٧ م.
- ٦ - اساسيات زراعة الفاكهة - محمد على باشه - دار المطبوعات الجديدة ١٩٨٢ م.
- ٧ - اثمار اشجار الفاكهة - طه عبد الله - دار المطبوعات الجديدة - ١٩٧٧ م.
- ٨ - الفاكهة - اساسيات الانتاج - د. محمود البرقوفي د. يوسف والي دار الهند للطباعة - ١٩٦٥.
- ٩ - فسيولوجيا اشجار الفاكهة - أ.د حسن جندي - الدار العربية للنشر والتوزيع - ٢٠٠٣ م.
- ١٠ - ثمار الفاكهة - د. فيصل فيس د. حسن بغدادي - دار المعارف ١٩٥٩ م.